

又方桂二兩切以水一升二合煮取八合去滓頓服無桂者著乾薑亦佳

又方烏梅二七枚以水五升煮一沸內大錢二七枚煮得二升半強人可頓服羸人可分爲再服當下便愈

又方茱萸二兩生薑四兩豉三合酒四升煮取二升分爲三服即差

又方乾薑一兩巴豆二兩搗蜜丸一服如小豆二丸當吐下差治心腹相連常脹痛方狼毒二兩附子半兩搗篩蜜丸如梧子大日一服一丸二日二丸三日後服三丸再一丸至六日再三丸自一至三以常服即差

道藏輯要

肘後備急方

三

虛集十

又方吳茱萸一合乾薑四分附子細辛人參各二分搗篩蜜丸如梧子大服五丸日三服

凡心腹痛若非中惡霍亂則是皆宿結冷熱所爲今此方可採以救急差後要作諸大治以消其根源也

附方

梅師方治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲死以鹽五合水一升煎令消頓服自吐下食出即定不吐更服

孫真人方治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良十全方心脾痛以高良薑細剉炒杵末米飲調下一錢匕立止

治卒心腹煩滿方第十一

治卒心腹煩滿又胃脇痛欲死方以熱湯令灼灼爾漬手足復
易祕方

又方青布方寸鹿角三分亂髮灰二錢匕以水二升煮令得一
升五合去滓盡服之

又方劉薏苡根濃煮取汁服三升

又方取比輪錢二十枚水五升煮取三沸日三服

又方搗葦菜汁服一二升水煮乾薑亦佳

又方卽用前心痛支子豉湯法差

又方黃芩一兩杏仁二十枚牡蠣一兩水三升煮取一升頓服

治厥逆煩滿常欲嘔方小草桂細辛乾薑椒各二兩附子二兩

道藏輯要

肘後備急方

三

虛集十

炮搗蜜和丸服如桐子大四丸

治卒吐逆方灸乳下一寸七壯卽愈

又方灸兩手大拇指內邊爪後第一文頭各一壯又灸兩手中
中央指爪下一壯愈

此本雜治中其病亦是痰壅霍亂之例兼宜依霍亂條法治之
人卒在此上條患者亦少皆因他病兼之耳或從傷寒未復或
從霍亂吐下後虛燥或是勞損服諸補藥痞滿或觸寒熱邪氣
或食飲協毒或服藥失度並宜各循其本源爲治不得專用此
法也

附方

千金方治心腹脹短氣以草豆蔻一兩去皮爲末以木瓜生薑湯下半錢

斗門方治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷熱相擊致令心腹脹滿方厚朴火上炙令乾又蘸薑汁炙直待焦黑爲度搗篩如麵以陳米飲調下二錢七日三服良亦治反胃止瀉甚妙

經驗方治食氣遍身黃腫氣喘食不得心胸滿悶

不蛀皂角去皮子塗好醋炙令焦爲末一錢匕巴豆七枚去油膜二件以淡醋及研好墨爲丸如麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以利爲度如常服消酒

道藏輯要

肘後備急方

二

虛集十

食

梅師方治腹滿不能服藥煨生薑綿裹肉下部中冷卽易之聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時含一棗大嚥津

治卒霍亂諸急方第十二

凡所以得霍亂者多起飲食或飲食生冷雜物以肥膩酒醢而當風履濕薄衣露坐或夜臥失覆之所致

初得之便務令煖以炭火布其所臥下大熱減之又並蒸被絮若衣絮自苞冷易熱者亦可燒地令熱水沃敷薄布席臥其上厚覆之亦可作灼灼爾熱湯著甕中漬足令至膝并銅