

砂半分雄黃一分搗蜜丸如梧子發日平旦冷水服二丸七日內忌油

附方

外臺秘要治瘡不痊乾薑高良薑等分爲末每服一錢水一中盞煎至七分服

聖惠方治久患勞瘧瘴等方用鱉甲三兩塗酥炙令黃去裙爲末臨發時溫酒調下三錢七

治瘧用桃仁一百個去皮尖於乳鉢中細研成膏不得犯生水候成膏入黃丹三錢丸如梧子大每服三丸當發日面北用溫酒吞下如不飲酒并花水亦得五月五日午時合忌雞犬

道藏輯要

肘後備急方

奕

虛集十

婦人見

又方用小蒜不拘多少研極爛和黃丹少許以聚爲度丸如雞頭大候乾每服一丸新汲水下面東服至妙

治卒發癩狂病方第十七

治卒癩疾方灸陰莖上宛宛中三壯得小便通則愈

又方灸陰莖上三壯囊下縫二七壯

又方灸兩乳頭三壯又灸足大指本鬃毛中七壯灸足小指本節七壯

又方取葶藶一升搗三千杵取白犬劍懸之以杖犬令血出承取以和葶藶末服如麻子大一丸三服取差

又方黃芩子三升酒五升漬之出曝乾漬盡酒止搗服一錢七
日三勿多益狂

又小品癲狂黃芩散黃芩子三升末之酒一升漬多日出搗之
以向汁和絞去滓湯上煎令可丸服如小豆三九日三口面
當覺急頭中有蟲行者額及手足應有赤色處如此必是差
候若未見服取盡矣

又方末房葵温酒服一刀圭至二三身潤又小不仁爲候
又方自縊死者繩燒三指撮服之

凡癲疾發則仆地吐涎沫無知彊掠起如狂反遺糞者難治
治卒發狂方燒蝦蟇搗末服方寸七日三服之酒服

道藏輯要

肘後備急方

五

虛集十
川三六

又方臥其人著地以冷水淋其面爲終日淋之

治卒狂言鬼語方針其足大母指爪甲下入少許卽止

又方以繒帶急合縛兩手火灸左右脇握肘頭文俱起七壯須
與鬼語自道姓名乞去徐徐詰問乃解手耳

凡狂發則欲走或自高貴稱神聖皆應備諸火灸乃得永差耳
若或悲泣呻吟者此爲邪魅非狂自依邪方治之近效方已生
蠶紙作灰酒水任下差療風癲也

附方

斗門方治癲癩用艾於陰囊下穀道正門當中間隨年道灸之
千金方治風癲百病麻人四升水六升猛火煮令牙生去滓煎

取七合旦空心服或發或不發或多言語勿恠之但人摩手足須定凡進三劑愈

又方治狂邪發無時披頭大叫欲殺人不避水火苦參以蜜丸如梧子大每服十九薄荷湯下

外臺秘要治風癇引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴天門冬去心皮曝乾搗篩酒服方寸匕若人久服亦能長生

廣利方治心熱風癇爛龍角濃研汁食上服二合日再服

潮 經驗後方治大人小兒久患風癇纏喉啞嗽遍身風癩急中涎

蓋此藥不大吐逆只出涎水小兒服一字瓜蒂不限多少細

道藏輯要

附後備急方

癸

虛集下
XOII

碾爲末壯年一字十五已下老怯半字早晨井花水下一食須含沙糖一塊良久涎如水出年深涎盡有一塊如涎布水上如鑑矣涎盡食粥一兩日如吐多困甚卽嚙麝香湯一盞卽止矣麝香研溫水調下昔天平尙書覺昏眩卽服之取涎有效

明皇雜錄云開元中有名醫紀朋者觀人顏色談笑知病深淺不待診脈帝聞之召於掖庭中看一宮人每日間則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而大促力頓仆於地而然乃飲以雲母湯令熟寐覺而失所苦問之乃言因太華公主載誕宮中大陳歌吹某乃主謳懼其聲不能

清且長喫純蹄羹飽而當筵歌大曲曲罷覺胸中甚熱戲於
砌臺上高而墜下久而方惶病狂足不能及地

治卒得驚邪恍惚方第十八

治人心下虛悸方麻黃半夏等分搗蜜丸服如大豆三九日二
稍增之半夏湯洗去滑乾

治驚憂怖迫方或驚恐失財或激憤惆悵致志氣錯越心行違
僻不得安定者

龍骨遠志茯神防風牡蠣各二兩甘草七兩大棗七枚以水
八升煮取二升分再服日日作之取差

又方茯苓乾地黃各四兩人參朮各三兩甘草二兩麥門冬一

道藏輯要

肘後備急方

堯

虛集十
X。X

升去心半夏六兩洗滑生薑一斤以水一斗又殺烏雞取血
及肝心煮三升分四服日三夜一其間少食無爽作二劑差
又方白雄雞一頭治如食真珠四兩切薤白四兩以水三升煮
取二升宿勿食且悉食雞等及飲汁盡

又有鎮心定志諸丸在大方中

治卒中邪鬼恍惚振慄方灸鼻下人中及兩手二大指爪甲本
令艾丸在穴上各七壯不止至十四壯愈此事本在雜治中
治女人與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚者末雄黃一兩以松
脂二兩溶和虎爪攪令如彈丸夜內火籠中燒之令女人侵
坐其上被急自蒙唯出頭耳一爾未差不過三劑過自斷也