

爲度若不飲酒卽取莎草根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗爲散以蜜和爲丸搗一千杵丸如梧子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二十九日再服漸加至三十九丸以差爲度

治中風諸急方第十九

治卒中急風悶亂欲死方灸兩足大指下橫文中隨年壯又別有續命湯

若毒急不得行者內筋急者灸內踝外筋急者灸外踝上二十壯若有腫痺虛者取白欬二分附子一分搗服半刀圭每日可三服

若眼上睛垂者灸目兩眥後三壯

道藏輯要

肘後備急方

空

虛集十

若不識人者灸季脇頭各七壯此脇小肋屈頭也

不能語者灸第二槌或第五槌上五十壯又別有不得語方在後篇中矣

又方豉菜菹各一升水五升煮取二升稍稍服

若眼反口噤腹中切痛者灸陰囊下第一橫理十四壯又別有服膏之方

若狂走欲斫刺人或欲自殺罵詈不息稱鬼語者

灸兩口吻頭赤肉際各一壯又灸兩肘屈中五壯又灸背胛中間三壯三日報灸三倉公祕法又應灸陰囊下縫三十壯又別有狂邪方

若發狂者取車轂中脂如雞子熱溫清苦酒以投脂甚攪令消服之令盡

若心煩恍惚腹中痛滿或時絕而復蘇者

取金下土五升搗篩以冷水八升和之取汁盡服之口已噤者強開以竹筒灌之使得下入便愈甚妙

若身體角弓反張四肢不隨煩亂欲死者

清酒五升雞白矢一升搗篩合和揚之千遍乃飲之大服一升日三少小五合差

若頭身無不痛顛倒煩滿欲死者

取頭垢如大豆大服之并囊貯大豆蒸熟逐痛處熨之作兩

道藏輯要

肘後備急方

三

虛集十

囊更番爲佳若無豆亦可蒸鼠壤土熨

若但腹中切痛者取鹽半斤熬令盡著口中飲熱湯二升得便吐愈

又方附子六分生薑三兩切以水二升煮取一升分爲再服

若手足不隨方取青布燒作烟就小口器中燻痛處

又方豉三升水九升煮取三升分三服又取豉一升微熬囊貯漬三升酒中三宿溫服微令醉爲佳

若身中有掣痛不仁不隨處者取乾艾葉一斛許丸之內瓦甑下塞餘孔唯留一目以痛處著甑目下燒艾以燻之一時間愈矣

又方取朽木削之以水煮令濃熱灼灼爾以漬痛處效

若口噤不開者取大豆五升熬令黃黑以酒五升漬取升以物強發口而灌之畢取汗

又方獨活四兩桂二兩以酒水二升煮取一升半分爲三服開口與之溫時火灸令取汗

若身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之以酒共水六升煮取二升去滓適寒溫稍稍服之

又方刮枳樹皮取一升以酒一升漬一宿服五合至一升酒盡更作差

若口喎僻者銜灸口吻口橫艾間覺火熱便去艾卽愈勿盡

道藏輯要

肘後備急方

奎

虛集十
卅三

艾盡艾則太過若口左僻灸右吻右僻灸左吻又灸手中指節上一丸喎右灸左也又有灸口喎法在此後也

又方取空青末著口中入咽卽愈姚同

又方取蜘蛛子摩其偏急頰車上候視正則止亦可向火摩之

又方牡蠣礬石附子竈中黃土分等搗末以三歲雄雞冠血和傅急上持水著邊視欲還正便急洗去藥不著更塗上便愈

又方鰲甲烏頭塗之欲正卽搗去之

若四肢逆冷吐清汁宛轉啼呼者

取桂一兩咬咀以水三升煮取二升去滓適寒溫盡服

若關節疼痛蒲黃八兩附子一兩炮合末之服一錢七日三頓

增至方寸七

若骨節疼煩不得屈伸近之則涌短氣得源出或欲腫者

附子二兩桂四兩朮三兩甘草二兩水六升煮取三升分三服汗出愈也

若中暴風自汗出如水者

石膏甘草各等分搗酒服方寸七日移一丈輒一服也

若中緩風四支不收者

豉三升水九升煮取三升分爲三服日二作之亦可酒清煮飲之

若卒中風癱身體不自收不能語迷昧不知人者陳元理骨膏

道藏輯要

肘後備急方

齒

虛集十
川川文

至要在備急藥方中

附方

頭風頭
痛附方

經驗方治急中風目瞑牙噤無門下藥者用此末子以中指點末指齒三二十指大牙左右其口自開始得下藥石

開關散天南星搗爲末白龍腦二件各等分研自五月五日午時合患者只一字至半錢

簡要濟眾治中風口噤不開涎潮吐方

用皂角一挺去皮塗猪脂炙令黃色爲末每服一錢匕非時溫酒服如氣實脈大調二錢匕如牙關不開用白梅揩齒口開卽灌藥以吐出風涎差

治中風不省人事牙關緊急者

藜蘆一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色搗爲末每服半錢溫水調下以吐出風涎爲效如人行三里未吐再服

又治膽風毒氣虛實不調昏沈睡多

酸棗人一兩生用金挺蠟茶二兩以生薑汁塗炙令微焦搗羅爲散每服二錢水七分煎六分無時溫服

孫尚藥治卒中風昏昏若醉形體昏悶四肢不收或倒或不倒或口角似斜微有涎出斯須不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於上膈痺氣不通宜用

道藏輯要

肘後備急方

卷

虛集十

急救稀涎散猪牙皂角四挺須是肥實不蛀削去黑皮晉礬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀令出或一升二升當時惺惺次緩而調治不可便大段治恐過傷人命累經效不能盡述

梅師方療癱緩風手足躡曳口眼喎斜語言蹇澁履步不正

神驗烏龍丹川烏頭去皮臍了五靈脂各五兩右爲末入龍腦麝香研令細勻滴水丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化次煖酒調服之一日兩服空心晚食前服治一人只一十九服得五七丸便覺擡得手移得步十九可以自行

聖惠方治一切風疾若能久服輕身明目黑髮駐顏

用南燭樹春夏取枝葉秋冬取根皮揀擇細剉五升水五斗慢火煎取二斗去滓別於淨鍋中慢火煎如稀餈以瓷瓶貯溫酒下一匙日三服

又方治風立有奇效用木天蓼一斤去皮細剉以生絹袋貯好酒二斗浸之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜合溫飲一盞老幼臨時加減若長服日只每朝一盞

又方治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指

道藏輯要

肘後備急方

突

虛集十
川七

又方治風頭旋用蟬殼二兩微炒爲末非時溫酒下一錢七千金方治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉

桂心以酒煮取汁故布蘸搗病上當卽正左喎搗右右喎搗左常用大效

又方治三年中風不效者

松葉一斤細切之以酒一斗煮取三升頓服取汗出立差又方立卒中風頭面腫杵杏仁如膏傳之

又方治頭面風眼瞶鼻塞眼暗冷泪

杏仁三升爲末水煮四五沸洗頭冷汗盡三度差

外臺祕要治卒中風口喎

皂角五兩去皮爲末三年大醋和右嚼塗左左嚼塗右乾又傳之差

又治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沈恐酢壞每日服一盞空心服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升佳

又主風身體如蟲行鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗三五度治一切風

葛氏方治中風寒瘧直口噤不知人

鷄屎白一升熬令黃極熱以酒三升和攪去滓服

千金翼方治熱風汗出心悶水和雲母服之不過再服立差

道藏輯要

肘後備急方

卷 虛集十

篋中方治風頭及腦掣痛不可禁者摩膏主之

取牛蒡莖葉搗取濃汁二升合無灰酒一升鹽花一匙頭瘡火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時行頭痛摩時須極力令作熱乃速效冬月無葉用根代之亦可

經驗後方治中風及壅滯以旋覆花洗塵令淨搗末鍊蜜丸如梧子大夜臥以茶湯下五丸至七丸十九

又方解風熱疎積熱風壅消食化氣導血大解壅滯

大黃四兩牽牛子四兩半生半熟爲末鍊蜜爲丸如梧子大每服茶下一十九如要微動喫十五丸冬月宜服並不搜攪人

集驗方治風熱心躁口乾狂言渾身壯熱及中諸毒龍腦甘露丸寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合四面濕土壅起候經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米膏丸彈子大蜜水磨下

食醫心鏡主中風心肺風熱手足不隨及風痺不任筋脈五緩恍惚煩躁

熊肉一斤切如常法調和作腌腊空腹食之

又主風攣拘急偏枯血氣不通利

雁肪四兩鍊濾過每日空心煖酒一盃肪一匙頭飲之

同經曰治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者

道藏輯要

肘後備急方

突

虛集十

沒藥半兩研虎腦骨三兩塗酥灸黃色先搗羅爲散與沒藥同研令細溫酒調二錢日三服大佳

聖惠方治歷節風百節疼痛不可忍

用虎頭骨一具塗酥灸黃槌碎絹袋貯用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙

內臺秘要方療歷節諸風百節酸痛不可忍

松脂三十斤鍊五十徧不能五十徧亦可二十徧用以鍊酥三升溫酒和松脂三升熟攪令極稠且空腹以酒服方寸匕日三數食麩粥爲佳慎血腥生冷酢物果子一百日差

又方松節酒主歷節風四肢疼痛如解落

松節二十斤酒五斗漬二七日服一合日五六服

斗門方治白虎風所患不已積年久治無效痛不可忍者

用腦麝楓柳皮不限多少細剉焙乾浸酒常服以醉爲度卽
差今之寄生楓樹上者方堪用其葉亦可制砒霜粉尤妙矣
經驗後方治白虎風走注疼痛兩膝熱腫

虎脛骨塗酥炙黑附子炮製去皮臍各一兩爲末每服溫酒
調下二錢七日再服

外臺祕要治癩瘍風及三年

酢磨烏賊魚骨先布摩肉赤卽傅之

又治癩瘍風酢磨硫黃傅之止

道藏輯要

肘後備急方

堯

虛集十

聖惠方治癩瘍風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋刮取
塗於患上未差更入硫黃少許同磨塗之

集驗方治頸項及面上白駮浸淫漸長有似癬但無瘡可治鰓
鱧魚脂傅之先拭剝上刮使燥痛後以魚脂傅之一度便愈
甚者不過三度

聖惠方治白駮用蛇蛻燒末醋調傅上佳

又方治中風煩熱皮膚瘙痒用醍醐四兩每服酒調下半匙
集驗方治風氣客於皮膚瘙痒不已

蜂房灸過蟬蛻等分爲末酒調一錢七日三二服

又方蟬蛻薄荷等分爲末酒調一錢七日三服

北夢瑣言云有一朝士見梁奉御診之曰風疾已深請速歸去朝士復見鄜州馬醫趙鄂者復診之言疾危與梁所說同矣曰只有一法請官人試喫消梨不限多少咀齧不及絞汁而飲到家旬日唯喫消梨頓爽矣

千金方治頭風頭痛大豆三升炒令無聲先以貯一斗二升瓶一隻貯九升清酒乘豆熱卽投於酒中密泥封之七日溫服孫真人方治頭風痛以豉湯洗頭避風卽差

千金翼治頭風搗葶藶子以湯淋取汁洗頭上又主頭風沐頭吳茱萸二升水五升煮取三升以綿染拭髮根聖惠方治頭風痛每欲天陰雨風先發者

道藏輯要

肘後備急方

辛

虛集十

用桂心一兩爲末以酒調如膏用傅頂上并額角

陳藏器拾遺序云頭疼欲死鼻內吹消石末愈

月華子云治頭痛水調決明子貼太陽穴

又方決明子作枕勝黑豆治頭風明目也

外臺祕要治頭疼欲裂當歸二兩酒一升煮取六合飲至再服孫兆口訣云治頭痛

附子炮石膏煨等分爲末入腦麝少許茶酒下半錢

斗門方治卒頭痛白殭蠶碾爲末去絲以熟水二錢七立差又方治偏頭疼用京芎細剉酒浸服之佳

博濟方治偏頭疼至靈散雄黃細辛等分研令細每用一字已

下左邊疼吹入右鼻右邊疼吹入左鼻立效

經驗後方治偏頭疼絕妙華撥爲末令患者口中含溫水左邊疼令左鼻吸一字右邊疼令右鼻吸一字效

集驗方治偏正頭疼穀精草一兩爲末用白麩調攤紙花子上貼疼處乾又換

偏頭疼方用生蘿蔔汁一規殼仰臥注鼻左痛注左右痛注左右俱注亦得神效

外臺秘要頭風白屑如麩糠方

豎截楮木作枕六十日一易新者

治卒風瘡不得語方第二十

道藏輯要

肘後備急方

圭

虛集十

治卒不得語方以苦酒煮茨子薄頸一周以衣苞一日一夕乃解卽差

又方煮大豆煎其汁令如飴含之亦但濃煮飲之

又方煮豉汁稍服之一日可美酒半斤中攪分爲三服

又方用新好桂削去皮搗篩三指撮著舌下咽之

又方剉穀枝葉酒煮熱灰中沫出隨多少飲之

治卒失聲聲噎不出方橘皮五兩水三升煮取一升去滓頓服傾合服之

又方濃煮苦竹葉服之差

又方搗蕤荷根酒和絞飲其汁此本在雜治中