

又方通草乾薑附子茯神各一兩防風桂石膏各二兩麻黃一兩半白朮半兩杏仁三十枚十物搗篩爲末蜜丸如大豆大一服七丸漸增加之凡此皆中風又有竹瀝諸湯甚多此用藥雖少而是將治所患一劑不差更應服之

又方針大槌旁一寸五分又刺其下停針之

又方礬石桂末綿裹如棗內舌下有唾出之

又方燒馬勒銜鐵令赤內一升苦酒中破一雞子合和飲之

若卒中冷聲嘶啞者甘草一兩桂二兩五味子二兩杏仁三十枚生薑八兩切以水七升煮取二升爲二服服之

附方

道藏輯要

肘後備急方

圭

虛集十

經驗後方治中風不語獨活一兩剉酒二升煎一升大豆五合炒有聲將藥酒熱投蓋良久溫服三合未差再服

又方治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜蘆一分天南星一箇去浮皮卻臍子上陷一箇坑子內入陳醋一椀斗子四面用火逼令黃色同一處搗再研極細用生蜜爲丸如赤豆大每服三丸溫酒下

聖惠方治中風以大聲咽喉不利以蘘荷根二兩研絞取汁酒一大盞相和令勻不計時候溫服半盞

治風毒腳弱痺滿上氣方第二十一

腳氣之病先起嶺南稱來江東得之無漸或微覺疼痺或兩脛

小滿或行起忽弱或小腹不仁或時冷時熱皆其候也不即治轉上入腹便發氣則殺人治之多用湯酒摩膏種效既多不但一劑今只取單效用兼灸法

取好豉一升三蒸三曝乾以好酒三斗漬之三宿可飲隨人多少欲預防不必待時便與酒煮豉服之腳弱其得小愈及更營諸方服之并及灸之

次服獨活酒方獨活五兩附子五兩生用切以酒一斗漬經三宿服從一合始以微痺爲度

又方白礬石二斤亦可用鍾乳末附子三兩豉三升酒三斗漬四五日稍飲之若此有氣加蘇子二升也

道藏輯要

肘後備急方

三

虛集十  
川又文

又方好硫黃三兩末之牛乳五升先煮乳水五升仍內硫黃煎取三升一服三合亦可直以乳煎硫黃不用水也卒無牛乳羊乳亦得

又方法先煎牛乳三升令減半以五合輒服硫黃末一兩服畢厚蓋取汗勿令得風中間更一服暮又一服若已得汗不復更取但好將息將護之若未差愈後數日中亦可更作若長將亦可煎爲丸北人服此治腳多效但須極好硫黃耳可預備之

若脛已滿捏之沒指者但勤飲烏犢牛溺二三升使小便利息漸漸消當以銅器尿取新者爲佳無烏牛純黃者亦可用之



又方取牽牛子搗蜜丸如小豆大五丸取令小便利亦可正爾  
吞之其子黑色正似棗子核形市人亦賣之

又方三白根搗碎酒飲之

又方酒若水煮大豆飲其汁又食小豆亦佳又生研胡麻酒和  
服之差

又方大豆三升水一斗煮取九升內清酒九升又煎取九升稍  
稍飲之小便利則腫歇也

其有風引白雞竹瀝獨活諸湯及八風石斛狗脊諸散並別在  
大方中金芽酒最爲治之要今載其方

蜀椒茵芋金牙細辛茵草乾地黄防風附子地膚蒴藿升麻

道藏輯要

財後備急方

齒

虛集十  
川三一

各四兩人參三兩羌活一斤牛膝五兩十四物切以酒四斗  
漬七日飲二三合稍加之亦治口不能言腳屈至良又有側  
子酒亦效

若田舍貧家此藥可釀拔葵及松節松葉皆善

拔葵淨洗剉之一斛以水三斛煮取九斗以漬麴及煮去滓  
取一斛漬飯釀之如酒法熟卽取飲多少任意可頓作三五  
斛若用松節葉亦依准此法其汁不厭濃也患腳屈積年不  
能行腰脊攣痺及腹內緊結者服之不過三五劑皆平復如  
無釀水邊商陸亦佳

其灸法孔穴亦甚多恐人不能悉皆知處今止疏要者必先從

上始若直灸腳氣上不泄則危矣先灸大椎

在頂上大節高起者灸其上面一穴耳若氣可先灸百會五十壯穴在頭頂凹中也

肩井各一百壯

在兩肩小近頭凹處指捏之安令正得中穴耳

次灸膻中五十壯

在胸前兩邊對乳胸厭骨解間指按覺氣翕翕爾是也一云

正胸中一穴也

次灸巨闕

在心厭尖四下一寸以赤度之凡灸以上部五穴亦足治

道藏輯要

肘後備急方

七

虛集十

其氣若能灸百會風應胃管及五藏脬則益佳視病之寬急耳諸穴出灸經不可具載之

次乃灸風市百壯

在兩髀外可平倚垂手直掩髀上當中指頭大筋上捻之自覺好也

次灸三里二百壯

以病人手橫掩下併四指名曰一夫指至膝頭骨下指中節是其穴附脛骨外邊捻之凹凹然也

次灸上廉一百壯

又灸三里下一夫



次灸下廉一百壯

又在上廉下一夫

次灸絕骨二百壯

在外踝上三寸餘指端取踝骨上際屈指頭四寸便是與下廉頗相對分間二穴也此下一十八穴並是要穴餘伏兔犢鼻穴凡灸此壯數不必頓畢三日中報灸合盡

又方孔公孽二斤石斛五兩酒二斗浸服之

附方

斗門方治卒風毒腫氣急痛以柳白皮一斤剉以酒煮令熱帛裏熨腫上冷再煮易之甚妙也

道藏輯要

肘後備急方

美

虛集十  
川  
卷一

聖惠方治走注風毒疼痛用小芥子末和雞子白調塗之

經驗後方治風毒骨髓疼痛芍藥二分虎骨一兩灸爲末夾絹袋貯酒三升漬五日每服二合日三服

食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣

蒼耳子三兩搗末以水一升半煎去七合去滓呷之

又治筋脈拘攣久風濕痺下氣除骨中邪氣利腸胃消水腫久服輕身益氣方

薏苡人一升搗爲散每服以水二升煮兩匙末作粥空腹食又主補虛去風濕痺醞醑二大兩煖酒一杯和醞醑一匙飲之經驗方治諸處皮裏面痛何首烏末薑汁調成膏痛處以帛子

裏之用火炙鞋底熨之妙

孫真人方主腳氣及上氣取鯽魚一尺長者作膾食一兩頓差千金翼治腳氣衝心白礬二兩以水一斗五升煎三五沸浸洗

腳良

廣利方治腳氣衝煩悶亂不識人大豆一升水三升濃煮取汁頓服半升如未定可更服半升即定

蘇恭云凡患腳氣每旦任意飽食午後少食日晚不食如飢可食豉粥若暝不消欲致霍亂者

即以高良薑二兩打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一飽薄粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑母薑

道藏輯要

肘後備急方

老

虛集十

一兩代之以清酒一升煮令極熟和滓食之雖不及高良薑亦大效矣

唐本注云腳氣

煮葶草濃汁漬之多差

簡要濟眾治腳氣連腿腫滿久不差方

黑附子一兩去皮臍生用搗為散生薑汁調如膏塗傳腫上藥乾再調塗之腫消為度

治服散卒發動困篤方第二十二

凡服五石護命更生及鍾乳寒食之散失將和節度皆致發動其病無所不為若發起倉卒不以漸而至者皆是敗勢也宜及