

簡要濟眾治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中

半夏五兩洗過爲末每服二錢白麩一兩以水和搜切作碁子水煮麩熟爲度用生薑醋調和服之

治胸膈上痰癯諸方第二十八

治卒頭痛如破非中冷又非中風方

釜月下墨四分附子三分桂一分搗篩以冷水服方寸七當吐一方無桂

又方苦參桂半夏等分搗下篩苦酒和以塗痛則差

又方烏梅三十枚鹽三指撮酒三升煮取一升去滓頓服當吐愈

道藏輯要

肝後備急方

重

虛集十

此本在雜治中其病是胸中膈上痰厥氣上衝所致名爲厥頭痛吐之卽差

但單煮米作濃飲二三升許適冷煖飲盡二三升須臾適吐適吐畢又飲如此數過劇者須臾吐痰乃止不損人而卽差治胸中多痰頭痛不欲食及飲酒則痰阻痰方

常山二兩甘草一兩松蘿一兩瓜蒂三七枚酒水各一升半煮取升半初服七合取吐吐不盡餘更分二服後可服半夏湯

胡洽名粉隔湯礬石一兩水二升煮取一升內蜜半合頓服須臾未吐飲少熱湯

又方杜蘅三兩松蘿三兩瓜蒂三十枚酒一升二合漬再宿去
滓溫服五合一服不吐晚更一服

又方瓜蒂一兩赤小豆四兩搗末溫湯三合和服便安臥欲擿
之不吐更服之

又方先作一升湯投水一升名爲生熟湯及食三合鹽以此湯
送之須臾欲吐便擿出未盡更服二合飲湯二升後亦可更
服湯不復也

又方常山四兩甘草半兩水七升煮取三升內半升蜜服一升
不吐更服無蜜亦可

方中能月服一種則無痰水之患又有旋覆五飲在諸大方中

道藏輯要

肘後備急方

高

虛集十

若胸中痞寒短氣膈者

膈敷
逼切

甘草二兩茯苓三兩杏仁五十枚碎之水一斗三升煮取六
升分爲五服

又方桂四兩朮甘草二兩附子炮水六升煮取三升分爲三服
膈中有結積覺駭駭不去者

藜蘆一兩炙末之巴豆半兩去皮心熬之先搗巴豆如泥入
藜蘆末又搗萬杵蜜丸如麻子大服一九至二三丸

膈中之病名曰膏盲湯丸徑過針灸不及所以作丸含之令氣
勢得相燻染有五膈丸方

麥門冬十分去心甘草十分炙椒遠志附子炮乾薑人參桂

細辛各六分搗篩以上好蜜丸如彈丸以一丸含稍稍嚥其
汁日三丸服之主短氣心胸滿心下堅冷氣也

此疾有十許方率皆相類此丸最勝用藥雖多不合五膈之名
謂憂膈氣膈悲膈寒膈其病各有診別在大方中又有七氣方
大約與此大同小別耳

附方

聖惠方治痰厥頭痛

以烏梅十箇取肉鹽二錢酒一中盞合煎至七分去滓非時
溫服吐即差

又方治冷痰飲惡心

道藏輯要

肘後備急方

薑

虛集十

用薑撥一兩搗爲末於食前用清粥飲調半錢服

又方治痰壅嘔逆心胸滿悶不下食

用厚朴一兩塗生薑汁炙令黃爲末非時粥飲調下二錢七
千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以冷飲過度遂令脾
胃氣羸不能消於飲食飲食入胃則皆變成冷水反吐不停
者

赤石脂散主之

赤石脂一斤搗篩服方寸匕酒飲自任稍稍加至三七服盡
一斤則終身不吐淡水又不下痢補五藏令人肥健有人痰
飲服諸藥不效用此方遂愈

御藥院方真宗賜高祖相國去痰清目進飲食生犀丸

川芎十兩緊小者粟米泔浸三日換切片子日乾爲末作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯煮蜜杵爲丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加朱砂半兩膈壅加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏眩加細辛一分口眼喎斜炮天南星一分

又方治膈壅風痰

半夏不計多少酸漿浸一宿溫湯洗五七遍去惡氣日中曬乾搗爲末漿水搜餅子日中乾之再爲末每五兩入生腦子一錢研勻以漿水濃腳丸雞頭大紗袋貯通風處陰乾每一丸好茶或薄荷湯下

道藏輯要

肘後備急方

真

虛集十
川上川

王氏博濟治三焦氣不順胸膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎精神不爽

利膈丸牽牛子四兩半生半熟不蛀皂莢塗酥二兩爲末生薑自然汁煮糊丸如桐子大每服二十九丸荊芥湯下

經驗後方治頭風化痰

川芎不計分兩用淨水洗浸薄切片子日乾或焙杵爲末鍊蜜爲丸如小彈子大不拘時茶酒嚼下

又方治風痰

鬱金一分藜蘆十分各爲末和令勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘煮水漱口都服便以食壓之

外臺祕要治一切風痰風霍亂食不消大便澀

訶梨勒三枚搗取末和酒頓服三五度良

勝金方治風痰

白殭蠶七箇直者細研以薑汁一茶匙溫水調灌之

又方治風痰

以蘿蔔子爲末溫水調一匙頭良久吐出涎沫如是癱緩風以此吐後用緊疎藥服疎後服和氣散差

斗門方治胸膈壅滯去痰開胃

用半夏淨洗焙乾搗羅爲末以生薑自然汁和爲餅子用濕紙裹於慢火中煨令香熟水兩盞用餅子一塊如彈丸大入

道藏輯要

肘後備急方

豆

虛集十

鹽半錢煎取一盞溫服能去胸膈壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其功極驗

治卒患胸渾痛方第二十九

胸痺之病令人心口堅痞忽痛肌中苦痺絞急如刺不得俛仰其胸前皮皆痛不得手犯胸滿短氣咳嗽引痛煩悶自汗出或微引背脊不卽治之數日害人治之方

用雄黃巴豆先搗雄黃細篩內巴豆務熟搗相入丸如小豆大服一丸不效稍益

又方取枳實搗宜服方寸七日三夜一服

又方搗括樓實大者一枚切薤白半升以白酒七升煮取二升