

採於牛花生蜀地所產皆有惟益而近郡  
有之生川澤中葉青細如黃葉而不  
先莖未有刺花淡黃色作穗  
以香花而小三月採陰乾

**天竺桂** 味辛溫無毒主腹內諸冷血氣脹功

用似桂皮薄不過烈生西胡國附今

海藥按廣州記云生南海山谷補暖腰脚

破產後惡血治血痢腸風功力與桂心同

方醫家少用

**折傷木** 味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散

血補血產後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生

資州山谷

唐本註云藤生統木一葉似茵草葉而光

厚八月九月採莖日乾唐本先附

**桑花** 暖無毒建脾澀腸止鼻洪吐血腸風崩

中帶下此不是桑椹花即是桑樹上白癬如

地錢花樣又主盜汗書云止鹹試味

聖惠方治膀胱虛熱下砂石澀痛利水道

燒灰研食前溫酒調下一錢匕

**檉木** 味苦平無毒破產後血煮服之葉擣碎

封蛇咬亦洗瘡癬樹如石榴葉細高丈餘四

月開花白如雪生江東林篋間

**倒掛藤** 味苦無毒主一切老血及產後諸疾

結痛血上欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆

刺倒掛於樹葉尖而長也

**故木砧** 一名百味無毒主人病後食勞復取

發當時來參病人行止脚下土如錢許男病

左女病右和砧上垢及鼠頭一枚無即以鼠

屎三七煮服之神效又卒心腹痛取砧上垢

著人鞋履底悉穿又柎几上骨燒傳吻上癢

瘡

圖經衍義本草卷之二十三

圖經衍義本草卷之二十四


君五

宋通直郎辯驗藥材寇宗奭編集

宋太醫助教辯驗藥材許洪校正

木部下品

巴豆



**巴豆** 味辛溫生溫熱寒有毒主傷寒溫瘧寒

熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩

滌五藏六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除

鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金

瘡膿血不利丈夫陰殺斑猫毒可煉餌之益

血脉今人色好變化與鬼神通一名巴椒生

巴郡川谷八月採陰乾用之去皮芫花為

之使惡蕘草畏大黃黃蓮藜蘆

圖經曰巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆

有之木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生

青後漸黃赤至十二月葉漸凋二月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃白類白豆莢漸漸自落即收之一房有三瓣一瓣有實一粒一房共實二粒也戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼為金線巴豆最為上等它處稀有

陶隱居云出巴郡似大豆最能瀉人新者佳用之皆去心皮乃秤又熬令黃黑別擣如膏乃和丸散爾道方亦有鍊餌法服之乃言神仙吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有相耐如此爾唐本注云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共蒂各有殼裹出眉州嘉州者良

陳藏器曰巴豆主癰瘰疔氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破

乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少間腹內熱如火利出惡物雖利不虛若久服亦不瀉白膜破者棄之日華子云通宣一切病泄壅滯除風補勞健胃開脾消痰破血排膿消腫毒殺腹藏

蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫凡合丸散炒不如去心膜煮五度換水各煮一沸雷公云凡使巴之與豆及剛子須在子細認勿誤用殺人巴顆小緊實色黃豆即顆有三稜色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡為度

聖惠方治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指○又方治牙疼用巴豆一粒煨至黃熟去殼用蒜一瓣切一頭作蓋刺去中心可安巴豆在內以蓋子合之用綿裹隨患處左右塞耳中

外臺秘要文中方主唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水腫巴豆九十枚去心皮熬令黃擣丸如小豆大水下二丸以利為度勿飲酒

千金方治寒癰宿食久飲不消大便秘巴豆仁一升清酒五升煮三日三夜研令大熱合酒微火煎之丸如胡豆大每服一丸水下欲吐者服二丸

千金翼治小兒身腫并手足腫兼癰疹巴豆五十枚去皮心以水二升煎取一升用綿於湯中隨手拭之

經驗方治耳卒聾巴豆一粒蠟裹針刺令通透用塞耳中○又方治箭鏃入骨不可拔取巴豆微熬與蠅蝗同研塗所傷處斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之立出

十全方治疥瘡巴豆十粒火炮過黃色去皮膜右順手研如麩入酥少許膩粉少許同研勻爪破以竹篦子點藥不得落眼裏及外腎上如熏炙著外腎以黃丹塗甚妙

蜀椒



蜀椒味辛温大熱有毒主邪氣欬逆温中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒温瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澀下痢洩精女子子宮餘疾散風邪癥結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白輕身增年開滕理通血脉堅齒髮調關節耐寒者可作膏藥多食令人乏氣口閉者殺人名巴椒一名唐菘唐菘音唐菘音殺生武都川谷及巴郡八月採實陰乾杏仁為之使畏款冬

圖經曰蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽

及蜀川陝洛間人家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有鋒刺葉堅而滑可煮飲食甚辛香四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳

藥性論云椒目使治十二種水氣味苦辛有小毒主和巴豆昌蒲松脂以蠟溶為筒于內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘聲之聲若暴聾一日一易若神驗

唐本註云椒目味苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出金州西城者最佳

日華子云漢椒破癥結開胃治天行時氣温疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗暖腰膝縮小便椒目主膀胱急又云椒葉熱無毒治貴狹伏梁氣及內外腎鈞并霍亂轉筋

雷公云一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先須酒拌令濕蒸從巳至午放冷密蓋除向下火四畔無氣後取出使

入窰器中成勿令傷風用也

聖惠方治因熱取涼睡有蛇入口中挽不出用刀破蛇尾内生椒三二粒裏著須臾即出

外臺秘要治瘡腫生椒末麩釜下土末之以大醋和傅之

千金方有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠取生椒擇之洗淨以布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取出差

孫真人方十月勿食椒食之損氣傷心令人多忘。又方治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良

斗門方治腹內虛冷久服駐顏用生椒擇去不拆者除其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令口合空心新汲水下去積年冷煖藏腑久服則能駐顏黑髮明目令人思飲食妙

勝金方治好食生茶用椒末不限多少以糊丸如梧桐子大茶下十九

衍義曰蜀椒須微炒使汗出又須去附紅  
 黃殼去殼之法先微炒乘熱入竹筒中以  
 梗棒之搗取紅如未盡更揀更搗以盡為  
 度凡用椒須如此其中子謂之椒目治盜  
 汗尤功將目微炒搗為極細末用半錢七  
 以生箔上昏煎湯一合調臨睡服無不效  
 蓋椒目能行水又治水蠱

阜角



**早炭** 味辛鹹溫有小毒主風痺死肌邪氣風  
 頭淚出利九竅殺精物療腹脹滿消穀除欬

嗽囊結婦人胞不落明目益精可為沐藥不  
 入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪牙者良九  
 月十月採莢陰乾柏實為之使惡麥門冬畏  
 空青人參苦參

國經曰阜莢出雍州川谷及魯鄒縣今所  
 在有之以懷孟州者為勝本極有高大者  
 此有三種本經云形如猪牙者良陶隱居  
 云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節促  
 直者皮薄多肉味濃大好今醫家作踈風  
 氣丸煎多用長阜莢治齒及取積藥多用  
 猪牙阜莢所用雖殊大抵性味不相遠  
 唐本註云此物有三種猪牙阜莢最下其  
 形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二  
 寸者為大長虛而無潤若長六七寸圓厚  
 促直者皮薄多肉味濃大好

禹錫云按藥性論云阜莢使主破堅癥腹  
 中痛能墮胎又曰將阜莢於酒中取盡其  
 精於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒兼  
 能止疼痛陳藏器云鬼阜莢作浴湯去風  
 瘡疥癬按葉去衣垢沐髮長頭生江南澤

畔如阜莢高一二尺  
 日華子云通關節除頭風消痰殺勞蟲治  
 骨蒸開胃及中風口噤入藥去皮子以酥  
 炙用

雷公云凡使須要赤膩肥并不要者然用  
 新汲水浸一宿了用銅刀削上麤皮用酥  
 反覆炙酥盡為度然出棹之去子搗篩阜  
 莢一兩酥二分子收得揀取圓滿堅硬不  
 蛀者用瓶盛下水於火畔煮待炮熟剝去  
 硬皮一重了取向裏白嫩肉削去黃用銅  
 刀細切於日中乾用其子消人腎氣  
 聖惠方治時氣三日頭痛煩熱用阜莢燒  
 作灰為末非時新汲水一中盞生薑汁密  
 各少許和二錢服之先用煖水淋浴後服  
 藥須更汗出愈

外臺秘要治卒中風口喎以阜角五兩去  
 皮為末以三年大醋和左嚙塗左右嚙塗  
 右乾更傳之差○又方溺死一宿者尚活  
 搗阜角縮裹內下部須更出水即活  
 千金方鱗鼻炙阜角末如小豆以竹管吹

入鼻中

肘後方卒腫滿身面洪大阜角剝炙令黃  
剉三升酒一斗漬合器煮沸服一升日三  
服煩作

經驗方治食氣滿身黃腫氣喘食不得心

胃滿悶不吐君五阜角去皮及子塗好醋炙令

焦為末一錢匕巴豆七枚去油膜二件以

淡醋及研好墨為丸如麻子大每服三九

食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸

以利為度如常服消酒食

梅師方治霍亂轉筋阜角末吹一小豆入

鼻中得嚏便瘥

孫真人方治大小便不通關格不利燒阜

角細研粥飲下三錢立通

簡要濟眾方治中風口禁不開涎潮吐涎

方阜角一挺去皮塗猪脂炙令黃色為末

每服一錢匕非時溫酒服如氣實脉盛調

下二錢匕如牙關不開用白梅搯齒口開

即灌藥吐出風涎差  
靈苑方治急喉閉遠巡不救方以阜莢去

皮子生半兩為末每服少許以筋頭點腫  
處更以醋調藥末厚傳項下須臾便破少  
血出即愈

孫尚藥方治卒中風昏一若醉形體措悶  
四肢不收或倒或不倒或口角似利微有

涎出斯須不治便為大病故傷人也此證

風涎潮於上膈痺氣不通宜用救急稀涎

散猪牙阜角四挺須是肥實不蚰削去黑

皮晉礬一兩光明通瑩者二味同搗羅為

細末再研為散如有患者可服半錢重者

三字七溫水調灌下不大嘔吐只是微微

涎稀冷出或一升二升當時惺惺次緩而

調治不可便大段吐之恐過傷人命累經

效不能盡述

感應神仙傳崔言者職隸左親騎軍一旦

得疾雙眼昏咫尺不辨人物眉髮自落鼻

梁崩倒肌膚有瘡如癬背為惡疾勢不可

救因為洋州駱谷子歸秦使遇一道流自

谷中出不言名姓授其方曰阜角刺一二  
斤為灰蒸久熬研為末食上濃煎大黃湯

調一錢匕服一旬鬢髮再生肌膚悅潤愈  
眼目倍常明得此方後却入山不知所之  
又鐵碓以煨金銀雖百十年不朽以槌阜  
莢則一夕碎破

衍義曰阜莢其子炒春去赤皮人將骨浸

軟煮熱以糖漬之可食圭宣導五臟風熱

壅其莢不蚰肥者微炙為末一兩入生白

礬末半兩膩粉半兩風涎潮塞氣不通溫

水調一二錢但過咽關須吐涎凡用白礬

煮分隔下涎也又暑中濕熱時或久雨合

蒼木服辟溫疫邪濕氣

訶梨勒



**訶梨勒** 味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食

生交愛州

圖經曰訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而

廣州最盛株似木椀花白子似梔子青黃色皮肉相著七月八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺佛殿前有四五十株子極小而味不澀皆是六路每歲州貢只以此寺者寺有古井木根蘸水

水味不苦每子熟時有佳客至則院僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草一寸皆碎破汲木下井水同煎色若新茶今其寺謂之乾明舊木尤有六七株古井亦在南海風俗尚貴此湯然煎之不必盡如

昔時之法也○劉禹錫傳信方云子曾苦赤白下諸藥服遍久不差轉為白膿令狐將軍傳此法用訶梨勒三枚上好者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡水亦得若空水痢加一錢七甘草末若微有濃血加二七若血多加三七皆效

藥性論云訶梨勒使亦可單用味苦甘能通利津液主破胃腸結氣止水道黑髭髮日華子云消痰下氣除煩治水調中止瀉

痢霍亂賁純腎氣肺氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五膈氣懷孕未足月人漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人後分急痛并產後陰痛和蠟燒熏及熱煎湯熏通手後洗

禹錫云按蕭炳云苦酸下宿物止腸澼久洩赤白痢波斯舶上來者六路黑色肉厚者良

雷公云凡使勿用毗梨勒譽梨勒榔精勒雜路勒若訶梨勒文只有六路或多或少並是雜路勒毗路勒箇箇毗雜路皆圓路丈或八路至十三路號曰榔精勒多澁不入用凡修事先於酒內浸然後蒸一伏時其訶梨勒以刀削路細剉焙乾用之經驗方治嗽氣嗽久者亦主之生訶梨一

枚合之嚙汁差後口爽不知食味却煎檳榔湯一椀服之立便有味此知連州銀坑官成窰方外臺秘要治一切風痰風霍亂食不消大便澁訶梨三枚搗取皮和酒頓服三五度


良

廣濟方治嘔逆不能食訶梨勒皮二兩去核熬為末蜜和丸梧子大空心服二十九日二服

孫真人方治常患氣訶梨三枚濕紙裹煨紙乾即剝去核細嚼以生乳一升下之日三服

行義曰訶梨勒氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物雖澁腸而又泄氣蓋其味苦澁

柳花



**柳花** 味苦寒無毒主風水黃疸面熱黑痂疥惡瘡金瘡一名柳絮葉主馬疥痂瘡取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛。實主清癰逐膿血子汁瘡渴生琅邪川澤

陶隱居云柳即今水楊柳也花熟隨風狀如飛雪陳元方以為譬當用其未開時子亦隨花飛正應水漬汁爾柳花亦宜貼灸瘡皮葉療漆瘡

禹錫云按藥性論云苦柳花使主止血治濕痺四肢攣急膝痛

日華子曰葉治天行熱病丁瘡傳尸骨蒸勞湯火瘡毒入腹熱悶服金石藥人發大熱悶并下水氣煎膏續筋骨長肉止痛牙痛煎合枝煎汁可消食也

外臺秘要治黃疸柳枝以水一斗煮取濃汁半升服令盡

衍義曰柳華經曰味苦即是初生有黃葉者也及其華乾絮方出又謂之柳絮收之貼灸瘡及為茵褥絮之下連小黑子因風而起得水濕處便生如地丁之類多不因

種植於人家庭院中自然生出蓋亦如柳絮兼子而飛陳藏器之說是然古人以絮為花陶隱居亦曰花隨風狀如飛雪誤矣經中有實及子汁諸家不解今人亦不見用注釋氏謂柳為尼俱律陀木其子極細如人妄因極小妄果至大是知小黑子得因風而起

**棟實**



**棟實** 味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥癬利小便水道一名金鈴子俗呼

為苦棟。根微寒療蛇蟲利大腸生荆山山谷

圖經曰棟實即金鈴子也生荆山山谷今處處有之以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭間實如彈丸十五生青熟黃十二月採實其根採無時

陶隱居云處處有俗人五月五日皆取葉佩之云辟惡其根以苦酒摩塗亦甚良煮汁作糜食之去蛇蟲

唐本註云此有兩種有雄有雌雄者根赤無子有毒服之多使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者

禹錫云按藥性論云棟實亦可單用主人中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯服

日華子云棟皮苦微毒治遊風熱毒風癩惡瘡疥癩小便壯熱並煎湯浸洗服食須是生子雌樹皮一兩可入五十粒糯米煎煮殺毒瀉多以冷粥止不瀉以熱葱粥發無子雄樹吐瀉殺人

雷公云凡採得後懸乾酒拌浸令濕蒸待  
 上皮軟剥去皮取肉去核勿單用其核碎  
 搥用漿水煮一伏時了如用使肉即不使  
 核使核即不使肉又花落子謂之石茱萸  
 外臺秘要治長蟲棟實淳苦酒中漬宿以

綿裹塞穀道中三寸許日易之

經驗方小兒穀蟲定疼痛抵聖散以苦棟

二兩白蕪荑半兩為末水一盞末一錢煎

取二分放冷待發時服之○又方治藏毒

下血以苦棟子炒令黃為末蜜丸米飲下

十九至二十九甚妙○又方治丈夫大藏

氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百箇溫


湯浸過去皮巴豆二百箇搥微破麩二升

同於銅鍋內炒金鈴子赤熟為度放冷取

出去核為末每服三錢非時熱酒醋湯調

服並得其麩巴豆不用也

楮木



楮木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煮葉汁  
 用之○皮主甘鹽

楮木



楮木根葉尤良

圖經曰楮木樗木舊並不載所出州土今

南北皆有之二木形輪大抵相類但樗木

實而葉香可取樗木疎而氣臭膳夫亦能

熬去其氣北人呼樗為山樗江東人呼為

鬼目葉脫處有痕如樗蒲子又如眼目故

得此名其木最為無用莊子所謂吾有大

木人謂之樗其大本臃腫不中繩墨小枝

曲拳不中規矩立於途匠者不顧是也並

採無時

唐本註云一樹形相似樗木疎樗木實為  
 別也

陳藏器云樗木味苦有小毒皮主赤白久

痢口鼻中疳蟲去疥癩主鬼疰傳尸蠱毒

下血根皮去鬼氣取一握細切以童兒小

便二升豉一合宿浸絞取汁溫一沸三五

日一度服葉似樗北人呼為山樗江東人

呼為虎目葉脫處有痕如白樗散木也唐

本先附

禹錫云按藥性論云樗白皮使味苦微熱

無毒能治赤白痢腸滑痔疾瀉血不住

蕭炳云樗皮主疳痢得地榆同療之根皮

尤良俗呼為虎眼樹本經樗木殊不相似

日華子云樗皮溫無毒止瀉及腸風能縮

小便入藥蜜炙用

雷公云樗木根凡使根不近西頭者上及

不用莖葉只用根採出拌生葱蒸半日出

生葱細剉用袋盛掛屋南畔陰乾用偏利

溺澀也

肘後方治小兒頭生白禿髮不生出椿枝



桃葉心取汁傳之大效

經驗方治藏毒赤白痢香椿淨洗別剝取皮日乾為末飲下一錢立效

楊氏產乳方療疳痢困重樗白皮搗麩拌作小顆子日曬少時又拌凡三過水煮至

熱加鹽醋酒亦得類服多少量見大小

衍義曰椿木葉樗樗皆臭但一種有花結

子一種無花不實世以無花不實木身大

其幹端直者為椿椿用木葉其有花而莢

木身小幹多迂矯者為樗樗用根葉莢故

曰未見椿上有莢者惟樗木上有又有樗

雞故知古人命名曰不言椿雞而言樗雞


者以顯有雞者為樗無雞者為椿其義甚

明用椿木葉樗木根葉莢者宜依此推窮

郁李人

卷五

十九



郁李人

味酸平無毒主大腹水腫面目四肢

浮腫利小便水道根主齒斷腫齧切齒堅

齒去白蟲一名爵李一名車下李一名棣生

高山川谷及丘陵上五月六月採根

圖經曰郁李人本經不載所出州土但云

生高山川谷及丘陵上今處處有之木高

五六尺枝條花葉皆若李惟子小若櫻桃

赤色而味甘酸核隨子熟六月採根并實

取核中人用陸機草木疏云棠棣即郁李

也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有


其花或白或赤六月中成實如李子可食

今近京人家園圃植一種枝莖作長條花

極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用

藥性論云郁李人臣味苦辛能治腸中結

氣關格不通根治齒痛宣結氣破結聚



陶隱居云山野處處有子熟赤色亦可取

之

日華子云郁李人通治五藏膀胱急痛宣

腰膝冷膿消宿食下氣又云根涼無毒

治小兒熱發作湯浴風虫牙濃煎含之

雷公云凡採得先湯浸却削上尖去皮令

淨用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用

韋宙獨行方療脚氣浮腫心腹滿大小便

不通氣急喘息者以郁李人十二箇搗碎

水研取汁意汝人擣碎如粟米取三合以

汁煮米作粥空腹食之佳

必效方療癖取車下李人微湯退去皮及

並人者與乾麩相拌擣之為餅如猶乾和

淡水如常溲麩作餅大小一如病人掌為

二餅微炙使黃切令至熟空腹食一枚當

快利如不利更食一枚或飲熱粥汁以利

為度若至午後利不止即以醋飯止之利

後當虛病未盡者量力一二日更進一服

以病盡為限小兒亦以意量之不得食酪

及牛馬肉等無不效

食療云氣結者酒服人四十九粒更瀉尤良又破癰氣能下四肢水

外臺秘要張文仲治齧齒以郁李根白皮水煮濃汁含之冷即易吐出蟲

楊氏產乳方療身體腫滿水氣急卧不得

郁李人一大合搗為末和麥麩搜作餅子與喫入口即大便通利氣便差

衍義曰郁李人其子如御李子至紅熟堪

啗微澁其人湯去皮研極爛入生龍腦點

赤目陝西甚多根煎湯滌風虫牙

莽草



**莽草**味辛苦温有毒主風頭腫乳癰疔癩除結氣疥癩殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風痒可用沐勿令入眼一名薺一名春草生上谷山谷及宛甸五月採葉陰乾

圖經曰莽草亦曰薺草出上谷及宛甸今

南中州郡及蜀川皆有之木若石南而葉

稀無花實五月七月採葉陰乾一說藤生

繞水石間古方治風毒痺厥諸酒皆用薺

草今醫家取其葉煎湯熱含少頃間吐之

以治牙齒風虫甚效此木也而爾雅釋草

云薺春草釋曰藥草莽草也郭璞云一名

芒芒薺音近故爾然謂之草者乃蔓生者

是也

藥性論云薺草臣能治氣疽疔氣腫墜凝

血治癰瘰除濕風不入湯服主頭瘡白禿

殺蟲與白欬赤小豆為末雞子白調如糊

叶毒腫乾即更易上

陶隱居云今東間處處皆有葉青新烈者

良人用搗以和米內水中魚吞即死浮出

人取食之無妨莽草字亦作薺字今俗呼

為薺草也薺音奇

日華子云治皮膚癩痺並濃煎湯淋風虫

牙痛喉痺亦濃煎汁含後淨漱口良

雷公云凡使採得後便取葉細剉又生甘

草水蓼二味並細剉用生稀絹袋盛毒木

葉於甌中上甘草水蓼同蒸一日去諸藥

二件取出曬乾用之勿用尖有寄生者

聖惠方治牙齒虫孔疼痛及有虫用薺草

為末綿裹內虫孔中或於痛處咬之低頭

吐津勿嚥之疼痛便定又方治癰癧發腫

堅結成核薺草一兩為末雞子白和傳於

帛上貼之日二易之差

肘後方治癰瘡未潰薺草末雞子白塗紙

厚貼上燥復易得痛良又風齒疼頰腫用

五兩水一斗煮取五升熱含漱吐之一日

盡

周禮翦氏掌除蠹物以薺草熏之則死

衍義曰莽草今人呼為薺草濃煎湯淋滌

皮膚癩痺本經一名春草諸家皆謂為草

今居木部圖經亦然今世所用者皆木葉

也如石南枝梗乾則縹緜之其嗅如椒爾

雅釋草云薺春草釋曰今莽草也與本經

合今當具言之石南條中陶隱居注云似

薺草凌冬不凋誠木無疑

黃藥根



**黃藥根** 味苦平無毒主諸惡腫瘡癩喉痺蛇  
大咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四  
尺根及莖似小桑生嶺南

圖經曰黃藥根生嶺南今夔州郡又明越  
秦隴州山中亦有之以忠萬州者為勝藤  
生高三四尺根及莖似小桑十月採根秦  
州出者謂之紅藥子葉似蕎麥枝梗赤色  
七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾  
即黃開州興元府又產一種藥子大抵與  
藥相類主五藏邪氣治肺歷熱除煩燥亦  
入馬藥用春採根暴乾  
經驗方治咯血黃藥漢防已各一兩為末  
每服一錢七水一盞小麥二十粒同煎食  
後溫服

簡要濟眾治鼻衄不止黃藥子為末每服  
二錢七煎薄荷湯下良久以新汲水調麩  
末二匙頭服之○又方傳瘡藥黃藥子四  
兩為末以冷水調傳瘡上乾即旋傳之  
衍義曰黃藥亦治馬心脚熱有功

榭若



**榭若** 味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴  
取脈灸用之○皮味苦水煎濃汁除蟲及癩  
俗用甚效


圖經曰斛若本經不載所出州土今處處  
山林多有之木高丈餘若即葉也與櫟相  
類亦有斗但小不中用耳不拘時採其葉  
并皮用葛洪洗諸敗爛瘡乳瘡並用此皮  
禹錫云按藥性論云斛皮亦可單用主治  
惡瘡煎湯洗之良

日華子云斛皮味澁能吐癩癰澁五藏  
聖惠方治冷淋小腸不利莖中急痛用斛  
葉持末每服三錢水一盞葱白七寸煎六  
分去滓食前溫服

又方治螻蛄咬用斛葉燒灰細研以泔別  
浸斛葉取洗瘡拭之內少許灰於瘡中立  
效

簡要濟眾方治吐血斛葉不拘多少持末  
每服二錢水一盞煎取五七分和滓服  
子母秘錄治小兒及大人赤白痢新斛皮  
一斤去黑皮細切以水一斗煎取五升去  
滓更煎如膏和酒服立差  
衍義曰斛若亦有斗但不及櫟木雖堅而  
不堪充材葉微炙炒槐花減榭葉之半同  
為末米飲調服治初得腸風及血痔熱多  
者尤佳亦堪為炭但不及櫟木

桐葉





**桐葉** 味苦寒無毒主惡蝕瘡者陰皮主五痔殺三蟲療賁飢氣病梧花主傳猪瘡飼猪肥大三倍生桐柏山谷

衍義曰桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四種桐各有治療條其狀列于後一種白桐可斷琴者葉三枚開白花亦不結子

藥性論云皮能沙五淋沐髮去頭風生髮一種荏桐早春先開淡紅花狀如鼓子花成筒子子或作桐油日華子云桐油冷微毒一種梧桐四月開淡黃小花一如棗花枝頭出絲墮地成油露漬衣履五月六月結桐子今人收炒作果動風氣此是月令清明之日桐始華者一種岡桐無花不可作琴體重

**無食子** 味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎一名沒石子

唐本註云生砂磧間樹似檉今注一名沒

石子也出波斯國主小兒疳積能黑髮髮治陰瘡陰汗溫中和氣唐本先附

禹錫云按藥性論云無食子使治大人小兒大腹冷滑痢不禁

海藥云謹按徐南荆記云波斯國大小

如藥子味溫平無毒主腸虛冷痢益血生

精烏鬣髮和氣安神治陰毒痿燒灰用張

仲景使治陰汗取燒灰先以微溫湯浴了

即以帛微裹然傳灰囊上甚良波斯每食

以代果番胡呼為沒食子今人呼墨食子

轉謬矣

雷公云墨石子凡使勿令犯銅鐵并被火

驚者顆小文細上無杵米者妙用漿水於

砂盆中或硬青石上研令盡却焙乾研了

用勿擣能為烏犀色

官氣方治小兒久痢不效沒石子二箇切

熬令黃色研作餛飩食之

衍義曰無食子今人合他藥染髭

**雷丸** 味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒

氣胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒

百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒

白蟲寸白自出不止久服令陰痿一名雷矢

一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢中土

中八月採根暴乾蕩實厚朴為之使惡葛根

藥性論云雷丸君惡蓄根味苦有小毒能

逐風羌花為使主癩癩狂走殺蛇蟲

陶隱居云今亦建平宜都間累累相連如

丸本經云利丈夫別錄云久服陰痿事相

反也

唐本註云雷丸竹之苓也無有苗蔓皆零

無相連者今出房州金州

禹錫云按范子云雷矢出漢中色白者善

吳氏云雷丸神農黃帝岐伯桐君甘有

毒扁鵲甘無毒季氏大寒

雷公云凡使用甘草水浸一宿了洞刀刮

上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿

後蒸從已至未出日乾却以酒拌如前從

已至未蒸日乾用

經驗前方下寸白蟲雷丸一味水浸軟去

皮切焙乾為末每有病者五更初先食及

肉少許便以一錢七藥稀粥調半錢服之  
服時須六衙及上半月日蟲乃下

**胡椒** 味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除藏  
腑中風冷生西戎形如鼠李子調食用之味  
甚辛辣

禹錫云按日華子云調五藏止霍亂心腹  
冷痛壯腎氣及主冷痢殺一切魚肉蠶痺  
毒

海藥云謹按徐表南州記生南海諸國去  
胃口氣虛冷宿食不消霍亂氣逆心腹卒  
痛冷氣上衝和氣不宜多服損肺一云向  
陰者澄茄向陽者胡椒也

雷公云凡使只用內無皺殼者用力大漢  
椒使殼胡椒使子每修事即於石槽中碾  
碎成粉

食療云治五藏風冷冷氣心腹痛吐清水  
酒服之佳亦宜湯服若冷氣吞三七枚  
行義曰去胃中寒痰吐水食已即止甚驗  
過劑則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥  
佐之

**蘇方木** 味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶  
欲死者水煮苦酒煮五兩取濃汁服之效

唐本註云此木用漆色者出南海崑崙來  
交州愛州亦有樹似卷羅葉若榆葉而無  
澁抽條長丈許花黃子生青熟黑

陳藏器云蘇方寒主霍亂嘔逆及人常嘔  
吐用水煎服之破血當以酒煮為良唐本  
先附

雷公云凡使去上麤皮并節子若有中心  
文橫如紫角者號曰木中尊色其效倍常  
百等須細到了重篩拌細條梅枝蒸從已  
至申出陰乾用

肘後方治血運蘇方三兩細剉水五升煮  
取二升分再服若無蘇方取緋衣煮汁  
服亦得

海藥云謹按徐表南海記生海畔葉似降  
木若女楨味平無毒主虛勞血癖氣壅滯  
產後惡露不安怯起衝心腹中攪痛及經  
絡不通男女中風口噤不語宜此法細研  
乳頭香細末方寸匕酒煎蘇方去滓調服

立吐惡物差

**白楊樹皮** 味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩  
弱不隨毒氣遊易在皮膚中痰癖等酒漬服  
之取葉圓大帶小無風自動者

圖經曰白楊舊不載所出州土今處處有  
之北土尤多人種於墟墓間株大葉圓如  
梨皮白木似楊故名白楊採其皮無時  
行義曰白楊陝西甚多永耀間居人修蓋  
多此木也然易生根斫木時碎扎入土即  
生根故易以繁植非止墟墓間於人家舍  
前後及夾道往往植之土地所宜爾風繞  
至葉如大雨聲葉梗故如是又謂無風自  
動則無此事

**欖榔子** 味苦平無毒主宿血其木似枳櫨堅  
硬斫其內有麪大者至數斛食之不飢其皮  
堪作綆生嶺南山谷

圖經曰欖榔生嶺南山谷今二廣州郡皆  
有之人家亦植於庭陰間其木似枳櫨而  
堅硬斫其間有麪大者至數石食之不飢  
其皮至柔皮韌可以作綆其子作穗生木

端不拘時月採之

海藥謹按嶺表錄云生廣南山谷樹身皮葉與蕃棗檳榔等分異然葉下有髮如麤馬尾廣人用織巾子木皮內有麩食之極有補益虛羸乏損腰脚無力久服輕身辟穀錄異云枕榔蓋以此也

**櫻樹皮** 大寒主時行頭痛熱結在腸胃

唐本註云此樹所在皆有多生溪澗水側葉似檮而狹長樹大者連抱高數仞皮極麤厚殊不似檀俗人取煮汁以療水及斷痢取小葉按貼火爛瘡有效

衍義曰檮木皮今人呼為檮柳然葉似柳非柳謂槐非槐木最大者高五六十尺合二三人抱湖南北甚多然亦下材也不堪為器用嫩皮取以緣枋棧與箕唇

**鈎樟根皮** 主金瘡止血

陶隱居云出桂陽邵陵諸處亦呼作鳥樟方家少用而俗人多識此刮根皮屑以療金瘡斷血易合甚驗  
唐本註云鈎樟生郴州山谷樹高丈餘葉

似桫欏而夫長背有赤毛若枇杷葉八月九月採根皮日乾也桫音

**千金藤** 主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘴瘵瘵嗽不痢癰腫蛇大毒藥石發癩癩悉主之生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛附今

陳藏器云有數種南北名模不同大略主瘵相似或是皆近於藤生北地者根大如指色似漆生南土者黃赤如細辛南北所用若取的稱未知孰是其中有草今並入木部草部亦重載也

**南燭枝葉** 味苦平無毒止泄除睡強筋益氣

力久服輕身長年令人不飢變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如璧珠袋盛之可適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色赤名文燭生高山經冬不凋附今

圖經曰南燭本經不載所出州土云生高山今惟江東州郡有之株高三五尺葉類

苦棟而小陵冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時採其枝葉用亦謂之南燭草木其種是木而似草故號為之

禹錫云按日華子云黑飯草益腸胃搗汁浸蒸熬乾服又名南燭也附今

**無患子** 皮有小毒主澣垢去面黥喉痺內疾

中立開又主飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生南谷大樹一名禁婁一名桓附今日華子云無患子皮平

纂文無患木名實可以去垢核黑如璧問種木曰無患何也答曰昔有神巫曰無患此木能似符劾百鬼則以此木為棒殺之世人相傳以此木為衆鬼所惡競取為器用以厭鬼故號無患也

衍義曰無患子今釋子取以為念珠出佛經惟取紫紅色小者佳今入藥絕少西洛亦有之

**白皮** 味苦寒無毒主熱去三蟲療口中疾

葉搗傅猪瘡飼猪肥大三倍生河內山谷

陶隱居云此即梓樹之皮梓亦有三種當用梓素不腐者葉療手脚火爛瘡桐葉及此以肥猪之法未見應在商丘子養猪經中

日華子云煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚癢痒梓樹皮有數般惟楸梓佳餘即不堪用

圖經曰梓白皮生河內山谷今近道皆有之木似桐而葉小花紫爾雅曰椅梓郭注云即楸也詩廊風云椅桐梓漆陸機云梓者椒之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮曰椅大同而小異也又一種鼠梓一名使亦楸之屬也

圖經衍義本草卷之二十四

圖經衍義本草卷之二十五

宋通直郎辯醫藥材寇宗奭編集  
宋大醫助 教諭醫藥材許洪校正  
木部下品  
橡實



橡實味苦微溫無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼為散煮汁服亦主痢并堪漆用一名籽斗榭櫟皆有斗以櫟為勝所在山谷中皆有

圖經曰橡實櫟木子也本經不載所出州土云所在山谷皆有今亦然木高二三丈三四月開黃花八九月結實其實為皂斗榭櫟皆有斗而以櫟為勝不拘時採其皮并實用爾雅云櫟其實掾釋曰櫟似槲之木也掾盛實之房也其實橡也有掾柔自裏詩秦風云山有苞櫟陸機云秦人謂柞

櫟為櫟又唐風云集于苞栩陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟為籽或謂之相今京洛及河內謂櫟亦為籽五方通語也然則柞櫟也籽也相也皆橡櫟之通名也

日華子云櫟樹皮平無毒治水痢消瘰癧除惡瘡橡斗子澀腸止瀉煮食可止飢樂歎歲殼止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并染鬚髮入藥並搗炒焦用  
雷公云凡使去麤皮一重取橡實蒸從已至未出剉作五片用之

孫真人枕中素云橡實子非果非穀而取益人服食未能斷穀啖之充佳無氣而受氣無味而受味消食止痢令人強健不極衍義曰橡實櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充材亦木之性也山中以椿人為糧然澀腸木善為灰他木皆不及其殼堪漆阜若曾經雨水者其色淡不若未經雨水者榭亦有殼但少而不及櫟木所實者

益智子