

關節所以司屈伸故曰機關

龍音寃先  
枯然切

衝脉者經脈之海也

靈樞經曰衝脉者十二經之海

主滲灌谿谷與陽明合於宗筋

尋此則橫骨上下齊兩傍豎筋正宗筋也

衝脉循腹俠齊傍各同身寸之五分而上

陽明脉亦俠齊傍各同身寸之一寸五分

而上宗筋脉於中故云與陽明合於宗筋

也以爲十二經海故主滲灌谿谷也肉之

大會爲谷小會爲谿○新校正云詳宗筋

脈於中一作宗筋總於中

陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明爲之長

皆屬於帶脉而絡於督脉

宗筋聚會會於橫骨之中從上而下故云

陰陽總宗筋之會總宗筋俠齊下合於橫

骨陽明輔其外衝脉居其中故云會於氣

街而陽明爲之長也氣街則陰尾兩傍脉

動處也帶脉者起於季脇回身一周而絡

於督脉也督脉者起於闢元上下循腹故

云皆屬於帶脉而絡於督脉也督脉任脉

衝脉三脉者同起而異行故經文或參差

而引之

故陽明虛則宗筋緩帶脉不引故足痿不用

也

陽明之脉從缺盆下乳內廉下俠齊至氣

街中其支別者起胃下口循腹裏下至氣

街中而合以下髀抵伏菟下入膝髀中下

循脈外廉下足跗入中指內間其支別者

下膝三寸而別以下入中指外間故陽明

虛則宗筋緩帶脉不引而足痿弱不可

用也引謂牽引者

帝曰治之奈何岐伯曰各補其榮而通其俞

調其虛實和其逆順筋脉骨肉各以其時受

月則病已矣帝曰善

時受月謂受氣時月也如肝王甲乙心王

丙丁脾王戊己肺王庚辛腎王壬癸皆王

氣法也時受月則正謂五常受氣月也

黃帝內經素問補註釋文卷之二十七 宣三

唐太僕令唐玄子王冰火註

宋光祿卿直秘閣林億革校正

宋守尚書毛氏郎孫光重改誤

厥論篇

黃帝問曰厥之寒熱者何也

厥謂氣逆上也世謬傳爲脚氣廣鍊方論

焉

岐伯對曰陽氣乘於下則爲寒厥陰氣乘於

下則爲熱厥

陽謂足之三陽脉陰謂足之三陰脉下謂

足也

帝曰熱厥之爲熱也必起於足下者何也

陽主外而厥在內故問之

岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脉者集於

足下而聚於足心故陽氣勝則足下熱也

大約而言之足太陽脉出於足小指之端足

外側足少陽脉出於足小指次指之端足

陽明脉出於足中指及大指之端並循足

陽而上肝脾腎脉集於足下聚於足心陰

弱故足下熱也。○新校正云按甲乙經陽氣起於足作走於足起當作走。  
帝曰寒厥之爲寒也必從五指而上於膝者何也。

陰主內而厥在外故問之

岐伯曰陰氣起於五指之裏集於膝下而聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒也不從外皆從內也。

亦大約而言之也足太陰脉起於足大指

之端內側足厥陰脉起於足大指之端三毛中足少陰脉起於足小指之下斜趣足。

心並循足陰而上循股陰入腹故云集於膝下而聚於膝之上也。

帝曰寒厥何失而然也岐伯曰前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也。

岐伯曰酒入於胃則絡脈滿而經脈虛脾主之營其四支也。

前陰爲太陰陽明之所合故謂不和則精氣竭也內精不足故四支無氣以營之。

此人必數醉若飽以入房氣聚於脾中不得

者厥陰也與王注義異亦自一說  
春夏則陽氣多而陰氣少秋冬則陰氣盛而陽氣衰

此乃天之常道

此人者質壯以秋冬奪於所用下氣上爭不

能復精氣溢下邪氣因從之而上也

質謂形質也奪於所用謂多欲而奪其精氣也

氣因於中

新校正云按甲乙經氣因於中作所中

陽氣衰不能滲管其經絡陽氣日損陰氣獨在故手足爲之寒也帝曰熱厥何如而然也

謂閼其不知識人也或謂戶厥半日遠至一日乃知人者何也

暴猶卒也言卒然冒悶不醒覺也不知人

謂閼其不知識人也或謂戶厥

岐伯曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不知人也

陰謂足太陰氣○新校正云按甲乙經陽氣盛於上五字作腹滿二字當按甲乙經之說何以言之別按甲乙經云陽脉下墜入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不言陽氣盛於上又按張仲景云少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胃鬲宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動今身不仁此爲尸厥仲景言陽氣

散酒氣與穀氣相薄熱盛於中故熱遍於身

內熱而溺赤也夫酒氣盛而慄悍腎氣日衰

陽氣獨勝故手足爲之熱也

醉飽入房內亡精氣中虛熱入由是腎衰

陽虛陰虛故熱生於手足也

退下則是陽氣不得盛於上故知當從甲

己經也又王註陰謂足太陰亦為未盡按

謬刺論云邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脉皆動而形無知其狀若戶

或曰戶厥五三焉得專解陰為太陰也

帝曰善願聞六經脈之厥狀病能也

爲前問解故請備聞諸經厥也

岐伯曰巨陽之厥則腫首頭重足不能行發

爲胸仆

○巨陽太陽也是太陽脉起於目內眞上額。

交頸上其支別者從頸至耳上角其直行

者從巔入絡腦還出別下項循肩臂內俠

脊抵腰中入循督絡腎屬膀胱其支別者

從腰中下貫臂入腦中其支別者從臂內

左右別下貫肺過髀樞循髀外後廉下合

腦中以下貫膍內出外踝之後循京骨至

小指之端外側由是厥逆外形斯證也腫

或作踵非

陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得卧面赤

退下則是陽氣不得盛於上故知當從甲

而熱妄見而妄言

足陽明脉起於鼻交頸中下循鼻外入上齒中還出俠口環脣下交承漿却循頤後

下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循

髮際至額顙其支別者從大迎前下人迎

循喉嚨入缺盆下鬲脣胃絡脾其在行從

缺盆下乳內廉下俠齊入氣街中其支別

者起胃下口循腹裏下至氣街中而合以

下脾抵伏菟下入膝骻中下循筋外廉下

足跗入中指內間其支別者下膝三寸而

別以下入中指外間其支別者跗上入大

指間出其端故厥如是也癲一為巔非

少陽之厥則暴聾煩腫而熱脹痛脝不可以

運

足少陽脉起於目銳眞上交出手少陽

之後入缺盆其支別者從耳後入耳中出

走耳前至目銳眞後其支別者目銳眞下

大迎合手少陽於頸下加頰車下頸合缺

盆以下胷中貫鬲絡肝屬膽循脇裏出氣

足厥陰脉去內踝一寸上踝入寸交出太

陰之後上脣內廉循股陰入昆中下環陰

街繞昆際橫入髀厥中其直行者從缺盆

下接循胷過季脂下合髀厥中以下循髀

陽出膝外廉下入外輔骨之前直下抵絕

骨之端下出外踝之前循足跗出小指次

指之端故厥如是

太陰之厥則腹滿脹脹後不利不欲食食則

嘔不得卧

足太陰脉起於大指之端上膝股內前廉

入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌本散舌下

其支別者復從胃別上鬲注心中故厥如

是

少陰之厥則口乾渴赤腹滿心痛

足少陰脉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱

其直行者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨

俠舌本其支別者從肺出絡心註腎中故

厥如是

厥陰之厥則少腹腫痛腹脹溼溲不利好卧

屈膝陰縮腫脳內熱

足厥陰脉去內踝一寸上踝入寸交出太

陰之後上脣內廉循股陰入昆中下環陰

器抵小腹俠胃屬肝絡膽上青高故厥如是矣。府內熱一本云府外熱傳寫行書內外誤也。

盛則寫之虛則補之不盛不虛以經取之不盛不虛謂邪氣未盛真氣未虛如是則

以穴俞經法留乎多少而取之

太陰厥逆脈急牽心痛引腹治主病者

足太陰脉起於大指之端循指內側上內

踝前廉上脇內循脛骨後上膝股內前廉

入腹其支別者復從胃別上鬲注心中故

○脈急攣心痛引腹也太陰之脉行有左右

候其有過者當發取之故言治主病也○

新校正云詳從太陰厥逆至篇末全元起

本在第九卷王氏移於此

少陰厥逆虛滿嘔下泄清治主病者

以其脉從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨故

如是厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉譖言

新校正云按全元起云譖言者氣虛獨言也

### 治主病者

以其脉循股陰入髓中環陰器復上循喉

龍之後絡舌本故如是○新校正云按甲

乙經厥陰之經不絡舌本王氏註刺熱篇

刺腰痛篇并此三注俱云絡舌本又注風

論辨論各不云絡舌本王注自有異同當

以甲乙經爲正

三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死

三陰絕故三日死

○太陽厥逆僵仆嘔血善効治主病者

以其脉起目內眞又循脊絡腦故如是僵

切居良仆音付

少陽厥逆機闊不利機闊不利者腰不可以行項不可以顧

以其脉循頭下繞尾際橫入髀厥中故如

是厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉譖言

發腸癰不可治驚者死

足少陽脉貫鬲絡肝屬膽循腸裏出氣街

發腸癰則經氣絕故不可治驚者死也

陽明厥逆喘欬身熱善効効嘔血

以其脉循喉龍入缺盆下鬲屬胃絡脾故

如是手太陰厥逆虛滿而勞善嘔沫治主病者

手太陰脉起於中焦下絡大腸還循胃口

上鬲屬肺故如是

手心主少陰厥逆心痛引嘔身熱死不可治

手心主脉起於胷中出屬心包手少陰脉

其支別者從心系上俠咽喉故如是

手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可

以俛仰治主病者

○手太陽脉支別者從缺盆循頸上頰至日

銳背却入耳中其支別者從頰上頸抵鼻

至目內眞故耳聾泣出項不可以顧也腰

不可以俛仰脉不相應恐古錯簡文

手陽明少陽厥逆發喉嚨腫腫瘡治主病者

支別者從膻中上出缺盆上項故如是○

新校正云按全元起本痓作痓

黃帝內經素問補註釋文卷之二十七