

黃帝內經素問補註釋文卷之二十八 宜四

唐太僕今啓玄子王冰次註

宋光祿卿直祕閣林億等校正
宋守尚書也田郎孫光重改誤

病能論篇

血氣壯盛而熱內薄之兩氣合熱故結為
癰也
帝曰善人有卧而有所不安者何也岐伯曰
藏有所傷及精有所之寄則安故人不能懸
其病也

五藏有所傷損及之水穀精氣有所之寄
扶其下則卧安以傷及於藏故人不能懸
其病處於空中也○新校正云按甲乙經沉
逆者水穀之海其血盛氣壯今反脉沉細
者是逆常平也○新校正云按甲乙經沉
逆作沉濤大素作沉細

○細作沉濤大素作沉細
逆者人迎甚盛甚盛則熱
謂不得仰卧也

岐伯曰肺者藏之蓋也
居高布葉四藏下之故言肺者藏之蓋也

○肺氣盛則脉大脉大則不得偃卧
動應手者

沉細為寒寒氣格陽故人迎脉盛人迎者
陽明之脉故盛則熱也人迎謂結喉傍脉

人迎者胃脉也

胃脉循喉嚨而入缺盆故云人迎者胃脉
也

逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘為癰
也

帝曰有病厥者診右脉沉而緊左脉浮而遲
言雖同曰頸癰然其皮中別異不一等也
故下云

夫癰氣之息者宜以鍼開除去之夫氣盛血

不然病主安在

不然言不沉也○新校正云按甲乙經不
然作不知

岐伯曰冬診之右脉固當沉緊此應四時左
脉浮而遲此逆四時在左當主病在腎頸關
在肺當腰痛也

以冬左脉浮而遲浮為肺脉故言頸關在
肺也腰者腎之府故腎受病則腰中痛也

帝曰何以言之岐伯曰少陰脈貫腎絡肺今
得肺脉腎為之病故腎為腰痛之病也

○左脉浮遲非肺來見以左腎不足而脉不
能沉故得肺脉腎為病也

帝曰善有病頸癰者或石治之或鍼灸治之
而皆已其真安在

言所攻則異所愈則同故問真法何所在

岐伯曰此同名異等者也

言雖同曰頸癰然其皮中別異不一等也

夫癰氣之息者宜以鍼開除去之夫氣盛血

聚者宜石而寫之此所謂同病異治也

息癥也死肉也石破石也可以破大癰出
膿今以鉗針代之

帝曰有病怒狂者

新校正云按太素怒狂作善怒

此病安生岐伯曰生於陽也帝曰陽何以使

人狂

怒不慮禍故謂之狂

岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病

名曰陽厥

言陽氣被折鬱不散也此人多怒亦曾因
暴折而心不疏暢故爾如是者皆陽逆躁

極所生故病名陽厥

帝曰何以知之岐伯曰陽明者帝動巨陽少
陽不動不動而動大疾此其候也

言頸項之脉皆動不止也陽明常動者動
於結喉傍是謂人迎氣合之分位也若以
少陽之動動於曲頸下是謂天窓天牖之
分位也若巨陽之動動於項兩傍大筋前
陷者中是謂天柱天容之分位也不應常

動而反動甚動當病也○新校正云詳王

註以天窓為少陽之分位天容為太陽之
分位按甲乙經天窓乃太陽脈氣所發天
容乃少陽脈氣所發一位交互當以甲乙

經為正也

帝曰治之奈何岐伯曰奪其食即已夫食入

於陰長氣於陽故奪其食即已

校正云按甲乙經奪作衰太素同也
食少則氣衰故節去其食即病自止○新
使之服以生鐵洛為飲

夫生鐵洛者下氣疾也

新校正云按甲乙經鐵洛作鐵落為飲作
爲後飯

之或爲人傳文誤也鐵洛味辛微溫平主
治下氣方俗或呼爲鐵粟非是生鐵液也

帝曰善有病身熱解憤汗出如浴惡風少氣
此爲何病岐伯曰病名曰酒風

飲酒中風者也風論曰飲酒中風則爲漏

風是亦名漏風也夫極飲者陽氣盛而腠理

踈玄府開發陽盛則筋痿弱故身體解

惰也腠理踈則風內攻玄府發則氣外泄

故汗出如浴也風氣外薄膚腠理開汗多
內虛薄熱熏肺故惡風少氣也因酒而病
故曰酒風從肺切解吉介指

帝曰治之奈何岐伯曰以澤渴木各十分麋

術五分合以三指撮爲後飯

木味苦溫平主治大風止汗麋術味苦寒
平主治風濕筋痿澤渴味甘寒平主治風
濕益氣由此功用方故先之飯後藥先謂
之後飯

所謂深之細者其中手如鍼也摩之切之聚。

者堅也博者大也上經者言氣之通天也下

經者言病之變化也金匱者決死生也揆度
者切度之也奇恒者言奇病也所謂奇者使

奇病不得以四時死也恒者得以四時死也
新校正云禁楊上善云得病傳之至於勝

時而死此爲恒中生喜怒令病次傳者此
爲奇所謂揆者方切求之也言切求其脉理也度
者得其病處以四時度之也

凡言所謂者皆釋未了義今此所謂尋前後經文悉不與此篇義相接似今數句少成文義者終是別釋經文世本既闕第七二篇應彼闕經錯簡文也古文斷裂誤續於此

奇病論篇

黃帝問曰人有重身九月而瘡此爲何也

重身謂身中有身則懷任者也瘡謂不得

言語也任娠九月足少陰脉養胎約氣斷

則瘡不能言也

○岐伯對曰胞之絡脉絕也

絕謂脈斷絕而不通流而不能言非天具

之氣斷絕也

帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰

之脈貫腎繫舌本故不能言

○少陰腎脉也氣不營養故舌不能言

帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復

十月胎去胞絡復通腎脉上營故復舊而言也

刺法曰無損不足益有餘以成其疹

瘳謂久病反法而治則胎死不去遂成父固之瘳病

然後調之

新校正六按甲乙經及太素無此四字按全元起注云所謂不治者其身九月而瘡

身重不得爲治須十月滿生後復如常也

然後調之則此四字本金元起注文誤書於此當刪去之

所謂無損不足者身羸瘦無用鏡石也

○任娠九月筋骨瘦勞力少身重又拒於穀

精出而病獨擅中故曰瘳成焉

○故身形羸瘦不可以鏡石傷也鏡石切

無益其有餘者腹中有形而泄之泄之則精

胎約胞絡腎氣不通因而泄之腎精隨出

精液內竭胎則不全胎死腹中著而不去

○由此獨擅故瘳成焉

帝曰病名曰息積此不妨於食不可灸刺

大腸廣腸也經說大腸當言迴腸也何者

靈樞經曰迴腸當齊右環回周葉積而下

廣腸附脊以受迴腸左環葉積上下辟大

氣逆息難故名息積也氣不在胃故不妨於食也灸之則大熱內燔氣化爲風刺之則必寫其經轉成虛敗故不可灸刺是可積爲導引使氣流行火以藥攻內消瘀積則可矣若獨憑其藥而不積爲導引則藥

亦不能獨治之也

帝曰人有身體髀股脣皆腫環齊而痛是爲何病岐伯曰病名曰伏梁

以衝脈病故名曰伏梁然衝脈者與足少

陰之絡起於腎下出於氣街循陰股內廉

斜入膚中循脣骨內廉並足少陰經下入

內踝之後入足下其上行者出脣下同身

寸之三寸入足少陰經上循腹各行

會於咽喉故身體髀脣脣繞脣而痛名曰

伏梁環謂圓繞如環也

此風根也其氣溢於大腸而著於肓肓之原

在齊下故環齊而痛也

大腸廣腸也經說大腸當言迴腸也何者

靈樞經曰迴腸當齊右環回周葉積而下

廣腸附脊以受迴腸左環葉積上下辟大

尋此則是迴腸非應言大腸也然大腸迴

腸俱與肺合從合而命故通曰大腸也

不可動之動之爲水溺瀉之病也

以衝脉起於腎下出於氣街其上行者起

於胞中上出齊下關元之分故動之則爲

水而溺瀉也動謂齊其毒藥而擊動之使

其大下也此一問答之義與腹中論同以

爲奇病故重出於此

帝曰人有尺脉數甚筋急而見此爲何病

筋急謂掌後尺中兩筋急也脉要精微論

曰尺外以候腎尺裏以候腹中今尺脉數

急脉數爲熱熱當筋緩反尺中筋急而見

腹中筋當急故問爲病乎靈樞經曰熱即

筋緩寒即筋急

岐伯曰此所謂疹筋是人腹必急白色黑色

見則病甚

腹急謂俠脅腎筋俱急以尺裏候腹中故

見尺中筋急則必腹中拘急矣色見謂見

於面部也夫相五色者白爲寒黑爲寒故

二色見病彌甚也

帝曰人有病頭痛以數歲不已此安得之名
爲何病

頭痛之疾不當踰月數年不愈故怪而問
之

岐伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦

爲主腦逆故令頭痛齒亦痛

夫腦爲髓主齒是骨餘腦逆反寒骨亦寒
人故令頭痛齒亦痛

病名曰厥逆帝曰善

全注人先生於腦緣有腦則有骨髓齒者
○骨之本也

帝曰有病口甘者病名爲何何以得之岐伯
曰此五氣之溢也名曰脾瘅

病謂熱也脾熱則四藏同稟故五氣上溢

也生因脾熱故曰脾瘅

夫五味入口藏於胃脾爲之行其精氣津液

在脾故人口甘也

脾熱內津液在脾胃化餘精氣隨溢
口通脾氣故口甘津液在脾是脾之濕

此肥美之所發也

新校正云按太素發作致

此人必數食甘美而多肥也肥者令人內熱

甘者令人中滿故其氣上溢轉爲消渴

食肥則腠理密陽氣不得外泄故肥令人

內熱甘者性氣和緩而發散逆故甘令人

中滿然內熱則陽氣炎上炎上則欲飲而

嗌乾中滿則陳氣有餘則脾氣上溢

故曰其氣上溢轉爲消渴也陰陽應象大

論曰辛甘發散爲陽靈樞經曰甘多食之

令人悶然從中滿以生之○新校正云按

甲乙經消渴作消瘅

治之以蘭除陳氣也

蘭謂蘭草也神農曰蘭草味辛熱平利水

道辟不祥晉中廢辟也除謂去也陳謂久

也言蘭除陳久甘肥不化之氣者以辛能

發散故也藏氣法時論曰辛者散也○新

校正云按本草蘭性平不言熱

帝曰有病口苦取陽陵泉口苦者病名爲何

何以得之岐伯曰病名曰膽瘅

亦謂熱也膽汁味苦故曰苦○新校正云

按全元起本及太素無口苦取陽陵泉六字詳前後文勢疑此爲誤

夫肝者中之將也取決於膽咽爲之使

靈蘭秘典論曰肝者將軍之官謀慮出焉

膽者中正之官決斷出焉肝與膽合氣性

相通故諸謀慮取決於膽咽膽相應故咽爲使焉○新校正云按甲乙經曰膽者中精之府五藏取決於膽咽爲之使疑此文誤

○此人者數謀慮不決故膽虛氣上溢而口爲之苦治之以膽募俞

胃腹曰募背脊曰俞膽募在乳下二筋外期門下同身寸之五分俞在脊第十椎下兩傍相去各同身寸之一寸半治在陰陽十二官相使中

言治法具於彼篇今經已亡

帝曰有癰者一日數十溲此不足也身熱如炭頭膚如格息氣逆者是陽氣太盛於外陰氣不足故有餘也○新校正云詳此十五字舊作文寫按甲乙

經太素並無此文再詳乃是全元起注後人誤書於此今作注書

太陰脉細微如髮者此不足也其病安在名爲何病

瘡小便不得也溲小便也頭脣如格言頭

與胷脣如相格拒不順應也人迎躁盛謂結核兩傍脉動盛滿急數非常躁速也胃脉也太陰脉細微如髮者謂手大指後同身寸之一寸骨高脉動處脉則肺脉也此

正手太陰脉氣之所流可以候五藏也

○岐伯曰病在太陰其盛在胃頗在肺病名曰厥死不治

○外五有餘者一身熱如炭二頭脣如格三

人迎躁盛四喘息五氣逆也內二不足者有餘也二不足者亦病氣之不足也今外得五有餘內得二不足此其身不表不裏亦正死明矣

○余二不足岐伯曰所謂五有餘者五病之氣

人迎躁盛四喘息五氣逆也內二不足者

一病瘡一日數十溲二太陰脉微細如髮

夫如是者謂其病在表則內有二不足謂其病在裏則外得五有餘表裏既不可馮

補寫固難爲法故曰此其身不表不裏亦死明矣

○正死明矣

帝曰人生而有病顛疾者病名曰何安所得之

夫百病者皆生於風雨寒暑陰陽喜怒也然始生有形未犯邪氣已有顛疾宜邪氣

素傷即故問之顛謂上顛則頭首也

氣逆陵於胃而爲是主使人迎躁盛也故曰病在太陰其盛在胃也以喘息氣逆故

云顛亦在肺也病因氣逆證不相應故病名曰厥死不治也

○此所謂得五有餘二不足也帝曰何謂五有

精氣謂陽之精氣也

黃帝內經素問補註釋文卷之二十九 宜五

帝曰有病厖然如有水狀切其脉大緊身無痛者形不瘦不能食食少名爲何病

厖然謂面目浮起而色雜也大緊謂如弓

弦也大即爲氣緊即爲寒寒氣內薄而反

無痛與衆別異常故問之

岐伯曰病生在腎名爲腎風

十三

脉如弓弦大而且緊勞氣內稽寒復內爭

勞氣薄寒故化爲風風勝於腎故曰腎風

腎風而不能食善驚驚已心氣痿者死

腎水受風心火壅弱火水俱困故必死

○
帝曰善

肝滿腎滿肺滿皆實即爲腫

滿謂肺氣滿實也腫謂癰腫也藏氣滿乃

如是

肺之雍喘而兩胠滿

○ 肺藏氣而外主息其脉支別者從肺系橫出肺下故喘而兩胠滿也○新校正云詳

○ 肺雍肝雍腎雍甲乙經俱作脾

○ 肝雍兩胠滿卧則驚不得小便

○ 驚駭故卧則驚

○ 貢肝鬲布脇肋故胠滿不得小便也肝主

○ 肝之脉循股陰入髓中環陰器抵少腹上

○ 腹滿臥則驚不得小便

○ 新校正云按甲乙經脚下作胠下脚當作

○ 胃不得言脚下至少腹也

○ 脾有大小脾肝大跛易偏枯

衝脈者經脉之海與少陰之絡俱起於腎

下出於氣街循陰股內廉斜入脣中循脣

骨內廉並少陰之經下入內踝之後入足

下其上行者出齊下同身寸之三寸故如

是若血氣變易爲偏枯也

心脉滿大瘤瘛筋掣

心脉滿大則肝氣下流熱氣內薄筋乾血

涸故瘤瘛而筋掣

肝脉小急瘤瘛筋掣

○ 肝養筋內藏血肝氣受寒故瘤瘛而筋掣

○ 脉小急者寒也

○ 肝脉驚暴有所驚駭

○ 驚謂馳驚言其迅急也陽氣內薄故發爲

○ 驚也

○ 脉不至若瘡不治自己

○ 肝氣若厥厥則脉不通厥退則脉復通矣

○ 又其脉布脇肋循喉嚨之後故脉不至若

○ 痛不治亦自己

○ 腎脉小急肝脉小急心脉小急不鼓皆爲瘕

○ 小急爲寒甚不鼓則血不流血不流而寒