

孫真人備急千金要方卷之七

分二

宋朝奉郎中大夫少卿光祿勳散騎常侍孫思邈

婦人方

赤白帶下崩中漏下第三論方

論曰諸方說三十六疾者十二癥九痛七害

五傷三痛不通是也何謂十二癥是所下之

初一日狀如膏二日如黑血三日如紫汁四

日如赤肉五日如膿痂六日如豆汁七日如

瘞八日如凝血九日如清血血似水十日如

如未泔十一日如月浣乍前乍却十二日經

度不應期也何謂九痛一日陰中痛傷二日

陰中淋瀝痛三日小便即痛四日寒冷痛五

日經來即腹中痛六日氣滿痛七日汁出陰

中如有蟲嚙痛八日脇下分痛九日腰膝痛

何謂七害一日窮孔痛不利二日中寒熱痛

三曰小腹急堅痛四曰藏不仁五曰子門不

三曰經水閉塞病有異同具治之方
白雲圓治女人三十六疾方又方

白堊

黃連

黃芩

石膏

細辛

白石脂

葶本

龍骨

當歸

瞿麥

甘草

附子

人參

甘皮

芍藥各十

茯苓

白飲

杜蠟

禹餘糧

烏賊骨

大黃已上各

右二十一味為末蜜和丸如梧子大空腹

飲服十九日再不知加之二十日知一月

百病除若十二癥倍牡蠣禹餘糧烏賊骨

白石脂龍骨若九痛倍黃連白飲甘草當

歸若七害倍細辛葶本甘皮加椒茶萸各

一兩若五傷倍大黃石膏瞿麥若三癥倍

人參加赤石脂礬石巴戟天各半兩合藥

時隨病增減之
治女人腹中十二疾一日經水不時二日經

苦痛如刺九日陰中寒十日子門相引痛十

一日經來凍如葵汁狀十二日腰急痛凡此

十二病得之時因與夫卧起月經不去或卧

濕冷地及以冷水洗浴當時取快而後生百

病或瘡癢未瘥便合陰陽及起早作勞衣單

廣薄寒從下入方

赤石脂

乾薑

桂心

防風

右十一味為末蜜和丸如梧子大每日空

心酒服十九日三不知稍加以知為度

白方

白石脂

烏賊骨

禹餘糧

杜蠟

赤石脂

乾地黃

乾薑

龍骨

桂心

石韋

白飲

芍藥

黃連

附子

當歸

黃芩

蜀椒

細辛

葶本

甘皮

茶萸

大黃

石膏

鐘乳 白芷 芎藭

甘草各半

右二十二味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒下十五丸日再一方有黃蘗半兩小牛角鯁散治帶下五貴一曰熱病下血二曰寒熱下血三曰經脉未斷為房事則血漏四曰經來舉重傷任脉下血五曰產後臍間經利五貴之病外實內虛方

牛角鯁一枚洗 鹿茸

馬餘糧 當歸 乾薑

續斷各二 阿膠三 烏賊骨

龍骨各一 赤小豆升二

右十味治下篩空腹以酒服方寸七日三千金翼無鹿茸烏賊骨

龍骨散治溽下十二病絕產一曰白帶二曰

赤帶三曰經水不利四曰陰胎五曰子藏堅

六曰藏癖七曰陰陽患痛八曰內強九曰腹

寒十曰藏閉十一曰五藏酸痛十二曰夢與

鬼交宜服之溽下一本

龍骨三 黃蘗 半夏

寬中黃土 桂心 乾薑各二

石膏 滑石各一 烏賊骨

代赭各四 白殭蠶五

右十一味治下篩酒服方寸七日三白多者加烏賊骨殭蠶各二兩亦多者加代赭五兩小腹冷加黃蘗二兩子藏堅加乾薑桂心各二兩已上各隨病增之服藥三月有子即住藥藥太過多生兩子當審方取好藥寒婦童女不可妄服

治女人帶下諸病方

大黃各三 附子 茯苓

杜蘅 杜丹 桔梗

葶藶各三 厚朴 芎藭

人參 當歸 蟲蟲

蜀椒 吳茱萸 柴胡

乾薑 桂心各半 細辛二兩

右十八味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒服二丸不知加之以腹中溫溫為度

一本有麻子三兩澤前

治帶下百病無子服藥十四日下血二十日

下長蟲及青黃汁出三十日病除五十日肥

白芍 大黃破如豆粒 柴胡

朴硝各一 芎藭五 乾薑

蜀椒各一 茯苓如雞子

右七味為末蜜丸如梧子大先食米飲服七丸不知加至十九以知為度

治帶下方

枸杞根斤一 生地黃斤五

右二味以酒一斗煮取五升分為三服水煮亦得

治婦人及女子赤白帶下方

馬餘糧 當歸 芎藭各一

赤石脂 白石脂 阿膠

龍骨 石膏六銖 烏賊骨

黃蘗 白欬 黃芩一兩

續斷 桑耳 牡蠣各一

右十五味為末蜜丸如梧子大空心飲下十五丸日再加至三十九丸為度

白馬蹄圓治女人下焦寒冷成帶下赤白澆

方

白馬蹄

龜甲

鯉魚甲

龜甲

蜀椒各二

磁石

甘草

杜仲

草薢

當歸

續斷

芎藭

禹餘糧

桑耳

附子各二

右十五味為末蜜丸梧子大以酒服十九

加至三十九日三服一本無

白馬駝散治帶下方下白者原白馬駝下赤者赤馬駝也

白馬駝

龜甲

龜甲各十八

牡蠣一兩十枚

右四味治下篩空心酒下方寸七日三服

加至一七半

治五色帶下方

服大豆紫湯日三服方見別卷

又方燒馬左蹄為末以酒服方寸七日三服

又方燒狗頭和毛皮骨為末以酒服方寸七

又方煮甄帶汁服一杯良

又方燒馬蹄底護乾為末以酒服之方寸七

日三

雲母芎藭散衛公治五崩身瘦欬逆煩滿少

氣心下痛面生瘡腰痛不可俯仰陰中腫如

有瘡狀毛中瘰時痛與子藏相通小便不利

常拘急頭眩頭項急痛手足熱氣逆衝急心

煩不得卧腹中急痛食不下吞醋噫苦上下

腸鳴瀉下赤白青黃黑汁大臭如膠汚衣狀

皆是內傷所致中寒即下白熱即下赤多飲

即下黑多食即下黃多藥即下青或喜或怒

心中常恐或憂勞便發動大惡風寒方

雲母

芎藭

代赭

東門邊木燒各一兩

白蠟各六

烏賊骨

白堊

蝟皮各六

鱉甲通甲一作

桂心

伏龍肝

生鯉魚頭各十枚

右十二味治下篩酒服方寸七日三夜一

方有龍骨一方有龍骨

慎火草散治崩中漏下赤白青黑腐臭不可

近令人面黑無顏色皮骨相連月經失度往

來無常小腹弦急或苦絞痛上至心兩脇腫

脹食不生肌膚令人偏枯氣息乏少腰背痛

連脇不能久立每嗜卧困懶又方見後

慎火

白石脂

禹餘糧

龜甲

乾薑

細辛

當歸

芎藭

石斛

芍藥

杜蠟各二

黃連

薔薇根皮

乾地黄各四

熟艾

桂心各一

右十六味治下篩空腹酒服方寸七日三

稍加至二七若寒多者加附子椒熱多者

加知母黃芩各一兩白多者加乾薑白石

脂赤多者加桂心代赭各二兩

禹餘糧圓治崩中赤白不絕因篤方

禹餘糧

白馬蹄各十

龍骨各三

鹿茸各二

烏賊魚骨各一

右五味為末蜜丸梧子大以酒服二十九

日再以此為度

增損禹餘糧圓治女人勞損因成崩中狀如

月經來去多不可禁止積日不斷五臟空虛

失色黃瘦崩竭暫止少日復發不耐動搖小

勞輒劇治法且宜與湯未宜與此丸也發時

服湯減退即與此丸若是疾久可以長與此方

禹餘糧 龍骨 人參
 桂心 紫石英 烏頭
 寄生 杜仲 五味子
 遠志各二分 澤瀉 當歸
 石斛 菝葜 乾薑各三分
 蜀椒 牡蠣 甘草各一分

右十八味為末蜜丸梧子大空心酒下十九丸漸加至二十九日三服

治女人白崩及痔病方

槐耳 白欬 艾葉
 蒲黃 白芷各二分 黃耆
 人參 續斷 當歸
 禹餘糧 楮皮 茯苓
 乾地黄 蝟皮各三分 牛角鯃四分
 猪後懸蹄二十一分 白馬蹄四分

右十七味為末蜜丸每日空心酒下二十九日二加之

治婦人忽暴崩中去血不斷或如鴨肝者方

小薊根六兩 當歸 阿膠
 續斷 青竹茹 芎藭各三分
 生地黄八兩 釜月下土各四分 地榆各四分
 馬通一分 赤帶一分 白帶一分

右十味以水八升和馬通汁煮取三分分三服不止頻服三四劑未全止續服後丸方

續斷 甘草 地榆
 鹿茸 小薊根 丹參各三分
 乾地黄二兩 芎藭 赤石脂
 阿膠 當歸各一分 龜甲
 秦牛角各三兩 別一兩 栝子仁各一分

右十四味為末蜜丸梧子大空心以酒服十九日再後稍加至三十九

治女人崩中去赤白方

白馬蹄五兩 蒲黃 鹿茸
 禹餘糧 白馬著毛 小薊根

白芷 續斷各四分 人參

乾地黄 栝子仁 烏賊骨
 黃耆 茯苓 當歸各三分
 艾葉 菝葜 伏龍肝各二分

右十八味為末蜜丸如梧子大空心飲服二十九日再加至四十九

當歸湯治崩中去血虛羸方

當歸 芎藭 黃耆
 芍藥 甘草各二分 生竹茹一分

右六味以水一斗煮竹茹取六升去滓內諸藥煎取三升半分二服忌勞動

忌禁百日房事

治崩中晝夜十數行泉管所不能遮者方

芎藭八兩以酒五升煮取三升分三服不飲酒者水亦得

治崩中下血出血一斛服之即斷或月經來過多及過期不來者服之亦佳方

吳茱萸 當歸各三分 芎藭
 人參 芍藥 牡丹
 桂心 阿膠 生薑

甘草各二兩 半夏八兩 麥門冬升一

右十二味以水一斗煮取三升分爲三服

治暴崩中去血不止方

牡蠣各二兩 兔骨各二兩

右二味治下篩酒服方寸七日三

治女人白崩方

芎藭 桂心 阿膠

赤石脂 小蘗根各二兩 乾地黄四兩

伏龍肝如雞子大七枚

右七味以酒六升水四升合煮取三升去滓內膠令烊盡分三服日三千金翼止六水

伏龍肝湯治崩中去赤白或如豆汁方

伏龍肝如彈丸七枚 生薑五兩

生地黃四升一兩 甘草十一兩

艾葉 赤石脂 桂心各二兩

右七味以水一斗煮取三升分四服日三夜一

大牛角中人散治積冷崩中去血不止腰背

痛四肢沉重虛極方

牛角仁燒一升 續斷 乾地黄

桑耳 白朮 赤石脂

礬石 乾薑 附子

龍骨 當歸各三兩 人參一兩

蒲黃 防風 禹餘糧各二兩

右十五味治下篩以溫酒未食服方寸七日三不知稍加

治崩中去血積時不止起死方

肥羊肉斤三 乾薑 當歸各三兩

生地黃升二

右四味以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黃汁及諸藥煮取三升分四服即斷尤宜羸瘦人服之

生地黃湯治崩中漏下日去數升方

生地黃斤一 細辛三兩

右二味以水一斗煮取六升服七合久服佳

治崩中漏下赤白不止氣虛竭方

龜甲 牡蠣各三兩

右二味治下篩酒服方寸七日三

又方燒亂髮酒和服方寸七日三

又方

桑耳二兩 鹿茸十八兩

右二味以醋五升漬炙燥漬盡爲度治下篩服方寸七日三

又方燒鹿角爲末酒服方寸七日三

又方燒桃核爲末酒服方寸七日三

又方

地榆 知母

右二味各指大長一尺者以醋三升東向竈中治極濃去滓服之

又方桑木中場屎燒灰酒服方寸七

治崩中下血羸瘦少氣調中補虛止血方

澤蘭 蜀椒六兩 藜蘆

栝子仁 山茱萸 厚朴各十兩

乾地黄 杜鵑各一兩 代赭

桂心 防風 細辛

乾薑各一兩 甘草

當歸

芎藭各一兩 燕莢半兩

孫真人備急千金要方 卷七

右十七味治下篩空心温酒服方寸七日
三神良一方加白芷龍骨各十八銖人參
一兩十八銖為二十味

治崩中方

白茅根斤三 小薊根斤五

右二味以水五斗煎取四斗稍服
之外並用酒煎

丹參酒治崩中去血及產餘疾方

丹參 艾葉 地黃
忍冬 地榆各五斤

右五味剉先洗白熟春以水漬三宿出津
煮取汁以黍米一斛炊飯釀酒酒熟啗之
初服四合後稍稍添之

牡丹皮湯治崩中血盛併服三劑即瘥方

牡丹皮 乾地黄 鮮茅各三斤
禹餘糧 艾葉 龍骨
栝菜 厚朴 白芷

伏龍肝 青竹茹 芎藭

地榆各二斤 阿膠一斤 芍藥四斤

右十五味以水一斗五升煮取五升

分五服相去如人行十里久再服

治崩中單方

燒牛角末以酒服方寸七日三服亦治
帶下

又方桑耳燒令黑為末酒服方寸七日二服

亦治帶下

又方生薊根一斤半搗取汁温服亦可酒煮
服之

又方羊脛一具以酢煮去血服之即止忌猪
魚鮮滑物犯之便死亦治帶下

治白崩方

灸小腹橫文當臍孔直下百壯又灸內
踝上三寸左右各百壯

論曰治漏血不止或新傷胎及產後餘血不
消作堅使胞門不開淋瀝去血經踰日月不
止者未可以諸斷血湯宜且與牡丹丸散等

待血堅消便停也堅血消者所去淋瀝便自
止亦漸變消少也此後有餘傷毀不復處此
乃可作諸主治耳婦人產乳去血多傷胎去
血多崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去血

多未止心中懸虛心悶眩胃頭重目暗耳聾

滿舉頭便悶欲倒宜且煮當歸芎藭各三兩

以水四升煮取二升去滓分二服即定展轉
續次合諸湯治之

白朮圓治女人三十六疾胞中病漏下不絕

方又方

邯鄲白朮 禹餘糧 白芷

白石脂 乾薑 龍骨

桂心 瞿麥 大黃

石韋 白斂 細辛

芍藥 甘草 黃連

附子 當歸 茯苓

鍾乳 蜀椒 黃芩各半斤

牡蠣 烏賊骨各十斤

右二十三味為末蜜丸梧子大空心酒服

五九日再服不知加至十九

治女人漏下或瘥或劇常漏不止身體羸瘦
飲食減少或赤或白或黃使人無子者方

牡蠣 伏龍肝 赤石脂

白龍骨 桂心 烏賊骨

禹餘糧各等

右七味治下篩空心酒服方寸七日二白
多者加牡蠣龍骨烏賊骨赤多者加赤石
脂禹餘糧黃多者加伏龍肝桂心隨病加
張大仲同亦療崩中時
之後無白龍骨以粥飲服

治婦人漏下不止散方

鹿茸 阿膠各三 烏賊骨

當歸各二 蒲黃一

右五味治下篩空心酒服方寸七日夜
再服

治女人產後漏下及痔病下血方

礬石一 附子一

右二味為末蜜丸如梧子大空心酒下二
九日三稍加至五九數日瘥能百日服之
永斷

芩芻湯治帶下漏血不止方

芩芻 乾地黄 黃耆

芍藥 吳茱萸 甘草各二

當歸 乾薑各三

右八味以水一斗煮取三升分三服

若月經後因有赤白不止者除地黄吳茱
萸加杜仲人參各二兩

治漏下去血不止方

取水蛭治下篩酒服一錢許日二惡血
消即愈

治漏下神方
取槐子燒末酒服方寸七日三立瘥

治漏下去黑方

乾椽 麻黃 細辛

桂心各一 甘草半

右五味治下篩以指撮著末飲中服之

治漏下去赤方

白朮二 白薇半 黃蘗二

右三味治下篩空心酒服方寸七日三
治漏下去黃方

黃連 大黃 桂心各半

黃芩 麝香 乾地黄各六

右六味治下篩空心酒服方寸七日三

治漏下去青方

大黃 黃芩 白薇各半

桂心 牡蠣各六

右五味治下篩空心酒服方寸七日三

治漏下去白方

鹿茸一 白欬十八 狗脊半

右三味治下篩空心米飲服方寸七日三

治女子漏下積年不斷困篤方

取鵲重巢柴燒灰作末服方寸七日三
服三十日愈甚良重巢者去年在巢中
產今年又在上作重巢產者是也

馬通湯治漏下血積月不止方

赤馬通汁一升取新馬屎絞取
汁乾者水浸絞取汁

生艾葉 阿膠各三 當歸

乾薑各二 好墨半

右六味以水八升酒二升煮取三升
去滓內馬通汁及膠微火煎取二升分再
服相去如人行十里久

馬蹄屑湯治白漏不絕方

白馬蹄 赤石脂各五 禹餘糧

烏賊骨 龍骨 牡蠣各四

附子 乾地黄 當歸各三

甘草^{二兩} 白殭蠶^{兩一}
 右十一味咬咀以水二斗煮取九升分六服日三
 馬蹄圓治白漏不絕方

白馬蹄 禹餘糧^{各四兩} 龍骨^{三兩}

烏賊骨 白殭蠶 赤石脂^{各二兩}

右六味為末蜜丸梧子大酒服十九不知

加至三十九

慎火草散治漏下方^{又方}

慎火草^{十兩} 芫黃^兩 當歸^兩 鹿茸

阿膠^{各四兩} 龍骨^兩

右五味治下篩先食酒服方寸七日三

蒲黃散治漏下不止方

蒲黃^{半升} 鹿茸 當歸^{各二兩}

右三味治下篩酒服五分七日三不知稍

加至方寸七

灸法

女人胞漏下血不可禁止灸關元兩傍相去

二寸

女人陰中痛引心下及小腹絞痛腹中五寒

灸關儀百壯穴在膝外邊上一寸宛宛中是
 女人漏下赤白及血灸足太陰五十壯穴在
 內踝上三寸足太陰經內踝上三寸名三陰
 交

女人漏下赤白月經不調灸交儀三十壯穴

在內踝上五寸

女人漏下赤白灸營池四穴三十壯穴在內

踝前後兩邊池中脉上一名陰陽是

女人漏下赤白四肢酸削灸漏陰三十壯穴

在內踝下五分微動脚脉上

女人漏下赤白泄注灸陰陽隨年壯三報穴

在足拇趾下屈裏表頭白肉際是

月經不調第四方^{灸法}

白堊圓治婦人月經一月再來或隔月不來

或多或少淋瀝不斷或來而腰腹痛虛吸不

能食心腹痛或青黃黑色或如水舉體沉重

方

白堊 白石脂 牡蠣

禹餘糧 龍骨 細辛

烏賊骨^{各一兩} 當歸^兩 芍藥

黃連 茯苓 乾薑
 桂心 人參 瞿麥
 石韋 白芷 白欬
 附子 甘草^{各一兩} 蜀椒^兩

右二十一味為末蜜丸如梧子大空心酒

下二十九日三至月候來時日四五服為

佳

桃人湯治產後及墮身月水不調或淋瀝不
 斷斷後復來狀如瀉水四體虛吸不能食腹

中堅痛不可行動月水或前或後或經月不

來舉體沉重惟欲眠時多思酸物方

桃仁^{五十枚} 澤蘭 甘草

芫蕒 人參^{各二兩} 牛膝

桂心 牡丹皮 當歸^{各三兩}

芍藥 生薑 半夏^{各四兩}

地黃^兩 蒲黃^{七合}

右十四味咬咀以水二斗煮取六升半分

六服

杏人湯治月經不調或一月再來或兩月三

月一來或月前或月後閉塞不通方

杏仁^二 桃仁^一 大黃^三
 水蛭^十 蟲蟲^十
 右五味以水六升煮取二升分三服
 一服當有物隨大小便有所下下多者止
 之少者勿止盡三服

大黃朴硝湯治經年不利胞中有風冷
 所致宜下之方

大黃^二 牛膝^{各五} 朴硝^二
 牡丹^一 甘草^一 紫苑^{各三}
 代赭^一 桃仁^一 蟲蟲^一
 水蛭^一 乾薑^一 細辛^一

芒硝^{各二} 麻仁^五
 右十四味以水一斗五升煮取五升
 去滓內消令烱分五服五更為首相去一
 炊頃自下後將息忌見風

茱萸蟲湯治久寒月經不利或多或少方
 吳茱萸^{升三} 蟲蟲^一 水蛭^一
 麩蟲^一 牡丹^{各一} 生薑^一
 小麥^{半夏^{各一}} 大棗^{二十}
 桃仁^{五十} 人參^一 牛膝^{各三}

桂心^六 甘草^一 芍藥^二
 右十五味以酒一斗水二斗煮取一
 斗去滓適寒溫一服一升日三不能飲酒
 人以水代之湯欲成乃內諸蟲不耐藥者
 飲七合

抵虎湯治月經不利腹中滿時自減并男子
 膀胱滿急方

虎掌^{千金翼} 大黃^{各二} 桃仁^{三十}
 水蛭^{二十}
 右四味以水三斗煮取一升盡服之當下
 惡血為度

七葉圓治月經不利手足煩熱腹滿默默不
 欲寤心煩方

大黃^一 前胡^一 芒硝^{各五}
 葶藶^一 蜀椒^六 生薑^一
 芎藭^八 茯苓^{十五} 杏仁^九
 桃仁^{二十} 水蛭^{半合} 蟲蟲^一
 右十二味為末蜜丸梧子大空腹飲服七
 九日三不知加一倍
 方有麩蟲牡丹各二
 兩為十
 四味

桃人散治月經來繞臍痛上衝心胸往來寒
 熱如瘧症狀方

桃仁^{五十} 麩蟲^{二十} 桂心^五
 茯苓^一 薏苡仁^一 牛膝^一
 代赭^{各二} 大黃^一

右八味治下篩宿勿食溫酒服一錢七日
 三

治月經往來腹腫腰痛方
 廣蟲^四 蜀椒^一 乾薑^{各六}
 大黃^一 女青^一 桂心^一

右七味治下篩取一刀圭先食酒服之日
 三十日微下善養之
 治月經不調或月頭或月後或如豆汁腰痛
 如折兩脚疼胞中風寒下之方

大黃^一 朴硝^{各四} 牡丹^三
 桃仁^一 人參^一 陽起石^一
 茯苓^一 甘草^一 水蛭^一
 蟲蟲^{各二}
 右十味以水九升煮取三升去滓內

朴硝令烱盡分三服相去如一飯頃

陽起石湯治月水不調或前或後或多或少

午赤午白方

陽起石 甘草 續斷

乾薑 人參 桂心 各二

附子 赤石脂 伏龍肝 各二

生地黃 升

右十味以水一斗煮取三升二合分四服

日三夜一

治婦人憂恚心下支滿膈中伏熱月經不利

血氣上搶心欲嘔不可多食懈怠不能動方

大黃 芍藥 蠶蟲 各二

土瓜根 蜀椒 黃芩

白朮 乾薑 地骨皮 一作皮

芎藭 各一 桂心 乾漆 各一

右十二味為末蜜丸如梧子每服十九日

三不知加之

牛膝圓治產後月水往來乍多乍少仍復不

通時時疼痛小腹裏急下引腰身重方

牛膝 芍藥 人參

大黃 各三

當歸 芳藭 各二

麝香 水蛭 各七

蜜蟲 蟻蠃 各十枚

右十四味為末蜜丸如梧子酒服五九日

三不知稍增

又方鹿角末服之良

又方生地黃汁三升煮取二升服之

又方飲人乳汁三合善

又方燒月經衣并花水服之

又方燒白狗糞焦作末酒服方寸七日三

又方取白馬尿服一升良

治月經不斷方

船茹一斤淨洗河水四升半煮取二升

分二服

又方服地黃酒良

又方服大豆酒佳

又方燒箕舌灰酒服之

又方灸內踝下白肉際青脉上隨年壯

孫真人備急千金要方卷之七

孫真人備急千金要方卷之八九同 分三

宋朝聖即字太常少卿光祿閣校理林億等校正

少小嬰孺方上

序例第一方

論曰夫生民之道莫不以養小為大若無於

小卒不成大故易稱積小以成大詩有厥初

生民傳云聲子生隱公此之一義即是從微

至著自少及長人情共見不待經史故今斯

方先婦人小兒而後丈夫者老者則是崇本

之義也然小兒氣勢微弱醫士欲留心救療

立功難今之學者多不存意良由嬰兒在

於襁褓之內乳氣腥臊醫者操行英雄詎肯

瞻視靜言思之可為太息者矣小品方云凡

人年六歲已上為小十六歲已上為少

外臺 作十八已 三十一已上為壯 外臺 作二 五

十已上為老其六歲已下經所不載所以乳

下嬰兒有病難治者皆為無所承據也中古

有巫坊 樂源作 者立小兒願願經以占天壽

判疾病死生世相傳授始有小兒方焉逮于

晉宋江左推諸蘇家傳習有驗流於人間齊