

蒼梧道士陳元膏治一切風濕骨肉疼痛方

此方附原送甲

當歸

細辛

芎藭各一兩

桂心十五

天雄三十

生地黃三斤

白芷一兩

丹砂二兩

乾薑十斤

烏頭三兩

松脂八兩

猪肪十斤

右十二味吹咀以地黃汁漬藥一宿煎猪

肪去滓內藥煎十五沸去滓內丹砂未熟

攪用火炙手摩病上日十遍胡洽有人後千金翼有附子二十二兩為十五味附子三兩附子三十枚雄黃二兩為十五味附子後千金翼有附子二十二兩為十五味附子

大醉三升為十五味舊以與千金翼同

葉公八毒膏治卒中風毒腹中絞刺痛飛尸

入臟及魔寐不寤尸厥奄忽不知人宿食不

消溫酒服如棗核大得下止若毒氣甚咽味

閉塞不能嚥者折齒內葱葉口中以膏灌葱

葉中令下病腫者向火摩腫上若歲中多溫

欲省病及行霧露中酒服之內鼻中亦得方

蜀椒

當歸

雄黃

丹砂各二兩

烏頭

巴豆各一升

蕪白斤

莽草四兩

右八味吹咀苦酒三升漬一宿用猪脂五

斤東向竈葦薪火煎之五上五下候薙白

黃色絞去滓研雄黃丹砂如粉內之攪至

凝乃止膏成盛不津器中諸蜈蚣蛇蜂等

毒者以膏置瘡上病在外悉傅之摩之以

破除日合一方用礬石一兩蜈蚣二枚是

名八毒膏肘後不用巴豆

孫真人備急千金要方卷之二十四

孫真人備急千金要方卷之二十五 切六

宋劉宗素等本中子師允秘開經羅林傳等校正

治諸風方

論雜風狀第一

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痺

三曰風懿四曰風痺夫諸急卒病多是風初

得輕微人所不悟宜速與續命湯依輸穴灸

之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最

重也

偏枯者半身不隨肌肉偏不用而痛言不變

智不亂病在分腠之間溫針取汗益其不足

損其有餘乃可復也甲乙經云溫針取汗則巨取之

風痺者身無痛四肢不收智亂不甚言微可

知則可治甚即不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞窒室然巢源作

有舌強不能言病在臟腑先入陰後入陽治

之先補於陰後寫於陽發其汗身轉輒者生

汗不出身直者七日死巢源作身下及身人

黑一赤吐沫者不可治

風痺濕痺周痺筋痺脉痺肌痺皮痺骨痺肥



痺各有證候形如風狀得脉別也脉微澀其證身體不仁

凡風多從背五臟輸入諸臟受病肺病最急肺主氣息又冒諸臟故也肺中風者其人偃卧而胃滿短氣冒汗出者肺風之證也視

目下鼻上兩邊下行至口色白者尚可治急灸肺輸百壯服續命湯小兒減之若色黃者

此為肺已傷化為血矣不可復治其人當妄言撮空指地或自拈衣尋縫如此數日死者為急風邪所中便迷漠恍惚狂言妄語或少

氣愒愒不能復言若不求師即治宿昔而死即覺復灸肺輸及膈輸肝輸數十壯急服續

命湯可救也若涎唾出不收者既灸當並與湯也諸陽受風亦恍惚妄語與肺病相似然著緩可經久而死

肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色微有青者肝風之證也若唇色青面

黃尚可治急灸肝輸百壯服續命湯若大青黑面一黃一白者此為肝已傷不可復治數日而死

心中風者其人但得偃卧不得傾側悶亂胃絕汗出者心風之證也若唇正赤尚可治急灸心輸百壯服續命湯若唇或青或白或黃或黑者此為心已壞為水面目亭亭時悸動者不可復治五六日死日一云句

脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黃吐鹹汁出者尚可治急灸脾輸百壯服續命湯若目下青手足青者不可復治

腎中風者其人踞坐而腰痛視脇左右未有黃色如餅案大者尚可治急灸腎輸百壯服續命湯若齒黃赤髮直面上色者不可復

治

大腸中風者卧而腸鳴不止灸大腸輸百壯可服續命湯賊風邪氣所中則傷於陽陽外先受之客於皮膚傳入於孫脉孫脉滿則入

傳於絡脉絡脉滿則輸於大經中成病歸於六腑則為熱不時卧止為啼哭其脉堅大為實實者外堅充滿不可按之按之則痛也經絡諸脉傍支去者皆為孫脉也

凡風之傷人或為寒中或為熱中或為屬風

或為偏枯或為賊風故以春甲乙傷於風者為肝風以夏丙丁傷於風者為心風以四季戊己傷於風者為脾風以秋庚辛傷於風者為肺風以冬壬癸傷於風者為腎風風中五臟六腑之輸亦為臟腑之風各入其門戶所

中則為偏風風氣循風府而上則為腦風風入頭則為目風眼寒飲酒中風則為酒風入房汗出中風則為內風新沐中風則為首風

久風入房中風則為腸風外在膝理則為泄風故曰風者百病之長也至其變化乃為他病無常方為是知風者善行而數變在人肌膚中內不得泄外不得散因人動靜乃變其

性有風遇寒則食不下遇熱則肌肉消而寒熱有風遇陽風則不得汗遇陰風則汗自出肥人有風肌肉厚則難泄喜為熱中目黃瘦

人有風肌肉薄則常外汗身中寒目淚出有風過於虛腠理開則外出連凜然如寒狀覺身中有水淋狀時如竹管吹處此是其證也

有風過於實腠理閉則內伏令人熱悶是其證也

新食竟取風為胃風其狀惡風頭多汗膈下塞不通食飲不下服滿形瘦腹大失衣則憤滿食寒即洞泄新熱食充入水自瀆及冷者令人大腹為水病

因醉取風為滿風其狀惡風多汗少氣口乾

喜渴近衣則身如火燒臨食則汗流如雨骨節懈懈不欲自勞

新沐浴竟取風為首風其狀惡風而汗多頭痛

新房室竟取風為內風其狀惡風汗流沾衣

勞風之為病法在膝下使人強上而目脫嗟

出如涕惡風而振寒候之三日及五日中午

精明者是也七八日微有青黃膿涕如彈丸

大從口鼻出為善若不出則傷肺

風邪客於肌膚虛癩成風胎瘡瘡風邪入深

寒熱相搏則肉枯邪客手身入深真氣去則

偏枯邪客關節中即變筋中亦然邪淫於臟

夢臟大形小淫於腑夢臟小形大邪隨日系

入腦則目轉眩邪中精則散視見兩物風邪入

臟寒氣客於中不能發則瘡瘕瘵瘵舌緩

不時服藥針灸風逐脉流入臟使人卒瘳緩縱禁瘵致死風入陽經則狂入陰經則癩陽邪入陰病則靜陰邪入陽病則怒

若因熱食汗浴道腠理得開其風自出則覺

肉中如針刺步行運力欲汗亦如此也

凡覺肌肉中如刺皆由腠理閉邪氣閉在肌

中因欲出也宜解肌湯則善

夫目瞬動口唇動偏喎皆風入脉故須急服

小續命湯將八風散摩神明白膏丹參膏依

經針灸之

諸痺由風寒濕二氣併客於分肉之間迫切

而為沫得寒則聚聚則排分肉肉裂則痛痛

則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥

厥則他痺發發則如是此內不在臟而外未

發於皮膚居分肉之間真氣不能周故為痺

也其風最多者不仁則腫為行痺走無常處

其寒多者則為痛痺其濕多者則為著痺冷

汗濡但隨血脉上下不能左右去者則為周

痺也痺在肌中更發更止左以應左右以應

右者為偏痺也

夫痺其陽氣少而陰氣多者故令身寒從中出其陽氣多而陰氣少者則痺且熱也

諸痺風勝者則易愈在皮間亦易愈在筋骨

則難痊也久痺入深令榮衛澀經絡時踈則

不知痛

風痺病不可已者足如履冰時如入湯腹中

股脛淫灑煩心頭痛傷脾腎時嘔眩時自汗

出傷心目眩傷肝悲恐短氣不樂傷肺不出

三年死日死

太陽中風重感於寒濕則變瘵也瘵者口噤

不開背強而直如發癩之狀搖頭馬鳴腰反

折須臾十發氣息如絕汗出如雨時有脫易

得之者新產婦人及金瘡血脉虛竭小兒臍

風大人涼濕得瘵風者皆死温病熱盛入腎

小兒癩熱盛皆瘵瘵瘡瘵瘵皆相似故久瘵

成癩宜審察之其重者患耳中策策痛皆風

入腎經中也不治流入腎則喜卒然體瘵直

如死皆宜服小續命湯兩三劑也若耳痛腫

生汁作癰瘡者乃無害也惟風宜防耳針耳

前動脉及風府神良

諸風第二方

灸法

小續命湯治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能語奄奄忽忽神情悶亂諸風服之皆驗不令人虛方

麻黃 防已崔氏外人參

黃芩 桂心 甘草

芍藥 芎藭 杏仁各一兩

防風半兩 附子一枚 生薑五兩

右十二味以水一斗二升先煮麻黃三沸去沫內諸藥者取三升分三服甚良

不瘥更合三四劑必佳取汗隨人風輕重虛實也有人脚弱服此方至六七劑得瘥

有風疹家天陰節變輒合服之可以防瘥一本云恍惚者加茯神遠志如骨節煩疼本有熱者去附子倍芍藥小品千金翼同

有白朮不用杏仁救急無芎藭者人止十味延年無防風

小續命湯治中風冒昧不知痛處拘急不得轉側四肢緩急遺失便利此與大續命湯同偏宜產後失血并老小人

麻黃 桂心 甘草各二兩

生薑五兩 人參 芎藭

白朮前方有 附子 防已

芍藥 黃芩各一兩 防風半兩

右十二味以水一斗二升煮取三升分三服古今錄驗無桂心名續命湯胡洽千金翼同

又方治風歷年歲或歌或哭或大笑言語無所不及方

麻黃三兩 人參 桂心

白朮各二兩 芍藥 甘草

防已 黃芩 芎藭

當歸各一兩

右十味以水一斗二升煮取三升分三服日三覆取汗

大續命湯治肝厲風卒然瘖瘖依古法用大小續命二湯通治五臟偏枯賤風方

麻黃八兩 石膏四兩 桂心

乾薑 芎藭各二兩 當歸

黃芩各一兩 杏仁三十枚 荆瀝升一

右九味以水一斗先煮麻黃兩沸掠去沫下諸藥者取四升去滓又下荆瀝煮

數沸分四服能言未瘥後服小續命湯舊無荆瀝今增之效如神千金翼

又方治大風經脈奄忽不能言四肢垂曳皮肉痛癢不自知

獨活 麻黃各三兩 芎藭

防風 當歸 葛根

生薑 桂心 茯苓

附子 細辛 甘草各一兩

右十二味以水一斗二升煮取四升分五服老小半之若初得病便自大汗者

減麻黃不汗者依方上氣者加吳茱萸二兩厚朴一兩乾嘔者倍加附子一兩啞者

加橘皮二兩若胃中吸吸少氣者加大棗十二枚心下驚悸者加茯苓一兩若熱者

可除生薑加葛根初得風未須加減便且作三劑停四五日已後更候視病虛實年

論之行湯行針依此灸之

又方治與前大續命湯同宜產婦及老小等方

麻黃 芎藭各三兩 乾薑

石膏 人參 當歸

桂心 甘草^{各二} 杏仁^四
 右九味以水一斗煮取三升分三服
外臺名續命湯注用云
 是張仲景方本欠兩味
 西州續命湯治中風痲^{一作}身體不自收
 口不能言冒昧不識人拘急背痛不得轉側

方
 麻黃^六 石膏^四 桂心^二
 甘草 芍藥 乾薑
 黃芩 當歸^{各一} 杏仁^{三十}
 右九味以水一斗二升者麻黃再沸
 掠去上沫後下諸藥煮取四升初服一升
 猶能自覺者勿熟眠可厚覆小小汗出
 已漸減衣勿復大覆可熟眠去前服不汗
 者後復一升汗後稍稍五合一服安穩乃
 服勿頓服也汗出則愈勿復服飲食如常
 無禁忌勿見風并治上氣欬逆若面目大
 腫但得卧服之大善凡服此湯不下者人
 口噓其背湯則下過矣病人先患冷汗者
 不可服此湯若虛羸人但當稍與五合為
 佳間有輒行此湯與產婦及羸人喜有死

者皆為頓服二升傷多且湯濁不清故也
 但得清澄而稍稍服微取汗者皆無害也
胡洽方古今錄
 名大續命湯
 大續命散治八風十二痺偏枯不仁手足拘
 急疼痛不得伸屈頭眩不能自舉起止顛倒
 或卧苦驚如墮地狀盜汗臨事不起婦人帶
 下無子風入五臟甚者恐怖見鬼來收攝或
 與鬼神交通悲愁哭泣忽欲走方

麻黃 烏頭 防風
 桂心 甘草 蜀椒
 杏仁 石膏 人參
 芍藥 當歸 薤白^{翼作}
 黃芩 茯苓 乾薑^{各一}
 右十五味治下篩以酒服方寸七日再後
 加以知為度
 續命散治風無輕重皆主之方
 麻黃 芍藥 獨活
 防已 甘草 杏仁^{各三}
 桂心 附子 茯苓
 升麻 細辛 人參

防風^{各二} 石膏^五 白木^四
 右十五味粗篩下以五方寸七內小絹袋
 子中以水四升和生薑三兩煮取二升半
 分三服日日勿絕慎風冷大良吾嘗中風
 言語蹇澀四肢瘳曳處此方日服四服十
 日十夜服之不絕得愈

排風湯治男子婦人風虛濕冷邪氣入臟狂
 言妄語精神錯亂其肝風發則面青心悶亂
 吐逆嘔沫脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋
 急曲拳而卧其心風發則面赤翕然而熱悲
 傷瞋怒張目呼喚其脾風發則面黃身體不
 仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相
 隨其肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奮然
 而極其腎風發則面黑手足不遂腰痛難以
 俛仰痺冷骨疼諸有此候令人心驚志意不
 定恍惚多忘服此安心定志聰耳明目通臟
 腑諸風悉主之
 白鮮皮 白朮 芍藥
 桂心 芍藥 當歸
 杏仁 防風 甘草^{各一}

獨活 麻黃 茯苓各三
生薑兩四

右十三味吹咀以水一斗煮取三升每服一升覆取微汗可服三劑

大八風湯治毒風頑痺痺曳手脚不遂身體偏枯或毒弱不仁或風入五臟心恍惚惚多語喜忘有時恐怖或肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊僵直不得俯仰腹滿不食吐噎或始遇病時卒倒悶絕即不能語便失瘡半身不隨不仁沈重皆由體虛恃少不避風冷所致治之方

當歸二兩 五味子 升麻各一兩半
烏頭 黃芩 芍藥
遠志 獨活 防風
苜蓿 麻黃 秦朮
石斛 人參 茯苓
石膏 黃芪 紫苑各一兩
杏仁四十 甘草 桂心
乾薑各二 大豆一升十合
右二十三味吹咀以水一斗三升酒二升

合煮取四升疆人分四服羸人分六服

八風散治八風十二痺癢退半身不遂歷節疼痛肌肉枯焦皮膚爛動或筋緩急痛不在一處卒起目眩失心恍惚妄言倒錯身上痞瘰面上起疱或黃汁出更相染漬或燥或濕顏色乍赤乍白或青或黑兩弓反張乍寒乍熱方

麻黃 白木各一 羌活二
黃芩一斤 大黃半 桔葉根
甘草 藥刺 天雄
白芷 防風 芍藥
天門冬 石膏各十 山茱萸
食茱萸 躑躅各五 茵芋十四
附子三十 細辛 乾薑
桂心各五 雄黃 朱砂
丹參各六

右二十五味治下篩酒服方寸七初每日服三十日後日再服五十日知百日瘥一年平復長服不已佳先食服
小八風散治迷感如醉狂言妄語驚悸恐怖

恍惚見鬼喜怒憂煩滿顛倒色色短氣不得語語則失忘或心痛徹背不嗜飲食惡風不得去帷帳時復寒熱惡聞人聲不知痛癢身悉振搖汗出猥退頭重浮腫爪不知痛頭項強直口面喎戾四肢不隨不仁偏枯變掣不得屈伸悉主之方

天雄 當歸 人參各五
附子 天門冬 防風
蜀椒 獨活各四 烏頭
秦朮 細辛 白木
乾薑各三 麻黃 山茱萸
五味子 桔梗 白芷
柴胡 莽草各二

右二十味治下篩合相得酒服方寸七漸至一七日三服以身中覺如針刺狀則藥行也
烏頭湯治八風五尸惡氣遊走胃心流出四肢來往不住短氣欲死方
烏頭 芍藥 乾薑
桂心 細辛 乾地黃

當歸 吳茱萸 甘草各二
右九味以水七升煮取二升半分三服

藜耳散治諸風方

當以五月五日午時乾地取藜耳葉

洗曝燥擗下篩酒若漿服一方寸七日
三作散若吐逆可蜜和為丸服十九草
前計一方寸七數也風輕易治者日再
服若身體有風者皆作粟肌出或如麻
豆粒此為風毒出也可以鉞針刺潰去

之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰
乾之著大甕中稍取用之此草辟惡若
欲看病省疾者便服之令人無所畏若
時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶
發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一

周年服之佳七月九月九皆可採用
治心風虛熱發即恍惚煩悶半身不仁變急
方

荆瀝 竹瀝各五 枸杞根白皮
生麥門冬各一 香豉各三

人參 茯苓 梔子仁
黃芩 芍藥 桂心
細辛 杏仁 防風
白鮮皮各二 生薑
甘草各三 石膏

右十八味以水二斗和竹瀝荆瀝煮
取三升分四服相去如人行六七里凡五
劑間三日服一劑已三兩

治虛熱恍惚驚邪恐懼方

荆瀝三 竹瀝二 香豉三
牛黃八 生麥門冬 人參各三

升麻 鐵精 天門冬
龍齒 茯苓 梔子各二

右十二味以水二斗煮取三升去滓
下牛黃鐵精更煎五六沸取二升七分
五服溫服相去十里久

地黃煎治熱風心煩悶及脾胃間熱不下食
冷所方

生地黃汁 枸杞根汁各二 生薑汁
酥各三 荆瀝 竹瀝各五

天門冬 人參各八 茯苓六
大黃 梔子仁各四
右十一味擗篩五物為散先煎地黃等汁
成煎次內散藥攪調每服一七日再漸加
至三七覺利減之

又方

黃芩 乾藍 芍藥
鼠尾草各三 梔子仁 生薑各六
羚羊角五 豉一升

右八味以水七升煮取二升五分
三服

治積熱風方

地骨皮 萎蕤 丹參
黃芪 麥門冬 澤瀉各三
清蜜 薑汁各一 生地黃汁一

右九味以水六升煮取二升去滓內地黃
汁更緩火煮減一升內蜜及薑汁又煮一
沸藥成溫服三合日再
大防風湯治中風發熱無汗肢節煩腹急痛
大小便不利方

1 (226) A 0-3

防風

當歸

麻黃

白木

甘草各十

黃芩三十

乾地黄

山茱萸

茯苓

附子各一

右十味以水九升煮取二升半一服

七合大小便不利內大黃人參各十八銖

大棗三十枚生薑三兩煮取三升分三服

深師加天門冬一兩

大戟洗湯治中風發熱方

大戟 苦參各等分

右二味為末以藥半升白酢漿一斗煮三

沸適寒溫洗從上下寒乃止立瘥小兒三

指撮許漿水四升煮洗之

金牙酒療積年八風五疰舉身痺曳不得轉

側行步跛躄不能收攝又暴口噤失音言語

不正四肢背脊筋急腫痛流走不常勞冷積

聚少氣乍寒乍熱三焦不調脾胃不磨飲澀

結實逆害飲食酢咽嘔吐食不生肌醫所不

能治者方

金牙碎如米粒用

乾地黄

地膚子葉子用蜜蒸

防風

薊蕪根

附子

羌活一斤胡洽

細辛

茶草各四

蜀椒各四

右十味以酒四斗於甕中漬密閉頭勿令洩氣春夏三四宿秋冬

六七宿酒成去滓日服一合此酒無毒及

可小醉常令酒氣相接不盡一劑病無不

愈又令人肥健酒盡自可加諸藥各三兩

惟蜀椒五兩用酒如前勿加金牙也冷加

乾薑四兩服此酒勝灸刺起三十諸風痺

或神驗射後備急用升麻乾薑各四兩

一兩用藥酒四兩黃芪三兩胡洽用續斷

四兩為十一味千金翼

常山太守馬灌酒除風氣通血脉益精華定

六腑聰明耳目悅澤顏色頭白更黑齒落更

生服藥二十日力勢倍六十日志氣充盈八

十日能夜書百日致神明房中強壯如三十

時力能引弩年八十人服之亦嘗有子病在

腰膝藥悉生之方

天雄二兩

商陸根

躑躅

蜀椒各一

烏頭一枚

附子五枚

桂心

白欬

茵芋

乾薑各三

右十味以酒三斗漬春夏五

日秋冬七日去滓初服半合稍加至兩三

合樽滓為散酒服方寸七日三以知為度

夏日恐酒酸以油單覆之下井中近水令

不酸也千金翼無商陸桂心為八味

鬻夷酒治久風枯孿三十年著床及諸惡風

眉毛墮落方

乾地黄

獨活

丹參

礬石各一

麥門冬

附子

甘遂各二

赤石脂二兩

乾薑

蕪荑

芫花

栢子仁各一

蘇子升

茯苓

茯苓翼作茯苓

金牙

薯蕷

白木

杜仲

石南

牡荊子

山茱萸

欬冬八味

白芷

烏喙

烏頭

人參

狼毒 蜀椒 防風

細辛 礬石 寒水石

牛膝 麻黃 芎藭

當歸 柴胡 芍藥

牡蠣 桔梗 狗脊翼作

天雄各半 石斛 桂心各六

右四十五味咀咀以酒二斗漬夏三日春

秋六日冬九日一服半合密室中合藥勿

令女人六畜見之三日清齋乃合十全翼

又方治八風十二痺偏枯不隨宿食久寒虛

冷五勞七傷及婦人產後餘疾月水不調皆

主之方

礬石 桂心 白朮

狼毒 半夏 石南

白石脂廿六 龍膽 續斷十九

芫花 白石葵 代赭

蘭茹 石韋 玄參

天雄 防風 山茱萸

桔梗 藜蘆 卷栢

細辛 寒水石 烏頭

躑躅 蜀椒 白芷

秦艽 菖蒲各一 礬石

附子 速志各二 石膏二兩

蜈蚣一枚

右三十四味咀咀以酒二斗漬四日每服

一合日再十日後去滓曝乾搗篩為散酒

服方寸七日再以為度胡洽四十二味

頭躑躅蜀椒而有味恒山黃芩黃連大

黃麻黃地黃前胡甘草免絲子芍藥紫苑

各一兩杏仁一十枚同搗篩藥威用米

三斗麴三升黍末三斗作飯依禮酒法以

藥袋置醴中春秋七日冬十日夏三日酒

成服半升子秋日三服曝藥為末酒服方

寸匕以身體暖為度

魯王酒治風眩心亂耳聾目暗淚出鼻不閉

香臭口爛生瘡風齒癢癢喉下生瘡煩熱厥

逆上氣胃腸肩脾痛手不能上頭不能帶衣

腰脊不能俯仰脚酸不仁難以久立八風十

二痺五緩六急半身不遂四肢偏枯筋攣不

可屈伸賊風咽喉閉塞哽哽不利或如錐刀

所刺行人皮膚中無有常處久久不治入人

五臟或在心下或在膏肓遊走四肢偏有冷

處如風所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損

百病悉主之方

茵芋 烏頭 躑躅各三

天雄 防己 石斛二十

細辛 牛膝 甘草二十

栢子仁廿六 通草 桂心

秦艽 茵陳 山茱萸

黃芩胡洽作 附子 瞿麥

乾地黄 王不留行胡洽作天門冬

杜仲 澤瀉 石南

防風 遠志各十

右二十五味咀咀以酒四斗漬十日每服

一合加至四五合以知為度千金翼本此

乾薑胡洽無防己以胡壹威藥用水二斗

此麴二升同漬三四宿出藥飲二斗黍

米內汁釀之酒熟飲如雞子大

日二服稍損飲之以知為度

又方治風偏枯半死行勞得風若鬼所擊四

肢不遂不能行步不自帶衣學雙五緩六急

婦人帶下產乳中風五勞七傷

乾薑 躑躅 桂心

甘草 芎藭 續斷

細辛 附子 秦朮
 天雄 石膏 紫苑各五兩
 葛根 通草 防風
 栝子仁 巴戟天 石斛
 石南 山茱萸 石龍芮各四兩
 天門冬各六兩 牛膝各八兩 烏頭二十枚
 蜀椒半斤
 右二十五味以咀以水五升漬三宿法麴一斤合漬秫米二斗合釀三宿去滓炊糯米一斗醞三宿藥成先食服半合日再待米極消盡乃去滓曝乾末服
 獨活酒治八風十二痺方
 獨活 石南各四兩 防風三兩
 附子 烏頭 天雄
 茵芋各二兩
 右七味以咀以酒二斗漬七日每服半合日三以知為度
 灸法
 扁鵲云治卒中惡風心悶煩毒欲死急灸足大趾下橫文隨年壯立愈

若筋急不能行者內踝筋急灸內踝上十四壯外踝筋急灸外踝上三十壯立愈
 若眼戴指上神灸目兩眥後二十壯
 若不能語灸第三椎上百壯
 若不識人灸季肋頭七壯

若眼反口噤腹中切痛灸陰囊下第一橫理十四壯灸卒死亦良

治久風卒風緩急諸風卒發動不自覺知或心腹脹滿或半身不隨或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或身冷直或煩悶恍惚喜怒無常或唇青口白戴眼角弓反張始覺發動即灸神庭一處七壯穴在當鼻直上髮際是
 次灸曲差二處各七壯穴在神庭兩傍各一寸半是
 次灸上關二處各七壯一名客主人穴在耳前起骨上廉陷者中是
 次灸下關二處各七壯穴在耳前下廉動脈陷者中是
 次灸頰車二穴各七壯穴在曲頰陷者中是
 次灸廉泉一處七壯穴在當頤直下骨後陷者中是
 次灸凶會一處七壯穴在神庭上二寸是
 次灸百會一處七壯穴在

當頂上正中中央是
 次灸本神二處各七壯穴在耳正直上入髮際二分是又作四分
 次灸天柱二處各七壯穴在項後兩大筋外入髮際陷者中是
 次灸陶道一處七壯穴在大椎節下間是
 次灸風門二處各七壯穴在

第二椎下兩傍各一寸半是
 次灸心輪二處各七壯穴在第五椎下兩傍各一寸半是
 次灸肝輪二處各七壯穴在第九椎下兩傍各一寸半是
 次灸腎輪二處各七壯穴在第十四椎下兩傍各一寸半是
 次灸膀胱輪二處各七壯穴在第十九椎下兩傍各一寸半是
 次灸曲池二處各七壯穴在兩肘外曲頭陷者中屈肘取之是
 次灸肩髃二處各七壯穴在兩肩頭正中兩骨間陷者中是
 次灸支溝二處各七壯穴在手腕後臂外三寸兩骨間是
 次灸合谷二處各七壯穴在手大指虎口兩骨間陷者中是
 次灸間使二處各七壯穴在掌後三寸兩筋間是
 次灸陽陵泉二處各七壯穴在膝下外尖骨前陷者中是
 次灸陽輔二處各七壯

穴在外踝上絕骨端陷者中是○次灸崑崙
 二處各七壯穴在外踝後跟骨上陷者中是
 治風灸上星及百會各二百壯前頂二百四
 十壯腦戶及風府各三百壯一云治大風灸百會七百壯
 治百種風灸腦後項大椎平處兩廂量二寸
 三分須取病人指寸量兩廂各灸百壯得瘥
 治風耳鳴從耳後量八分半裏許有孔灸一
 切風得瘥狂者亦瘥兩耳門前後各灸一百
 壯
 治卒病惡風欲死不能語及肉痺不知人灸
 第五椎名曰臑輸百五十壯多至三百壯便
 愈
 心輸穴在第五節一云第七節對心橫三間
 寸主心風腹脹滿食不消化吐血酸削四肢
 羸露不欲飲食鼻衄目胸疏眈不明肩頭脇
 下痛小腹急灸二三百壯
 大腸輸在十六椎兩邊相去一寸半主風腹
 中雷鳴腸澼泄利食不消化小腹絞痛腰痛
 痔瘻或大小便難不能飲食灸百壯三日一
 報

掖門在掖下橫毛中一寸名太陽陰一名掖
 間灸五十壯主風
 絕骨在外踝上三寸灸百壯治風身重心煩
 足脛疼
 孫真人備急千金要方卷之二十五
如六



孫真人備急千金要方卷之二十六 切七

治諸風方

賊風第三論方

桂枝酒治肝虛寒卒然瘖啞不聲踞坐不得
 面目青黑四肢緩弱遺失便利屬風所損方

桂枝 芍藥 獨活

牛膝 薯蕷 甘草各三兩

附子二兩 防風 茯苓

天雄 茵芋 杜仲

薊蕪根 白朮各四兩 乾薑兩五

踴躅 猪椒葉根皮各一

大棗四十

右十八味咬咀以酒四斗漬七日每服四
 合日二加至五六合

肝風占候其口不能言

當灸鼻下人中次灸大椎次灸肝輸第
 九椎下是五十壯餘處隨年壯眼暗灸
 之得明二三百壯良

大定心湯治心氣虛悸恍惚方見別卷中

大定心湯治心氣虛悸恍惚方見別卷中