

孫真人備急千金要方卷之三十一

孫真人備急千金要方卷之三十一 磨一

宋制奉即守本常少神花松閣校理孫傳等校正

傷寒方

發汗圓第六方

神丹圓治傷寒赤溼惡寒發熱體疼者方

附子

烏頭 兩各四 人參

茯苓

半夏 兩各五 朱砂 兩一

右六味末之密圓以真丹為色先食服如

大豆二圓生薑湯下日三須更進熱粥二

升許重覆汗出止若不得汗汗少不解復

服如前法若得汗足應解而不解者當服

桂枝湯此藥多毒熱者令飲水寒者溫飲

解之治瘧先發服二圓要略用知年不用人參別有射干藥

大一枚名赤圓 主寒氣厥逆

麥奴圓治傷寒五六日以上不解熱在胸中

口噤不能言惟欲飲水為壞傷寒醫所不能

治為成死人精魂已竭心下繞溫以杖發其

口開灌藥咽中藥得下則愈麥奴圓一曰黑

奴圓二曰水解圓

釜底墨 竈突墨 梁上墨

麥奴 黃芩 大黃

硝磺 兩各一 麻黃 兩二

右八味末之密圓如彈子大以新汲水五

合研一圓破漬置水中當藥消盡服之病

者渴欲飲水極意不問升數欲止復強飲

能多飲為善不欲飲水當強飲之服藥須

更當寒寒竟汗出便解若服藥日移五尺

許不汗復服如前法不過再三服佳小麥

黑勃名麥奴

宜吐第七方

例曰大法春宜吐凡服吐藥中病便止不必

盡劑也

病如桂枝證頭不痛項不強而脉寸口浮胃

中鞭滿氣上衝喉咽不得息者此以內有久

痰宜吐之

病胃上諸寒胃中鬱鬱而痛不能食欲得便

人按之按之反有涎出不利日十餘行而其

人脉遲寸脉微滑者此宜吐之吐之利即止

少陰病飲食入口即吐心中愠愠然欲吐復

不能吐者宜吐之宿食在上管宜吐之

病手足逆冷脉乍結者實氣在胃中心下滿而煩飢不能食者以病在胃中宜吐之瓜蒂散病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胃中痞堅氣上撞咽喉不得息者此為胃有寒也宜吐之

瓜蒂 赤小豆各一兩

右二味治下篩取一錢七香豉一合熟湯

七合煮作稀粥去滓取汁和散溫頓服之

不吐者少少加得快吐乃止張文仲以白湯三合和服

水導散治時氣病煩熱如火狂言妄語欲以

走方

甘遂兩半 白芷兩二 大黃兩四

厚朴兩八 枳實枚五 芒硝合三

右六味吹咀以水一斗先煮厚朴枳實取

五升去滓內大黃煎取二升去滓下芒消

更煎一兩沸分再服得快利止

抵党圓下血方

水蛭 蜜蠱各二枚 桃仁二十枚

大黃兩三

右四味為末蜜和合分為四丸以水一升

煮一丸取七合頓服之時時當下血不下更服

抵党湯治同前

水蛭 蜜蠱各三枚 桃仁三十枚

大黃兩三

右四味吹咀以水五升煮取三升去滓服

一升不下更服

承氣湯方

枳實枚五 芒硝升半 大黃兩四

甘草兩二

右四味吹咀以水五升煮取二升去滓適

寒溫分三服如人行五里進一服取下利

為度若不得和盡服之

生地黃湯治傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃

中有宿食大便秘不利方

生地黃斤三 大黃兩四 甘草兩一

芒硝合二 大棗枚二十

右五味合搗令相得蒸五升米下熟絞取

汁分再服

大柴胡蕞蕞知母湯治傷寒七八日不解默

默心煩腹中有乾屎譫語方

柴胡斤半 姜蕞 知母

大黃 甘草各二兩 人參

黃芩 芍藥各二兩 生薑兩五

半夏升半

右十味吹咀以水一斗煮取三升去滓服

一升日三即下為效集驗用枳實四枚不用芍藥

治傷寒頭痛壯熱百節疼痛方

柴胡 梔子仁 芍藥

知母兩四 升麻 黃芩

大青 杏仁兩三 石膏兩八

香豉升一

右十味吹咀以水九升煮取二升七分

溫三服若熱盛加大黃四兩

駛鼓圓治傷寒留飲宿食不消方

豆豉升一 巴豆去油三百枚

杏仁枚六十 黃芩 黃連

大黃 麻黃各四兩 芒硝

甘遂各三兩

右九味為末以蜜和丸如大豆服二丸不

得下者增之在氏云此

發汗吐下後第九麻法方

傷寒已解半日許復心煩熱其脉浮數者可更發汗宜桂枝湯

凡發汗後飲水者必喘宜慎也

竹葉湯治發汗後表裏虛煩不可攻者但當與此方

竹葉把二 半夏升半 麥門冬升一

人參 甘草兩各二

石膏斤一

右七味咀咀以水一斗煮取六升去滓內粳米半升米熟去之根不文分服一升日三仲不

桂枝麻黃湯服桂枝湯大汗後脉洪大者與桂枝湯若形如瘡一日再發汗出便解者屬用生

桂枝二麻黃一湯方

桂枝一兩十 麻黃十六 芍藥

生薑各一兩 甘草二兩 杏仁十六

大棗枚五

右七味咀咀以水五升煮麻黃再沸去沫

內諸藥煮取二升適寒溫分再服取微汗而已

小青龍湯治傷寒表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘者方

桂心 麻黃 甘草

乾薑 芍藥 細辛各三

五味子 半夏各半

右八味咀咀以水一斗煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升分三服相去十里

頃復服之若渴者去半夏加栝蒌根三兩若微利去麻黃加芫花如一雞子大芫花令赤色若噎加附子一枚若小便利利小腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏仁半升數用神效

四物甘草湯治傷寒發汗出而喘無大熱與此方

甘草二 麻黃四 石膏半

杏仁枚五

右四味咀咀以水七升先煮麻黃令減二

升內諸藥煎取三升分三服

梔子湯治發汗若下後煩熱胃中窒氣逆痞心者方

梔子枚十四 香豉四合

右二味以水四升先煮梔子取二升半次內豉煮取一升半分二服溫進一服得快吐止後服

厚朴湯治發汗後腹脹滿方

厚朴兩半 人參兩一 甘草二

生薑兩八 半夏升半

右五味咀咀以水一斗煮取三升分三服玄武湯治太陽病發汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身動振振欲擗地方

茯苓 芍藥 生薑各三

白朮兩二 附子枚一

右五味咀咀以水八升煮取三升溫服七合

葛根黃連湯治太陽病及下之利遂不止脉促者表未解喘而汗出者方

葛根斤半 黃連 黃芩各三

甘草_二

右四味以水八升先煮葛根減二升

次內諸藥煮取二升去滓分再服

茯苓湯治傷寒發汗吐下後心下逆滿氣上衝胃起即頭眩其脾沈緊發汗則動經身為振振搖者方

茯苓_四

甘草_二

白朮

桂心_{各三}

右四味以水六升煮取三升去滓分

三服

凡寸口脈浮關上自沈為結胃_{集錄作沈細}

凡傷寒病發於陽而反下之熱入因作結胃

大陷胃圓治結胃病項亦強如柔痙狀下之

即和方

大黃_八

芒硝

杏仁

葶藶_{各五}

右四味搗篩大黃葶藶餘二味別研如脂

和散取如彈丸大一枚甘遂末一錢匕白

蜜二合水一升煮取八合溫頓服之病乃

自下如不下更服取下為效

傷寒六七日結胃熱實其脈沈緊心下痛按之正堅宜大陷胃湯

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上乾而渴日晡有小潮熱心胃大煩從心下

至小腹堅滿痛不可近宜大陷胃湯方

大陷胃湯方

甘遂_{各一}

大黃_{各六}

芒硝_升

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓次內芒硝一沸次內甘遂分再服一服得

快利止後服

甘草瀉心湯傷寒中風醫反下之其人下痢日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞堅結滿

乾嘔心煩不能得安即見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客

氣上逆使之然也宜治之方

甘草_四

黃連_{各一}

半夏_升

大棗_{十二}

乾薑_{各三}

右六味以水一斗煮取六升去滓分

服一升日三服_{乃先色}

生薑瀉心湯治傷寒發汗後胃中不和心下

痞堅乾噎食臭腸下有水氣腹中雷鳴下痢者方

生薑_四

甘草

人參

黃芩_各

乾薑

黃連_{各一}

半夏_升

大棗_{十二}

右八味以水一斗煮取六升去滓分

服一升日三

白虎湯治傷寒吐下後七八日不解結熱在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩

欲飲水數升者方

石膏_升

知母_六

甘草_二

粳米_{合六}

右四味以水一斗煮米熟去滓分服

一升日三諸亡血及虛家不可與白虎湯

若立夏後至立秋前得用之立秋後不可

服春三月尚涼冷亦不可與之與之則嘔

利腹痛

傷寒無大熱而口乾渴心煩背微惡寒宜服

白虎湯

傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎

湯渴欲飲水無表證宜白虎湯

若渴欲飲水口燥舌乾者亦宜白虎湯

青箱子圓治傷寒後結熱在內煩渴者方

青箱子兩五 黃芩 枯蘘根

苦參各一兩 黃蘗兩二 龍膽

梔子仁 黃連各三兩

右八味為末蜜丸如梧桐子大先食後服

七丸日三不知稍加本云無和為丸

大青湯治傷寒熱病十日已上發汗不解及

吐下後諸熱不除及下利不止斑出皆治之

方。

大青兩四 甘草 阿膠各二兩

豆豉升一

右四味以水八升煮取三升去滓煮

三沸去豉內阿膠令烊頓服一升日三服

欲盡復作常使有餘湯者當飲但除熱止

吐下無毒深師治勞復時後有赤石脂三兩朝治禁驗同

治傷寒後不了了朝夕有熱如瘧狀方

知母兩二 麻黃 甘草

芍藥 黃芩 桂心各一兩

右六味以水七升煮取二升半服五

合日三溫覆令微汗若心煩不得眠其人

欲飲水當稍稍飲之令胃中和則愈

江南諸師秘仲景要方不傳

灸法初得病或先頭痛身寒熱或瀉瀉欲守

火或腰背強直面目如飲酒狀此傷寒初

得一二日但烈火灸心下三處第一處去

心下一寸名巨關第二處去心下二寸名

上管第三處去心下三寸名胃管各灸五

十壯然或人形大小不同恐寸數有異可

絕度隨其長短寸數最佳取繩從心頭骨

名鳩尾頭度取臍孔中屈繩取半當繩頭

名胃管又中屈半繩更分為二分從胃管

向上度一分即是上管又上度取一分即

是巨關大人可灸五十壯小兒可三壯亦

隨其年長之大小以意斟量也若病者三

四日以上宜先灸背上二十壯以繩度鼻

正上盡髮際中屈繩斷去半便從髮際入

髮中灸繩頭名曰天聽又灸兩顛額又灸

兩風池又灸肝輪百壯餘處各二十壯又

灸太衝三十壯神驗

孫真人備急千金要方卷之三十一