

關下一寸
積聚堅大如盤冷脈及胃管二百壯三報穴
在巨關下二寸

孫真人備急千金要方卷之三十七

孫真人備急千金要方卷之三十八 膽八

宋朝奉節守太常少卿范仲淹撰

膽腑方

膽腑論第一

論曰膽腑者主肝也肝合氣於膽膽者中清
之腑也甲乙云膽者清淨之腑號將軍決曹
吏重三兩三銖長三寸三分在肝短葉間下
貯水精汁二合難經作三合能怒能喜能剛能柔
目下果大其膽乃橫凡膽腦髓骨脈女子胞
此六者地氣之所生也皆藏於陰而象於地
故藏而不瀉名曰奇恒之腑若胃大腸小腸
三焦膀胱此五者天氣之所生也其氣象天
故瀉而不藏此受五臟濁氣名曰傳化之腑
此不能久留輸瀉者也所謂五臟者藏精氣
甲乙而不瀉故滿而不能實六腑者傳化物
而不藏故實而不能滿所以然者水穀入口
則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰實
而不滿滿而不實也
左手關上陽絕者無膽脈也若膝疼口中苦
睛目善畏如見鬼多驚少力刺足厥陰治陰

在足大趾間或刺三毛中

左手關上陽實者膽實也若腹中不安身軀
習習也刺足少陽治陽在足上第二趾本節
後一寸是也

膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人

轉捕之咽中介介然數唾候在足少陽之本
末亦見其脈之陷下者灸之其寒熱刺陽陵
泉若善嘔有苦長太息心中澹澹善悲恐如
人將捕之邪在膽逆在胃膽液則口苦胃氣
逆則嘔苦汁故曰嘔膽刺三里以下胃氣逆
刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其
邪也

膽脹者膈下痛脹口苦太息

肝前受病移於膽肝效不已則嘔膽汁

厥氣客於膽則夢闕甲乙云夢闕

肝應筋爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄
爪堅色青者膽急爪爽色赤者膽緩爪直色
白無約者膽直爪惡色黑多敗者膽結

扁鵲云足厥陰與少陽為表裏表清裏濁其
病若實極則傷熱熱則驚動精神而不守卧

起不定若虛則傷寒寒則心畏頭眩不能獨
卧發於玄水其根在膽先從頭面起腫至足
方見治
水篇中
膽有病則眉為之傾病人眉係傾者七日内
必死

足少陽之脈是動則病口苦善太息心脇痛
不能反側甚則面微塵體無膏澤足外反熱
是為陽厥是主骨所生病者頭痛角頰痛目
充皆痛缺盆中腫痛腋腋下腫馬刀挾瘰汗出
振寒瘡胃中脇肋髀膝外至肘絕骨外踝前
及諸節皆痛小指次指不用感者則人迎大
一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也
其
脈經筋支別已
肝膽中

膽虛實第二辨方
灸法

膽實熱

左手關上脉陽實者足少陽經也病苦腹中
氣滿飲食不下咽乾頭痛洒洒惡寒胸膈痛名
曰膽實熱也

半夏湯治膽腑實熱精神不守瀉熱方
半夏
宿薑各三 黃芩兩一

生地黃兩五 遠志 茯苓各二

秫米半一 酸棗仁各五

右八味吹咀以千里長流水五斗煮秫米
令蟹目沸揚一千餘徧澄清取九升煮藥
取三升半分三服集驗方治虛煩悶不得
眠無地黃遠志有麥門
冬桂心各三兩甘
華入水各二兩

治胃中膽病方

艾燭俗隨年壯穴在俠膽輸傍行相去
五寸

膽虛寒

左手關上脉陽虛者足少陽經也病苦眩厥
痿足指不能搖履不能起僵仆目黃失精眩
眴名曰膽虛寒也

溫膽湯治大病後虛煩不得眠此膽寒故也
宜服此方

半夏

橘皮兩三

右六味吹咀以水八升煮取二升分三服
治膽虛方

灸三陰交各二十壯穴在內踝上一夫

千里流水湯治虛煩不得眠方

麥門冬 半夏各三 茯苓兩四

酸棗仁升二 甘草 桂心

黃芩 遠志 草解

人參 生薑各二 秫米半一

右十二味吹咀以千里流水一斛煮米令
蟹目沸揚萬遍澄清取一斗煮藥取二升
半分三服

酸棗湯治虛勞煩擾奔氣在胃中不得眠方

酸棗仁升五 人參 桂心

生薑各二 石膏兩四 茯苓

知母各三 甘草半一

右八味吹咀以水一斗先煮酸棗人取七
升去滓下藥煮取三升分三服日三

治虛勞煩悶不得眠方

大棗二七 葱白七

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

梔子湯治大下後虛勞不得眠劇者顛倒悞
懷欲死方仲景云發汗吐下後虛煩不得眠
若劇者必反覆顛倒心中懊憹也
主之

子湯

大梔子枚十四 豉合七
 右二味以水四升先煮梔子取二升半內
 豉更煮三沸去滓每服一升安者勿更服
 若上氣嘔逆加橘皮二兩亦可加生薑二
 兩

治煩悶不得眠方

枸杞皮白 生地黃兩五 麥門冬
 甘草 前胡各三 茯苓
 知母兩各四 人參兩二 粟米
 豉各五

右十味吹咀以水八升煮取三升七分

四服

治虛勞不得眠方

酸棗 榆葉各等分

右二味為末蜜丸如梧子每服十五丸日

再為度

又方乾薑四兩為末湯和頓服覆取汗病愈

咽門論第三

論曰夫咽門者應五臟六腑往還神氣陰陽
 通塞之道也喉嚨胞囊舌者並津液調五味

之氣本也不可不研乎咽門者肝膽之候也
 其重十兩廣二寸五分至胃管長一尺六寸
 主通五臟六腑津液神氣應十二時若臟熱
 則咽門閉而氣塞若腑寒則咽門破而聲嘶
 母薑酒主之才見熱則通之寒則補之若寒
 熱調和病不生矣

髓虛實第四方

論曰髓虛者腦痛不安髓實者勇悍凡髓虛
 實之應主於肝膽若其臟腑有病從髓生熱
 則應臟寒則應肺

羌活補髓圓治髓虛腦痛不安膽腑中寒方

羌活 芎藭 當歸各三
 桂心兩二 人參兩四 棗肉研如
 羊髓 酥各一 牛髓
 大麻仁各二升 酥如脂

右十味先搗五種乾藥為末下棗膏麻人

又搗相濡為一家下二髓并酥內銅鉢中

重湯煎取好為丸如梧子酒服三十九日

二服稍加至四十九

柴胡發泄湯治髓實勇悍驚熱主熱方

柴胡 升麻 黃芩
 細辛 枳實 梔子仁
 芒硝兩三 淡竹葉 生地黃升
 澤瀉兩四

消分三服

風虛雜補酒煎第五方

巴戟天酒治虛羸陽道不舉五勞七傷百病
 能食下氣方

巴戟天 牛膝各三 枸杞根皮白

麥門冬 地黃 防風各二

右六味並生用辛無生者用乾者亦得吹
 咀以酒一石四斗浸七日去滓溫服常令
 酒氣相續勿至醉吐慎生冷猪魚油蒜春
 七日秋冬二七日夏勿服先患冷者加乾

薑桂心各一斤好忘加遠志一斤大虛勞

加五味子茯苓各一斤陰下濕加五加槿

皮一斤有石斛加一斤佳每加一斤藥則

加酒七升此酒每年入九月中旬即合入

十月上旬即服設服餘藥以此酒下之大

妙津曝乾搗為末以此酒服方寸匕日三
益生常加甘草十兩佳虛勞加黃耆一斤
又方

巴戟天 生牛膝各三斤
右二味咬咀以酒五斗淹浸服如前法

五加酒治虛勞不足方

五加皮 枸杞根白皮各一斤

右二味咬咀以水一石五斗煮取汁七斗
分取四斗浸麴一斗餘三斗用拌飯下米
多少如常釀法熟壓取服之多少任性禁

如藥法倍日將息

天門冬大煎治男子五勞七傷八風十二痺
傷中六極一氣極則多寒痺腹痛喘息驚恐
頭痛二肺極則寒痺腰痛心下堅有積聚小
便不利手足不仁三脉極則顏色苦青逆意
喜恍惚失氣狀似悲泣之後苦舌強咽喉乾
寒熱惡風不可動不嗜食苦眩喜怒妄言四
筋極則拘攣小腹堅脹心痛膝寒冷四肢骨
節皆痛疼五骨極則肢節厥逆黃疸消渴癰
疽妄發重病浮腫如水病狀六肉極則發瘰

如得擊不復言甚者至死復生衆醫所不能
治此皆六極七傷所致非獨房室之為也憂
志積思喜怒悲懼復隨風濕結氣欬時嘔吐
食已變大小便不利時泄利重下瀉血上氣
吐下乍寒乍熱卧不安席小便赤黃時時惡
夢夢與死人共飲食入冢神室魂飛魄散筋
極則傷肝傷肝則腰背相引難可俯仰氣極
則傷肺傷肺則小便有血目不明髓極則陰
痿不起住而不交骨極則傷腎傷腎則短氣
不可久立陰痿惡寒甚者卵縮陰下生瘡濕
痒手搔不欲住汁出此皆為腎病甚者多遭

風毒四肢頑痺手足浮腫名曰脚弱一名脚
氣醫所不治此悉主之方

天門冬 生地黃各切三斗半

白蜜三升 酥三升

枸杞根切三斗淨洗以水二石五

鹿茸一具切碎以水一

石南石南取五斗淨清

右六味並大斗銅器中微火先煎門冬地

黃汁減半乃合煎取大斗二斗下後件散

藥煎取一斗內銅器重釜煎令隱掌可丸

如梧子大平旦空腹酒服二十九日二加
至五十九慎生冷醋滑猪雞魚蒜油麵等
須擇四時玉相日修合其合和一如第一
卷合和篇說散藥如左

茯苓 桂心 白木

姜蕤 五加皮 菖蒲

遠志 澤瀉 薯蕷

栝子仁 人參 石斛

牛膝 杜仲 覆盆子

細辛 獨活 枳實

芎藭 大豆黃卷 黃耆

蕤蓉 續斷 狗脊

胡麻仁 萆薢 白芷

橘皮 茯神 巴戟天

石南各二兩 阿膠十兩 甘草六兩

蜀椒 薏苡仁升一 大棗一百枚

鹿角膠五兩 蔓荊子三兩 其作膏

右三十八味治下篩內煎中有牛髓鹿髓

各加三升大佳小便澀去栝子人加秦苳

二兩乾地黃六兩陰痿失精去姜蕤加五

味子二兩頭風去栝子人加菊花防風各二兩小便利陰氣弱去細辛防風加山茱萸二兩腹中冷去防風加乾薑二兩無他疾依方修合凡此煎九月下旬採藥立冬日合服至五月上旬止若十二月臘日合者經夏至七月下旬止若停留經夏不壞當於舍北陰處入地深六尺填沙置藥中上加沙覆之則經夏不損也女人先患熱者得服應冷者勿服

填骨萬金煎治內勞少氣寒症夏急腹中喘逆腰痛方

- 生地黃^{三十斤} 肉蓯蓉
 - 甘草^{一斤} 阿膠^{各一斤} 麥門冬
 - 乾地黄^{二斤} 乾薑^{一斤} 茯苓
 - 桑根白皮^{一斤} 桂心^{各八兩} 人參
 - 桔梗^{一斤} 五味子^{一斤} 附子^{各五兩}
 - 石斛^{一斤} 牛髓^{一斤} 白蜜^{一斤}
 - 清酒^{四斗} 麻子仁^{三升} 大棗^{一百五枚}
 - 當歸^{十四兩} 乾椹^{二十兩} 蜀椒^{四兩}
- 右二十三味先以清酒二斗六升內桑根

白皮麻子人參膠為別識之又加酒一斗四升煮取至刻絞去滓內蜜髓地黃汁湯上銅器煎內諸藥末半日許今可丸止大覺盛飲吞如彈丸一枚日三若夏月暑熱煮煎轉味可以塞地黃汁和諸藥成末為丸如栝子服十五丸不知稍加至三十丸治男子風虛勞損兼時氣方

- 甘草^{一斤} 石斛^{一斤} 防風
 - 茯苓^{一斤} 山茱萸^{一斤} 茯苓
 - 人參^{一斤} 薯蕷^{各四斤} 桂心
 - 牛膝^{一斤} 五味子^{一斤} 菟絲子
 - 巴戟天^{一斤} 芎藭^{各三兩} 生地骨皮^切
 - 生地黃汁^升 丹麥^{二升}
 - 生薑汁^升 胡麻^{以水二斗煮取四升去滓各二十斤}
 - 牛髓^{一斤} 白蜜
 - 生麥門冬汁^{各三升}
- 右二十二味先煮地黃地骨皮胡麻汁減半內牛髓蜜薑門冬各等汁微火煎餘八升下諸藥散和令調內銅鉢中湯上煎令可丸如栝子大酒服三十九日二加至五

十九 小鹿骨煎^{一斤} 治一切虛羸皆服之方
鹿骨^{一斤} 枸杞根^{切二斤}
右二味各以水一斗別器各煎汁五升去滓澄清乃合一器共煎取五升日二服盡好將慎皆用大斗

地黃小煎治五勞七傷羸瘦乾劑方

- 乾地黄^{一斤} 胡麻油^升 蜜^升
- 猪脂^斤

右四味銅器中煎令可丸如栝子大飲服三九日三稍加十九久久常服大有所益瘦黑者肥充

陸抗膏治虛冷枯瘦身無精光虛損諸不足方

- 牛髓^{一斤} 羊脂^升 酥^{經心錄}
 - 生薑汁^升 白蜜^升
- 右五味先煎酥令熱次內薑汁次內蜜次內羊脂牛髓後微火煎三上三下令薑汁水氣盡即膏成攪令凝止溫酒服隨人能吞不限多少令人肥健發熱也^{經心錄云治百病}

橫風濕補益神效
男女通可服之良
枸杞煎補虛羸久服輕身不老神驗方

九月十日取生濕枸杞子一升清酒六升煮五六沸出取熟研濾取汁令其子極淨曝令乾搗末和前汁微火煎令可

先酒服二方寸七日二加至三七亦可先服三十丸

夏姬杏人煎方

杏人三升內湯中去皮尖兩人熟搗盆中水研取七八升汁以鐵釜置爐火上取羊脂四斤就釜內磨消內杏人汁溫之四五日色如金狀餅如彈子日三服百日肥白易容人不能識也

又方杏人熬黃去皮尖搗服如梧子日三治枯瘦令人潤澤無所禁欲逆上氣喉中百病心下煩不得咽者得茯苓款冬紫莞併力大良其藥生熟熱冷喉中如有息肉者亦服之
桃人煎方

桃仁末 蜜各一升 酥半斤
胡麻末一升 牛乳升五 地黃取汁十斤

右六味合煎如錫旋服之
治五勞七傷方

白羊頭蹄一具淨治更以草火燒令黃
胡椒 葷撥 乾薑各一兩
葱白升一 豉升二

右七味先以水煮頭及蹄半熟即內藥煮令極爛去藥冷峻任性食之日一具七日凡七具忌生冷酢滑五辛陳臭等物

治虛勞補方

羊肚切一具 白朮升一
右二味以水二斗煮取六升每服二升日三為度
又方

膏煎治虛羸瘦方

不中水豬肪煎取一升內葱白一握煎令黃出內盆中平且空腹服訖暖覆卧至晡時食白粥不得稀過三日服補

藥方如左

羊肝具一 羊脊肉一條 麴末升
枸杞根升十

右四味以水三斗煮枸杞取一斗去滓細切肝等內汁中煮者葱豉鹽如美法合煎

補虛方

豬肚具一 人參兩五 蜀椒兩一
乾薑兩二 葱白兩七 白朮米半升

右六味吹咀諸藥今相得和末內肚中縫合勿令泄氣取四斗半水緩火爛煮空腹食之大佳兼下少飯

吐血第六論方

論曰稟丘云吐血有三種有內衄有肺疽有傷胃內衄者出血如鼻衄但不從鼻孔出是近從心肺間津液出還流入胃中或如豆羹汁或如切蠟血凝停胃中因即滿悶便吐或去數斗至一石者是也得之於勞倦飲食過常所為也肺疽者或飲酒之後毒滿悶吐之

時血從吐後出或一合半升一升是也傷胃者因飲食大飽之後胃中冷則不能消化不能消化便煩悶強嘔吐使所食之物與氣共上衝臍因傷裂胃口吐血色鮮正赤腹絞痛白汗出其脈緊而數者為難治也問曰病胃脇支滿妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名為何何以得之對曰病名血枯比得之年少時有所大奪血若醉入房中氣竭而肝傷故使月事衰少不來也治以鷓鴣骨蘭茹二味并合丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也凡吐血後體中但自愴愴然心中不悶者輒自愈假令煩躁心中悶亂紛紛嘔吐顛倒不安醫工又與黃土湯阿膠散益加悶亂卒至不濟如此悶者當急吐之方

瓜蒂分 杜蘅 人參各一
右三味治下篩服一錢匕或無水漿但得下即可贏人小減之吐去青黃或吐血一二升無苦

黃土湯治吐血方
伏龍肝雞子大 桂心
乾薑 當歸 芍藥
白芷 甘草 阿膠
芎藭名一 生地黃兩八 細辛兩半
吳茱萸升二
右十二味以酒七升水三升合煮取三升半去滓內膠煮取三升分三服亦治衄血

又方治卒吐血及衄血方
伏龍肝斤半 甘草 乾薑仲景作地黃
白朮 阿膠 黃芩各三
右六味以水一斗煮取三升去滓下膠分三服仲景有附子三兩為七味

生地黄湯治憂恚嘔血煩滿少氣胃中痛方
生地黄斤一 大棗五十枚 阿膠
甘草各三
右四味以水一斗煮取四升分四服日三夜一

堅中湯治虛勞內傷寒熱嘔逆吐血方

治噫止唾血方
石膏兩四 厚朴兩三 麻黃
生薑 五味子 半夏
杏仁各二 小麥升一
右八味以水一斗煮麻黃去沫澄取七升內藥煮取二升半分再服

治吐血胃中塞痛方
芍藥 乾薑 茯苓
桂心 當歸 大黃
硝石各三 阿膠 甘草
人參各二 麻黃兩一 乾地黄兩四
蠶蟲 水蛭各八枚 大棗二十枚
桃仁一百枚
右十六味以水一斗七升煮取四分五服日三夜二

糖斤三 芍藥 半夏
生薑 甘草各三 桂心兩二
大棗五十枚
右七味以水二斗煮取七升分七服日五夜二千金無甘草桂心有生地黃

治吐血內崩上氣面色如土方

乾薑 阿膠 栝葉各二兩

艾一

右四味咬咀以水五升煮取一升內馬通

汁一升煮取一升頓服仲景名栝葉湯不用阿膠小品不用

栝葉與肘後同

治吐血酒客温疫中熱毒乾嘔心煩方

蒲黃 犀角 栝葉根

甘草各二兩 葛根 桑寄生各三兩

右六味咬咀以水七升煮取三升分三服

澤蘭湯治傷中裏急胃腸掣痛欲嘔血時寒

時熱小便赤黃此皆傷於房勞故也

澤蘭 糖各一斤 桂心

桑根白皮 人參各二兩 遠志二兩

生薑五兩 麻仁升

右八味咬咀以醇酒一斗五升煮取七升

去滓內糖食前服一升日三夜一勿勞動

治忽吐血一兩口或是心衄或是內崩方

蟾蜍五枚 牛膝 牡丹

王不留行 麥門冬二兩 草薢

芍藥 乾地黄四兩 續斷

阿膠各三兩

右十味咬咀以生地黃汁五升赤馬通汁

三升煮取三升分三服不瘥更合數劑取

瘥止

又方熟艾三雞子許水五升煮取二升頓服

又方燒亂髮灰水服方寸七日二服其驗云亦治小便出血者

治虛勞吐血方

生地黃肥者五升搗以酒一升煮沸三

上三下去滓頓服

又方凡吐血服桂心末方寸七日夜可二十

服肘後云亦下血良

又方生地黃五斤絞取汁微火煎三沸投白

蜜一升又煎取三升每服半升日三主胃痛

百病久服佳

又方栝葉一斤以水六升煮取三升分三服

又方

生地黃汁半川 大黃末一方寸匕

右二味先溫地黃汁一沸次內大黃攪和

空腹頓服日三瘥

犀角地黃湯治傷寒及温病應發汗而不汗

之內畜血者及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大

便黑面黃消瘀血方

犀角一兩 生地黃八兩 芍藥三兩

牡丹皮二兩

右四味咬咀以水九升煮取三升分三服

喜妄如狂者加大黃二兩黃芩三兩其人

脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱但依

方不須有所增加

治五臟熱結吐血衄血方

伏龍肝雞子一枚 生竹茹一斤 芍藥

當歸 黃芩 芎藭

甘草各二兩 生地黃一斤

右八味咬咀以水一斗三升先煮竹茹減

三升下藥取三升分三服千金翼有桂心

當歸湯治衄血吐血方

當歸 乾薑 芍藥

阿膠各二兩 黃芩三兩

右五味咬咀以水六升煮取二升分三服

治上焦熱膈傷吐血衄血或下血連日不止
欲死並主之

艾葉

竹茹升各一

阿膠如半

乾薑兩二

右四味咬咀以水三升煮取一升去滓內

馬通汁半升煮取一升頓服

又方取新馬屎與少水和絞取汁一方不用

竹茹加乾薑作七兩

治虛勞崩中吐血下血上氣短氣欲絕面黑

如漆方

黃耆

芍藥

芎藭

甘草各四

生薑斤一

右五味咬咀以酒五升浸一宿明旦更以

水五升煮取四升分四服日三夜一下陰

中毒如湯沃雪凡夏月不得宿浸藥酒客

勞熱發痔下血其穀道熱者去生薑用生

地黃代之凡進三兩劑

竹茹湯治吐血汗血大小便下血方

竹茹升二

甘草

芎藭

黃芩

當歸各六

芍藥

白朮

人參

桂心各一

右九味咬咀以水一斗煮取三升分四服

日三夜一

治九孔出血方

搗荊葉汁酒服二合一本作

治吐血蟲毒痔血女子腰腹痛大便後出清

血者方

取東向蕤荷根搗絞取汁二升頓服立

瘥

赤小豆散諸下血先見血後見便此為遠血

宜服黃土湯方見前七味先見便後見血此

近血宜服赤小豆散方

赤小豆三升

當歸三

右二味治下血每服方寸匕日三

乾地黃圓治血虛勞胃腹煩滿疼痛瘀血柱

來臟虛不受穀氣逆不得食補中理血方

乾地黃兩三

當歸

麥門冬

甘草

黃芩各二

厚朴

乾椽

枳實

防風

大黃

細辛

白朮兩各一

茯苓兩五

前胡六

人參分五

磁石

塵各五

右十八味為末蜜丸如梧子大先食服十

九日三稍加

麥門冬湯治凡下血虛極方

麥門冬兩八

白朮各四

甘草一

牡蠣

芍藥

阿膠各三

大棗二十

右七味咬咀以水八升煮取二升分再服

胃中瘀血積滿胸膈痛不能久立膝痠寒三

里主之

嘔血有脇痛口乾心痛與背相引不可效效

引腎痛不容主之一一作

心膈下嘔血上管主之 唾血振寒噓乾大

淵主之 嘔血太陵及郗門主之 嘔血上

氣神門主之 內傷唾血不足外無膏澤刺

地五會

灸法

治虛勞吐血多胃管三百壯亦主勞嘔逆吐

血少食多飽多唾百病多唾一

吐血唾血及胃堂百壯不可針

吐血酸削及肝輸百壯

吐血腹痛雷鳴及天樞百壯

吐血唾血上氣欬逆及肺輸隨年壯

吐血嘔逆及手心五十壯千金云

凡口鼻出血不止名腦切灸上星五十壯入

髮際一寸是

大便下血灸第二十椎隨年壯

孫真人備急千金要方卷之三十八

孫真人備急千金要方卷之三十九 磨丸

宋朝奉郎守太常寺卿充翰林院學士

膽腑方

萬病丸散第七論

論曰聖人之道以慈濟物博求衆藥以戒不

虞倉卒之際應手皆得故有萬病方焉余以

此方散在群典乃今學者難用討尋遂鳩撮

要妙以為斯品庶使造次可得好事君子安

不忘危無事之暇可預和合以備病瘵也

芫花散治一切風冷痰飲癱瘓瘡癤萬醫所

不治者皆治之一名登仙酒

芫花

大戟

附子

五加皮

莽草

躑躅

荊芥

石斛

石長生

桔梗

王不留行

天雄

芫花

藥荊

麻黃

茵芋

人參

蛇床子

紫苑

烏頭

白朮

狼毒

桔萸根

白芷

車前子

石南

草薢

牛膝

菴菴

薯蕷

細辛

乾地黄

厚朴

乾薑

黃芩

遠志

五味子

通草

藁本

續斷

右六十四味

並治不擇不灸不燬但振去塵土

搗以粗羅下之即與服凡是猪雞五辛生

冷酢滑任意食之無所忌惟諸豆皆殺藥

不得食

藥散

真酒

狗脊

秦艽

薏苡仁

當歸

食茱萸

黃耆

芍藥

吳茱萸

蜀椒

牡丹

柴胡

菖蒲

續斷

右六十四味

並治不擇不灸不燬但振去塵土

搗以粗羅下之即與服凡是猪雞五辛生

冷酢滑任意食之無所忌惟諸豆皆殺藥

不得食

藥散

真酒

菟絲子

藜蘆

巴戟天

芎藭

杜仲

山茱萸

桂心

防己

獨活

橘皮

栝子仁

茯苓

續斷

右六十四味

並治不擇不灸不燬但振去塵土

搗以粗羅下之即與服凡是猪雞五辛生

冷酢滑任意食之無所忌惟諸豆皆殺藥

不得食

藥散

真酒