

吐血唾血及胃堂百壯不可針

吐血酸削及肝輸百壯

吐血腹痛雷鳴及天樞百壯

吐血唾血上氣欬逆及肺輸隨年壯

吐血嘔逆及手心五十壯千金云

凡口鼻出血不止名腦切灸上星五十壯入

髮際一寸是

大便下血灸第二十椎隨年壯

孫真人備急千金要方卷之三十八

孫真人備急千金要方卷之三十九 磨丸

宋明奉節守太常少卿沈約撰林德壽校正

膽腑方

萬病丸散第七論

論曰聖人之道以慈濟物博求衆藥以戒不

虞倉卒之際應手皆得故有萬病方焉余以

此方散在群典乃今學者難用討尋遂鳩撮

要妙以為斯品庶使造次可得好事君子安

不忘危無事之暇可預和合以備病瘵也

芫花散治一切風冷痰飲癱瘓瘡癤萬醫所

不治者皆治之一名登仙酒

芫花

大戟

附子

五加皮

莽草

躑躅

荆芥

石斛

石長生

桔梗

王不留行

天雄

芫花

藥荆

麻黃

茵芋

人參

蛇床子

紫苑

烏頭

白朮

狼毒

桔萸根

白芷

車前子

石南

草薢

牛膝

菖蓉

薯蕷

細辛

乾地黄

厚朴

乾薑

黃芩

遠志

五味子

通草

藁本

續斷

右六十四味

並治

不擇

不炙

不燬

但振

去塵土

不得食

藥散

真酒

狗脊

秦艽

薏苡仁

當歸

食茱萸

黃耆

芍藥

吳茱萸

蜀椒

牡丹

柴胡

菖蒲

續斷

右六十四味

並治

不擇

不炙

不燬

但振

去塵土

不得食

藥散

真酒

菟絲子

藜蘆

巴戟天

芎藭

杜仲

山茱萸

桂心

防己

獨活

橘皮

栝子仁

茯苓

續斷

右六十四味

並治

不擇

不炙

不燬

但振

去塵土

不得食

藥散

真酒

先以三大斗水煮米作粥須極熟冬月揚去大氣春月稍涼夏月揚絕大氣令極冷秋稍溫次下麴末搗使和桑相得重下藥末搗使突突然好熟乃下真酒重搗使散或不用器中以淨杖攪散經宿即飲直以布蓋不須密封凡服藥平旦空心服之以知為度微覺發動流入四肢頭面習習然為定勿更加之如法服之常常內消非理加增必大吐利服散者細下篩服一方寸匕和水酒漿飲無在稍增以知為度服九者細下篩蜜丸如梧子每服七丸但此藥或丸或散皆可惟不得作湯若欲得補不令吐瀉但取內消大益勝於五石兼逐諸病功

十二種痺痺并風入頭眼暗漠漠及上氣欬嗽喉中如水雞聲不得眠臥飲食不作肌膚五臟滯氣積聚不消壅閉不通心腹脹滿及連背背鼓氣堅結流入四肢或復又心膈氣滿時定時發十年二十年不瘥五種下痢疳蟲寸白諸蟲上下冷熱久積痰飲令人多睡

消瘦無力陰入骨髓便成滯患身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四肢沈重行立不能久婦人因產冷入子臟中不淨或閉塞不通胞中瘀血冷滯出流不盡時時疼痛為患或因此斷產并小兒赤白下痢及胡臭耳聾鼻塞等病此藥以三丸為一劑服藥不過三劑萬病悉除說無窮盡故稱萬病丸以其用牛黃為主故一名牛黃丸以者安良醫故名者安丸方

- |     |     |    |
|-----|-----|----|
| 牛黃  | 麝香  | 犀角 |
| 桑白皮 | 茯苓  | 乾薑 |
| 桂心  | 當歸  | 芎藭 |
| 芍藥  | 甘遂  | 黃芩 |
| 蜀椒  | 細辛  | 桔梗 |
| 巴豆  | 前胡  | 紫莞 |
| 蒲黃  | 葶藶  | 防風 |
| 蜈蚣  | 石蛻  | 人參 |
| 朱砂  | 雄黃  | 黃連 |
| 大戟  | 禹餘糧 | 芫花 |
| 芫青  |     |    |

右三十一味黃芩 桑白皮 桂心 芎藭 當歸 甘遂 細辛 桔梗 紫莞 防風 人參 黃連 禹餘糧 芫花並令精細牛黃麝香犀角朱砂雄黃禹餘糧已豆別研餘者合搗重細下篩以白蜜和更搗三千杵密封下破除日平旦空腹酒服三丸如梧子大取微下三升惡水為良若卒暴病不拘平旦早晚皆可服但以吐利為度若不吐利更加一丸或至三九五丸須吐利為度不得限以丸數病強藥五服即定一服一盞治一切冷病積冷瘧瘧者四兩和酒一斗強者六兩和酒一斗半痰飲痲瘋上同宿食嘔吐四兩和酒一斗瘧瘧腸鳴噫八兩和酒二斗久瘧及久勞上同瘧瘧塊堅冷嗽上氣二十兩和酒五斗奔純冷氣六兩和酒一斗半噎及冷痢上同卒中惡注忤心腹脹氣急欲死者三服定一服一盞大吐出解血瘧氣上同蠱毒五服定一服一盞溫瘧瘧瘧五上同可三服一盞來瘧治婦人諸風諸病等並依前件帶下十二兩和酒三斗崩中六兩和酒一斗半月閉不通及冷病不瘥並上同斷



脚即暖有潤汗不至三日吐即止若患瘡無顏色者服藥後三日即有顏色亦有須吐差者亦有服少許而差者亦有發藥強人服三四丸始覺藥行者凡人稟性不同不可一藥與之但作黍米大服之為始漸加以知為度藥力驗壯勿併多服特慎油麵魚肉蒜當清淨服之若有患久不瘥在林羸瘦并腹脹滿及腫或下痢者多死但與藥救之十人中或瘥三四人也又一說瘥瘥積聚服一刀圭以飲漿水送下治諸卒死中惡客忤霍亂腹滿體帶五尸瘥惡風狂忤大病相易死亡滅門狂癡鬼語已死氣絕心上微暖者扶起其頭以物按開口不可開球去兩齒以漿飲送藥藥下即活諸久病者日服一刀圭覆令汗汗出即愈不愈者不過再服亦有汗而瘥復有不汗不愈者服如上法加半刀圭以瘥為度常以絳囊帶丸刀圭散男左女右小兒繫頭上辟瘴毒惡時氣射小兒患可苦酒和之塗方寸紙上著兒心腹上令藥在

上治之亦有已死者冬二日夏一日與此藥服得藥下便活若不得入腹不活若加金牙磁石者服至五服內必令人吐逆下利過此即自定其藥如小豆大為始從此漸小不得更大風惡癩可二十服偏風癩癩諸惡風癩病等亦可二十服自餘諸惡病者皆止一二服量人輕重強弱不得多與若欲解殺藥但爛煮食肥猪肉服此藥後小應頭痛身熱一二日來大不能得食味後自漸得氣味五日後更能食若食食過多者宜節之若服藥下悶亂可煮不防已湯服之即定凡言刀圭者以六粟為一刀圭一說云三小豆為一刀圭

作土釜法  
其法取兩箇瓦盆各受二大斗許以甘土塗其內令極乾又一法作一瓦釜作一熟鐵釜各受九升瓦在上鐵在下其狀大小隨藥多少不必依此說一本云土舖篩水和作泥硬軟如坭瓦泥泥一升內細紙封可受十斤亦可隨藥多少作之陰乾三十日置日中曝亦三十日日夕翻轉向日乾乾以糠五項內蓋

作六一泥法  
赤石脂 牡蠣 滑石  
礬石 黃礬 鹵土  
蚯蚓屎各二兩

右取醱酢以足為度若無鹵土以鹽代之先作甘土泥以泥各別裹前黃礬等五種作團裹之勿令泄氣以火燒周三日最好一日亦得出火破團取藥各搗碎篩篩然後與蚯蚓屎鹵土等分以酢和之如稠粥既得好酢可用二分酢一分水和用取前瓦盆以此泥塗之曾青如蚯蚓屎如黃連佳世少此者好崑崙碌亦得瘥病丹砂亦妙粟砂亦得舊不用礬石金牙今加之用萬種惡風神良凡有志連年積成不可治者宜須合此一篇皆以玉相日天晴明齋戒沐浴如法合之

練中四向土爛攤之令燥備釜周回上下各厚七寸以火從下煎五日五夜勿令人近之待冷一日一夜乃取掃成令淨以黃丹醋和如神藥掃其中令厚一分乃內藥凡各九升八石相礬太清神仙諸大丹皆用此釜作之萬成終不落節其古釜六一泥及礬釜皆除去之勿更用也此釜一具前後數十回用不動又久將此法師甚秘之奈故今當來天下學士得解之所以委曲具述之也

述曰古之仙者以此救俗特為至秘余以大業年中歎以合和而苦雄黃曾青難得後於蜀中遇雄黃大賤又於飛鳥玄武大獲曾青蜀人不識今須識者隨其大小但作蚯蚓屎者即是如此千金可求遂於蜀縣魏家合成

一釜以之治病神驗不可論宿癥風氣百日服者皆得痊愈故序而述焉

凡雄黃皆以油煎九日九夜乃可入丹不爾有毒慎勿生用丹必熱毒不堪服宜慎之

倉公散治卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹痛如刺下血便死不知人及卧魔驚脚腫不覺者諸惡

毒氣病方此是漢文帝時太倉令淳于意方故名

特生礬石 皂莢 雄黃

藜蘆各等分

右四味治下篩取如大豆許內管中吹入

病人鼻得嚏則氣通便活若未嚏復更吹之以得嚏為度此藥起死回生

小金牙散治南方瘴癘疫氣脚弱風邪鬼疰

金牙分五 雄黃 草薺

黃芩 蜀椒 由跋  
桂心 莽草 天雄  
朱砂 麝香 烏頭各二分  
牛黃一分 蜈蚣一枚六寸者 細辛  
萎蕤 犀角 乾薑各三分

黃連分四  
右十九味治下篩合牛黃麝香搗三千杵溫酒服錢五七日三夜二以知為度婦貴感帶男左女右一方寸七省病問孝不避夜行塗人中晨昏露露亦塗之

大金牙散治一切盡毒百症不祥醫所不治

金牙 鷓鴣骨 石膏各八分  
斑猫七分 活草子 胡燕矢  
白木 雷丸 龍牙各六分  
銅鏡鼻各九分 梔子仁 乾椹十一分  
龜甲 鼈甲 鬼督郵  
桃白皮 大黃各四分 桂心  
芍藥 徐長卿 羚羊角  
射干 升麻 鳶尾

馬目毒公 蜂房 細辛  
乾薑 砒石 由跋  
犀角 甘草 狼毒  
蜣螂 龍膽 狼牙  
雄黃 眞珠各三分 芫花  
莽草 射罔 烏梅各一分  
蛇蛻皮尺一 鐵精 赤小豆各一分  
地膽 樗雞 芫青各七分  
桃奴 巴豆各二分

右五十味治下篩服一刀圭稍加至二刀主帶之辟百邪治九十九種症一本有香無白糖

孫真人備急千金要方卷之三十九