

右十二相屬肉物皆不得食及以為藥牛黃龍骨齒用不可廢

孫真人備急千金要方卷之四十三

孫真人備急千金要方卷之四十四

定額奉節守太常少卿充秘閣校理權等校正

腸腑方

風癲第五 論針灸法

論曰黃帝問曰人生而病癲疾者安所得之岐伯對曰此得之在腹中時其母數有所大驚也氣上而不下精氣并居故令子發為癲疾病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已而止病癲初發歲一發不治月一發不治四五日一發名曰癲疾刺諸分其脉尤寒者以針補之病已止癲疾始生先不樂頭重直視舉目赤其作極已而煩心候之於頰取手太陽陽明太陰血變而已癲疾始發而反強因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太陽血變而已癲疾始作而引口啼呼甲乙作者候之手陽明太陽右強者攻其左左強者攻其右血變而止治癲疾者常與之居察其所當取之處病至視之有過者即寫之置其血於執壺之中至其發時血獨動矣不動者窮骨二十壯窮骨者

尾骶也

骨癲疾者頤齒諸輸分肉皆滿而骨倨強直汗出煩悶嘔多涎沫氣下泄不療

筋癲疾者身拳學急脉大刺項大經之本杼嘔多涎沫氣下泄不療

脉癲疾者暴仆四肢之脉皆脹而從滿脉盡刺之出血不滿俠項灸太陽又灸帶脉於腰相去三寸諸分肉本輸嘔多涎沫氣下泄不療

治癲者病發而狂面皮厚敦敦者死不療

凡癲發則卧地吐涎沫無知若強掠起如狂及遺糞者難療

癲疾脉搏大滑久自已脉沉小急實死不療小牢急亦不可治脉虛可療實則死矣厥成或為癲疾五臟不平六腑閉塞之所生也厥成或為癲故附厥於此條也陰衰發熱厥陽衰發寒厥

論曰黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥問曰熱厥必起於足下者何也對曰陽氣

起於足三趾之表集於足下而聚於足心故陽勝則足下熱也問曰寒厥必起於五趾而上於膝者何也對曰陰氣起於五趾之裏集於膝而聚於膝上故陰氣勝則從五趾至膝上寒其寒也不從外皆從內也厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人若何也陰氣盛於上則下虛下虛則腹滿腹滿則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂亂則不知人巨陽之厥腫首頭重足不能行發為兩仆陽明之厥癱瘓欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言少陽之厥暴聾頰腫而熱脇痛解不可以運太陰之厥腹滿腹脹後不利不欲食食則嘔不得卧少陰之厥舌乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥小腹腫痛腹脹溼渡不利好卧屈膝陰縮腫胛內一作熱熱盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之上寒下熱先刺其項太陽久留之已則火熨項與肩甲令熱下冷乃止所謂推而上之者也上熱下寒視其虛脈而陷下於經絡者取之氣下而止所謂引而下之者也刺熱厥者留

針反為寒刺寒厥者留針反為熱刺熱厥者二陰一陽刺寒厥者二陽一陰所謂二陰者二利陰也所謂二陽者二刺陽也論曰溫病熱入腎中亦為瘵小兒病癰熱盛亦為瘵凡風瘡暴尸厥及鬼魔不寤皆相似宜精察之故經言久厥則成癰是以知似也論曰癰病有五一日陽癰發時如死人遺溺有頃乃解二日陰癰坐初生小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三日風癰發時眼目相引牽縱反急強羊鳴食頃方解由執作汗出當風因以房室過度醉飲飽滿行事令心氣逼迫短氣脈悸得之四曰濕癰肩頭痛身重坐熱沫髮濕結腦汗未止得之五曰馬癰發時反目口噤手足相引身皆熱坐小時膏氣腦熱不和得之

治五癰方

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 銅青 | 雄黃 | 空青 |
| 東門上 <small>頭</small> | 水銀 <small>各一兩</small> | 茯苓 |
| 猪苓 | 人參 | 白芷 |
| 白欬 | 白薇 | 石長生 <small>各二兩</small> |

卷栢 烏扇各半 硫黃一兩 右十五味為末以青牛膽和著銅器中於甌中五斗大豆上蒸之藥成丸如麻子先食服三十九日再夜一虎睛圓治濕癰掣口眼張大口出白沫或作聲或死不知人方千金異名大鎮心丸 虎睛一具酒浸一宿而炙之 鬼箭羽 露蜂房分 獨活 遠志 細辛 貫衆 麝香 白欬一作白薇 升麻 白蘇皮三兩 牛黃 防風 秦艽 防葵 龍齒 黃芩 雄黃 山茱萸 乾地黄一方乾薑 防己 茯苓 鐵精 鬼臼 人參 大黃 銀屑各四分 茯神 石膏 天雄各五分 寒水石六分 蛇蛻皮一尺 方三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服十五丸日再稍加至二十五丸神方 凡癰發之候其狀多端口邊白沫動無常者

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 烏扇 | 硫黃 | 虎睛 | 鬼箭羽 | 獨活 | 遠志 | 細辛 | 貫衆 | 麝香 | 白蘇皮 | 牛黃 | 防風 | 秦艽 | 防葵 | 龍齒 | 黃芩 | 雄黃 | 山茱萸 | 乾地黄 | 防己 | 茯苓 | 鐵精 | 鬼臼 | 人參 | 大黃 | 銀屑 | 茯神 | 石膏 | 天雄 | 寒水石 | 蛇蛻皮 |
|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|

治之方

秦艽

人參

防葵一作防風

茯神一作牡丹

甘草各二兩

鉛丹一兩

貫衆一作改

右七味以水九升煮取三升半分三服

服

雄雌圓治風癩失性顛倒欲死五癩驚癩方

雄黃

雌黃

真珠各一兩

鉛二兩丹二兩

水銀八分

右六味為末以蜜搗三萬杵丸如胡豆大

先食服二九日二稍加以知為度古今錄

五癩牛癩則牛鳴馬癩則馬鳴狗癩則狗鳴羊癩則羊鳴雞癩則雞鳴五癩狂病者腦臟相引氣起寒厥不識人氣爭言方吐沫久而得蘇者

出方

續命風引湯治中風癩眩不知人狂言舌腫

麻黃

芎藭

石膏

人參

防風各三兩

桂心

甘草

獨活各二兩

防己

附子

當歸各一兩

杏仁三十枚

陳薑

五兩一本無陳字

右十三味以酒三升水一斗合煎取四升分四服日三夜一

紫石散治大人風引小兒驚癩癩瘕日數十發醫所不療者方

紫石英

滑石

白石脂

凝水石

赤石脂

石膏各六兩

甘草

桂心

牡蠣各五兩

大黃

龍骨

乾薑各四兩

右十二味治下篩為粗散以韋囊懸於高涼處欲用取三指撮以新汲井水三升

煮取一升二合大人頓服未百日兒服一合未能者綿沾著口中熱多者日四五服

以意消息深師方只龍骨乾薑牡蠣滑石白石脂五味

治百二十種風癩癩驚狂發即吐沫不識人者四月五月宜服之方

紫石英

芍藥

龍骨一本用黃芩

青石脂

白鮮皮

麻黃

當歸

甘草

枯薑根

桂心

人參各二兩

牡蠣各三兩

大黃

芍藥

龍骨一本用黃芩

青石脂

白鮮皮

麻黃

當歸

甘草

枯薑根

桂心

人參各二兩

牡蠣各三兩

大黃

芍藥

龍骨一本用黃芩

青石脂

白鮮皮

麻黃

當歸

甘草

枯薑根

桂心

人參各二兩

牡蠣各三兩

大黃

芍藥

龍骨一本用黃芩

右十三味治下篩為粗散分作七裹每以大裹十枚水三升煮取二升半去滓下一裹大裹十中煎取一升去滓頓服相去七日一服服訖即瘥

治癩癩厥時發作方

防葵

代赭

人參

鈎藤

白殭蠶

生豬齒

鈎藤

茯神

雷丸

虎骨

遠志

桂心

防風各六兩

卷栢

葇若子

光明砂

升麻

附子

牡丹

龍齒各一兩

牛黃二分

白欬四分

蚱蟬十四枚

蛇蛻皮

白馬眼睛各一具

白馬眼睛各一具

蛇蛻皮

右二十五味治下篩酒服方寸七日二亦可為丸良驗成

芎藭湯治風癩引腦牽痛發作則吐耳如蟬鳴方

芎藭

藁本

商茹各五兩

右三味以酒一斗煮取三升頓服之

羸者分并服取大汗

治風癩方 經心錄名 鵝頭丸

葶藶子 鈔丹 虎掌

烏頭 桔萸根 各三 甘遂

天雄 蜀椒 大戟 各二

白朮 分一 鐵精 蘭茹 各一

鵝頭 分一

右十三味為末蜜丸如梧子湯酒下二九

日三服

又方

地黃 斤三十 天門冬 斤十

右二味搗取汁作煎服之瘥

又方葶藶子三升搗篩酒一斗漬半日絞去

滓湯中煎令可九先食服如小豆二九加至

如梧子二九以知為度額上手中從文理中

赤起是知也無此候更服病日發者三日愈

問日發者十日愈五日發者二十日愈半歲

發者一月愈

治癩癩癩癩方

鈔丹 斤一 飛鷄頭 枚二

右二味為末蜜丸先食服三九日三劇者夜一稍加之

天門冬酒通治五臟六腑大風洞泄虛弱五勞七傷癥結滯氣冷熱諸風癩癩惡疾耳聾頭風四肢拘攣猥退歷節萬病久服延年輕身齒落更生髮白更黑方

天門冬與百部相似天門冬味甘兩頭

方百部細長而味苦令人利搗絞取汁

二斗清麴二升麴發以糯米二斗準家

醞法造酒春夏極冷下飯秋冬溫知人

肌酸之酒熱取清服一盞常令酒氣相

接勿至醉吐慎生冷酢滑難措魚蒜持

慎鯉魚亦忌油膩此是一斗汁法餘一

石二石亦準此以為大率服藥十日覺

身體癭疹大瘰二十日更大瘰三十日

乃漸止此皆是風氣出去故也四十日

即覺身心朗然大快似有所得五十日

更覺大快當風坐卧覺風不著人身中

諸風悉盡用米法先淨淘米曝炕令乾

臨欲用時更別取天門冬汁漬米乾漉

炊之餘汁拌飯甚宜密封取天門冬汁

法淨洗天門冬去心皮乾漉去水切去

壓取汁三四偏令滓乾如草乃止此酒

初熟味酸仍作臭甜腥氣但依式服之

久停則香美餘酒皆不及也封四七日

佳凡八月九月即少合至十月多合

擬到來年五月三十日以來相續服之

春三月亦得合入四月不得合服酒時

若得散服得力更倍速散方如左

散方天門冬去心皮曝乾搗作末以上件酒

服方寸七日三加至三七久服長生凡酒亦

得服

灸法

大人癩小兒驚癩灸脊第二椎及下窮骨兩

處以繩度中折繩端一處是脊骨上也凡三

處畢復斷繩作三折令各等而參合如公字

以一角注中央灸下二角俠脊兩邊便灸之

凡五處也故畫圖注以丹注所灸五處各百

壯削竹皮為度勝繩也

卒癩灸陰莖上宛宛中三壯得小便通即瘥

千金翼云當
 采北土是穴 又灸陰莖頭三壯 又灸足
 大趾上聚毛中七壯 又灸囊下縫二七壯
 又灸兩乳頭三壯 又灸督脉三十壯三報
 穴在直鼻中上入髮際 又灸天窻百會各
 漸灸三百壯柱惟小作 又灸耳上髮際各
 五十壯

論曰黃帝問曰有病怒狂者此病安生岐伯
 對曰生於陽曰陽何以使人狂曰陽氣因暴
 折如難决故善怒病名曰陽厥問曰何以知
 之對曰陽明常動太陽少陽不動不動而動
 大疾此其候也曰治之奈何曰衰其食即已
 夫食入於陰長氣於陽故奪之食即已使之
 服以生鐵落為後飯夫生鐵落者下氣疾
 論曰凡發狂則欲走或自高賢稱神聖昏須
 備諸火灸乃得永瘥耳若或悲泣呻吟者此
 為邪非狂自依邪方治之邪入於陽則為狂
 邪入於陰則為血痺邪入於陽傳即為癲癪
 邪入於陰傳則為痛瘡陽入於陰病靜陰入
 於陽病怒
 鬻甲湯治邪氣夢寐時涕泣不欲聞人聲

體中酸削乍寒乍熱腰脊強痛腹中拘急不
 欲飲食或因疾病之後勞動疲極或觸犯忌
 諱眾諸不節婦人產後之後月經不利時下
 青赤白肌體不生肉虛羸瘦小使不利或頭
 身發熱旋復解散或一度交接隔日因極皆
 主之方

鬻甲 甘草 白微一作白芷
 貝母 黃芩 麻黃
 芍藥 白木各二兩半 防風三兩
 凝水石 桂心 茯苓
 知母各四兩 石膏六兩
 右十四味以水二斗煮取四升溫服
 一升日三夜一
 九物牛黃圓治男子佔鬼魅欲死所見驚怖
 欲走時有休止皆邪氣所為不能自絕方

牛黃土精 荆實八 管青精
 玉屑白虎 空青精 雄黃精
 玄參精 龍骨精 赤石脂精
 右九味名曰九精上通九天下通九地各
 一兩治下篩蜜和丸如小豆先食服一九

日三稍加以知為度千金翼云凡邪病當
取五邪湯九精丸
 十黃散治五臟六腑血氣少亡魂失魄五臟
 覺不安忽忽喜悲心中善恐怖如有鬼物此
 皆發於大驚及當風從高墮下落水所致志
 主之方

雄黃 人參各五 黃芩
 大黃 黃蘗 黃耆
 細辛 桂心各三 黃連
 黃昏 蒲黃 麻黃各一
 黃環 澤瀉 山茱萸各二
 右十五味治下篩未食溫酒服方寸七日
 三不知加至二七羸劣者更加人參五分
 合十分一方有生黃二分藥性有蜀椒五
分乾薑四分
 別離散治男女風邪男夢見女女夢見男悲
 愁憂恚怒喜無常或半年數月一發動方

桂心 茵芋 天雄
 菖蒲 細辛 菖根
 附子 乾薑各一 白木
 桑上寄生本三
 右十味治下篩酒服方寸七日三凡修合

勿令婦人雞犬及病者家人知見令邪氣
不去禁之為驗

四物驚頭散治鬼魅方

東海驚頭即由 黃牙石一名

蔓若子 防葵各一

右四味治下篩酒服方寸七欲令病人見
鬼加防葵一分欲令知鬼主者復增一分
立有驗防葵蔓若子令人迷惑恍惚如狂
不可多服

五邪湯治邪氣啼泣或歌或哭方

禹餘糧 防風 桂心

芍藥 遠志 獨活

甘草 白朮 人參

石膏 牡蠣 秦艽各二

防己 菖蒲 茯神

雄黃深師作 蛇蛻皮各一

右十七味吹咀以水二斗煮取四升分四

服亦可如麥散法服之

茯神湯治五邪氣入人體中見鬼妄語有所
見聞心悸跳動恍惚不定方

茯神 人參 菖蒲

茯苓各三 赤小豆四十

右五味吹咀以水一斗煮取二升半分三

服

人參湯治風邪鬼氣往來發作有時或無時

節方

人參 防風 烏頭

乾薑 澤瀉 枯薑根其作

狗脊 遠志 附子

黃芩 獨活各五 秦艽

牡蠣 五味子 山茱萸

前胡 細辛 石膏

芎藭 蜀椒 牛膝

甘草 石南正 桑根白皮

桂心 麻黃 竹皮

白朮 橘皮各十 鬼箭千金翼

茯苓各十 大棗六

右三十二味吹咀以水六升酒六升合煮

取四升分五服日三夜二

虎睛湯治狂邪發無常被髮大叫喚欲殺人

不避水火方

虎睛 露蜂房 鵝頭各一

楓上寄生石長生 茯苓

桂心 防風各三 獨活

甘草 人參 天雄各一

右十二味吹咀以水一斗二升煮取三升

分四服日三夜一

又方

防葵 人參 貫衆各五

防風 桂心各三

右五味吹咀以水一斗煮取三升分四服

稍服亦可

又方苦參五斤蜜和凡如酸棗大單服十九

治卒發狂方

令患者著地仰卧以冷水終日淋其面

良

治百邪鬼魅方

服頭垢小豆大

治魅方

以水服鹿角末方寸七日三

方水服獺肝末日三
治狐狸諸色精魅作種種惡怪令人恐怖狂
風邪方

雄黃斤 油二升

右二味破雄黃如棊子大鑊中以盆合頭

作竈微火煎九日九夜不得少時火絕亦
不得火冷須火熱微微不絕神驗

治風邪方

商陸根三十斤去皮細切以水八斗東
向竈煎減半去滓更煎令可丸如梧子

大服一丸合時分令人見蓂若方及大

豆紫湯皆可服汗出佳前漢書方出此篇
煎湯見別卷

又方燒蝦蟇末水服方寸匕日三

又方燒人屎灰酒服慎生冷酢滑猪雞魚蒜
等

又方以水服伏龍肝方寸七日三

治諸橫邪癩狂針灸圖訣

論曰凡諸百邪之病源起多塗其有種種形
相示表癩邪之端而見其病或有默默而不
聲或復多言而設說或歌或哭或吟或笑或

眠坐溝渠噉食糞穢或裸形露體或晝夜遊
走或噴罵無度或是蜚蠱精靈手亂目急如
斯種類癩狂之人今針灸與方藥並主治之
凡占風之家亦以風為鬼斷

扁鵲曰百邪所病者針有十三穴也凡針之

體先從鬼宮起次針鬼信便至鬼壘又至鬼
心未必須併針止五六穴即可知矣若是邪

靈之精便自言說論其由來住驗有實立得
精靈未必須盡其命求去與之男從左起針

女從右起針若數處不言便徧穴針也依訣

而行針灸等處並備主之仍須依掌訣檢目
治之萬不失一黃帝掌訣別是術家秘要縛

鬼禁劫五嶽四瀆山精鬼魅並悉禁之有目

在人兩手中十指節開第一針人中名鬼宮

從左邊下針右邊出第二針手大指爪甲下

名鬼信入肉三分第三針足大趾爪甲下名

鬼壘入肉二分第四針掌後橫文名鬼心入

半寸即大第五針外踝下白肉際是太陽

名鬼路火針七銍銍三下即中第六針大

推上入髮際一寸名鬼枕火針七銍銍三下

第七針耳前髮際宛宛中耳垂下五分名鬼
牀火針七銍銍三下第八針承漿名鬼市從
左出右第九針手橫文上三寸兩筋間名鬼
路即勞第十針直鼻上入髮際一寸名鬼
堂火針七銍銍三下即上第十一針陰下

縫灸三壯女人即玉門頭名鬼藏第十二針
尺澤橫文外頭接白肉際名鬼臣火針七銍

銍三下此即曲第十三針舌頭一寸當舌中
下縫刺貫出舌上名鬼封仍以一板橫口吻

安針頭令舌不得動已前若是手足皆相對

針兩穴若是孫穴即單針之

邪鬼妄語灸懸命十四壯穴在口脣裏中央

絃絃者是也鬼又用剛刀決斷絃絃者乃

佳

邪病卧瞑不自知風府主之鬼

邪病大喚罵皆走灸十指端去爪一分鬼

邪病大喚罵走遠三里主之鬼

邪病鬼顛四肢重顛上主之鬼

邪病四肢重痛諸雜條尺澤主之鬼

邪病語不止及諸雜候人中主之鬼

人中惡先押鼻下是也

倉公法狂癩不識人癩病眩亂灸百會九壯

狂走擊飛灸玉枕上三寸一法頂後一寸灸

百壯 狂走癩疾灸頂後二寸十二壯

狂邪鬼語灸天窓九壯 狂走癩疾灸大幽

百壯 狂言恍惚灸天樞百壯 狂走癩癩

灸季肋端三十壯 狂癩哭泣灸手逆注三

十壯穴在左右手腕後六寸 狂走驚癩灸

河口五十壯穴在腕後陷中動脈是也此與陽

狂癩風癩吐舌灸胃管百壯不針 狂邪發

無常被髮大喚欲殺人不避水火及狂言妄

語灸間使三十壯穴在腕後五寸臂上兩骨

間亦灸驚 狂走喜怒悲泣灸巨覺一作隨

年壯穴在背上甲內側反手所不及者骨芒

穴上捻之痛者是也 狂邪鬼語灸伏兔百

壯前作天 悲泣鬼語灸天府五十壯 悲

泣邪語鬼忙歌哭灸慈門五十壯 狂邪驚

癩病灸承命三十壯穴在內踝後上行三寸

動脈上亦灸驚 狂癩風驚厥逆心煩灸巨

陽五十壯 狂癩鬼語灸足太陽四十壯狂

走驚恍惚灸足陽明三十壯 狂癩癩易疾

灸足少陽隨年壯 狂走癩厥如死人灸足

大趾三毛中九壯大數 狂走易驚灸八

會隨年壯穴在陽明下五分 狂癩驚走風

恍惚噴喜罵笑歌哭鬼語悉灸腦戶風池手

陽明太陽太陰足陽明陽蹻少陽太陰陰蹻

足跟皆隨年壯 驚怖心忪少力灸大橫五

十壯 狂風罵詈搥斫人名為熱陽風灸口

兩吻邊無口處赤白際各一壯 又灸陰囊

縫三十壯令人立以筆正注當下已卧核卵

上灸之勿令近前中卵核恐害陽氣也狂走

刺人或欲自死罵詈不息極神鬼語灸口吻

頭赤白際一壯 又灸兩肘內屈中五壯

又灸背胛中間三壯報灸之倉公法神效

鬼魅灸入髮一寸百壯 又灸間使手心各

五十壯 狐魅合手大指縛指灸合間三七

壯當狐鳴即瘥 卒狂言鬼語以篋帶急合

縛兩手大指便灸左右脇下對屈肘頭兩處

火俱起各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐

問之乃解其手 卒中邪鬼恍惚振喉灸鼻

下人中及兩手足大指爪甲本令灸九半在
爪上半在肉上各七壯不止十四壯炷如雀
屎大 風邪灸間使隨年壯 又灸承漿七
壯 又灸心輪七壯 又灸三里七壯 卒
狂鬼語針其足大拇趾爪甲下入少許即止

孫真人備急千金要方卷之四十四