

○上氣欬逆胃滿短氣牽背痛灸巨關期門各五十壯○上氣欬逆短氣胃滿多唾唾惡冷痰灸肺輸五十壯○上氣胃滿短氣欬逆灸雲門五十壯○上氣欬逆胃痺背痛灸胃堂百壯不針○上氣欬逆交重中五十壯○上氣氣閉欬逆咽冷聲破喉精精灸天瞿五十壯一名天突逆氣虛勞寒損憂恚筋骨痠痛心中欬逆泄症腹滿喉痺項強腸痔逆氣痔血陰急鼻衄骨痛大小便澀鼻中乾煩滿狂走易氣凡二十二病皆灸絕骨五十壯穴在內踝上三寸宛宛中

孫真人備急千金要方卷之五十七

孫真人備急千金要方卷之五十八 規

大腸腑方

痰飲第六論方灸法

論曰夫飲有四何謂師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲之證何以為異師曰其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之痰飲飲後水流在腸下欬唾引痛謂之懸飲飲水過多水行歸於四肢當汗出而汗不出身體疼痛謂之溢飲其人飲逆倚息短氣不得卧其人如腫謂之支飲凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而癩先寒即為虛先熱即為實故水在於心其人心下墜築築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脇下支滿嘔而痛水在於腎心下悸夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脉雙弦者寒也皆天下後喜虛耳脉偏弦者飲也肺飲不弦

宋刺秦郎守太常寺卿充秘閣校理林德榮校正

但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脉平也留飲形不發作無熱脉微煩滿不能食脉沉滑者留飲病有留飲者脇下痛引缺盆嗽轉甚其人飲而不得卧引項上痛然者如小兒掣縱狀夫胃中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脉沉者有留飲也心下有留飲其人背寒冷大如手病人肩息上引此皆有溢飲在胃中久者缺盆滿馬刀腫有劇時此為氣飲所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛惡寒目泣自出其人振振身

胸劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在一臂其脉沉細此非風也必有飲在上焦其脉虛者為微勞榮衛氣不周故也冬自瘧一作又病痰飲者當用溫藥和之

小半夏湯病心腹虛冷遊痰氣上胃腸滿不下食嘔逆者方

半夏升 生薑斤 橘皮四
右三味以水一斗煮取三升分三服
若心中急及心痛內桂心四兩若腹滿痛

內當歸三兩羸弱及老人尤宜服之一方
用人參二兩仲景無補
皮人參

又方
半夏升一 生薑升一 桂心兩三
甘草兩一

右四味以水七升煮取二升半分三服

甘草湯治心下痰飲胃腸支滿目眩方

甘草兩二 桂心 白朮各三兩
茯苓兩四

右四味以水六升宿漬煮取三升去滓服一升日三小使當利

十棗湯治病懸飲者若下後不可與也凡上氣汗出而飲者此為飲也方見飲
中
小青龍湯病溢飲者當發其汗方見飲
中 范汪

用大青龍湯
木防已湯腸間有支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈者用此方

木防已兩三 桂心兩二 人參兩四

石膏斤十二枚

右四味以水六升煮取二升分二服虛者即愈實者三日復發發則復與若不愈去石膏加茯苓四兩磁硝三合以水六升煮取二升去滓下消令烺分二服微下

利即愈一方不加茯苓

厚朴大黃湯夫酒客飲者必致吐血此坐火飲過度所致也其脈虛者必冒其胃中本有支飲支飲胃滿主之方

厚朴斤一 大黃兩六 枳實兩四

右三味以水五升煮取二升分為二服溫服之

葶藶大棗瀉肺湯治支飲不得息方見肺癆
中
小半夏加茯苓湯嘔家不渴渴者為心下解本渴今反不渴心下有支飲故也小半夏瀉主

之又有先渴却嘔者此為水停心下小半夏加茯苓湯主之治卒嘔吐心下痞腸間有水目眩悸方

半夏升一 茯苓兩三 生薑斤半
右三味以水七升煮取一升五合去

滓分再服溫服之用桂心四兩

五苓散假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而羸眩水也此方主之方見前第
九卷中
椒目圓腹滿口乾燥此腸間有水氣此方主之

椒目 木防已 大黃各三兩

葶藶兩二

右四味為末蜜丸如梧子大先食飲服數九日三後稍增口中有津液止渴者加碎硝半兩

甘遂半夏湯病者脉伏其人欲自利利子疾快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故以此方主之

甘遂大者三枚 半夏升十二枚水一升
芍藥三枚 甘草一斤煮取半升

右四味以蜜半升內二藥汁合得一升半煎取八合頓服之

大棗茶湯主胃中結痰飲澀結臍下弦滿嘔逆不得食亦主風水方

茯苓 白朮各三兩 當歸

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

橘皮 附子各二兩 生薑四兩

半夏 桂心各四兩 細辛四兩 人参一兩

右九味以水一斗煮取三升去滓分

三服服三劑良

茯苓湯治胃膈痰滿方

茯苓四兩 半夏一兩 生薑一斤

桂心八兩

右四味以水八升煮取二升半分四

服冷極者加大附子四兩若氣滿者加枳

榔三七枚此方與前卷嘔吐篇方相重分兩加減法不同

大半夏湯治痰冷游飲胃膈中不理方

半夏升 白朮三兩 生薑八兩

茯苓 人参 桂心

甘草 附子各二兩

右八味以水八升煮取三升分三服

半夏湯治痰飲游氣吞酸方

半夏 吳茱萸各三兩 生薑二兩

附子一枚

右四味以水五升煮取二升半分三服老

小各半日三

乾薑湯治腫及支滿游飲方

大棗枚十 大戟 大黃

黃芩 甘草 甘遂各一兩

芫花 芫花各半兩

右八味以水五升煮取一升六合分

四服空心服以快下為度

當歸湯治留飲宿食不消腹中積聚轉下方

當歸 人参 桂心

黃芩 甘草 芍藥

芒消各二兩 大黃四兩 生薑

澤瀉各三兩

右十味以水一斗煮取三升分三服

治痰飲飲食不消乾嘔方

人参 旋復花 橘皮

細辛各一兩 澤瀉 白朮

杏仁 枳實各二兩 茯苓

紫胡 生薑 半夏

芍藥各三兩

右十三味以水九升煮取二升七分

分三服日三

治胃中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水方

檳榔枚十二 生薑 杏仁

白朮各四兩 半夏八兩 茯苓五兩

橘皮三兩

右七味以水一斗煮取三升去滓分

三服

吳茱萸湯治胃中積冷心嘈煩滿汪汪不下

飲食心胃應背痛方

吳茱萸各三兩 半夏四兩 桂心

人参各二兩 甘草一兩 生薑五兩

大棗二十枚

右七味以水九升煮取三升去滓分

三服日三

治胃膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或

水鳴多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲

食此皆胃氣弱受冷故也其脉喜沉弦細遲

悉主之方

半夏 生薑各五兩 芍藥三兩

茯苓 旋復花 細辛

橘皮 桂心 人参

甘草 桔梗各二
 右十一味以水一斗煮取三升分三服病先有時喜水下者用白朮三兩去旋復花若欲得利者加大黃二兩須微調者用乾地黄

治冷熱久瀉實不能飲食心下虛滿如水狀方

前胡 生薑 茯苓
 半夏各四 甘草 枳實
 白朮各三 桂心二

右八味以水八升煮取三升分三服
 前胡湯治胃中久寒僻實隔塞胃痛氣不通利三焦冷熱不調飲食減少無味或寒熱身重卧不欲起方

前胡 人參 當歸
 甘草 半夏各三 大黃
 防風 麥門冬 吳茱萸
 黃芩各一 生薑四 杏仁四
 右十二味以水一斗煮取三升去滓分三服探師方云若腸下滿加大

旋復花湯治胃膈痰結唾如膠不下食者方

旋復花 細辛 前胡
 甘草 茯苓各二 生薑八
 桂心四 半夏升一 烏頭枚五
 右九味以水九升煮取三升去滓分三服

薑椒湯治胃中積聚痰飲飲食減少胃氣不足欬逆嘔吐方

薑汁七 蜀椒三 桂心
 附子 甘草各一 橘皮

右九味以水九升煮取二升半去滓內薑汁煮取二升分三服服三劑佳若欲服大散諸五石丸必先服此湯及進黃者九佳一方不用甘草

薑附湯治痰冷僻氣胃滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化方

生薑八 附子四
 右二味以水八升煮取二升分四服亦主平風

揀膈散治心上結痰飲實寒冷心悶方

瓜丁二十 赤小豆枚二十七 人參
 甘草分各一
 右四味治下篩酒服方寸匕日二亦治諸黃

斷膈湯治胃中痰癖方

恒山兩三 甘草 松蘿各一
 瓜蒂一枚

右四味以水酒各一升半煮取一升半分三服後服漸減之得快吐後須服半夏湯半夏湯方

松蘿湯治胃中痰積熱皆除方

松蘿兩二 烏梅 梔子各十
 甘草兩一 恒山兩三

右五味以酒三升浸一宿平旦以水三升煮取一升半去滓頓服之亦可分二服一服得快吐即止

杜蘅湯主吐百病方
 杜蘅 松蘿各三 瓜丁三七
 右三味以酒一升二合漬二宿去滓

分二服若一服即吐者止未吐者更服相
去如行十里久令藥力盡服一升積糜即
定者小用之亦佳

蜜煎主寒熱方

蜜合五 恒山 甘草各二

右三味取二味吹咀以水一斗煮取二升
去滓內蜜五合溫服七合吐即止不吐更
服七合勿與冷水一方用廿

又方 蜜合二 醋合八

右二味調和平旦頓服須臾振振欲吐
搥之若意中不盡明旦更服無不大嘔安
穩

治卒頭痛如破非中冷又非中風其痛是胃
膈中痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之即
瘥方

單煮若作飲二三升許適冷暖飲二升
須臾頓即吐畢又飲如此數過劇者
須吐膽乃止不損人而渴則瘥

葱白湯治冷熱膈脹發時頭痛悶亂吐不

得者方

葱白二七 桃葉一把一作

真珠 恒山 烏頭

甘草各半

右六味吹咀以水酒各四升和煮取三升

去滓內珠每服一升吐即止

大五飲圓主五種飲一曰留飲停水在心下

二曰澀飲水澀在兩脅下三曰痰飲水在胃

中四曰溢飲水溢在膈上五臟間五曰流飲

水在腸間動搖有聲夫五飲者由飲酒後及

傷寒飲冷水過多所致方

從容 遠志 苦參

藜蘆 烏賊骨 白朮

甘遂 大黃 石膏

桔槿根 桔梗 半夏

紫苑 前胡 五味子

磁石 桂心 芫花

當歸 人參 貝母

茯苓 芍藥 大戟

葶藶 黃芩各一 甘草

恒山

薯蕷 厚朴

細辛 附子各三 巴豆三十

右三十三味為末蜜和丸如梧子大飲服

三九日三稍稍加之以知為度

旋復花圓治停痰澀飲結在兩脅腹脹滿羸

瘦不能食食不消化喜唾乾嘔大小便或澀

或利腹中動搖作水聲腹內熱口乾好飲水

漿卒起頭眩欲倒脇下痛方

旋復花 桂心 枳實

人參各五 甘遂各三 吳茱萸

細辛 大黃 黃芩

葶藶 厚朴 芫花

橘皮各四 乾薑 芍藥

白朮各六 茯苓 狼毒

烏頭 礬石各八

右二十味為末蜜丸如梧子大酒服五丸

日二後加以知為度延年方無白米散毒

厚朴具桑葉芫花橘皮甘遂有烏黃附子

各二分蜀椒防葵各人各三兩乾地黃四

中軍候黑圓治澀飲停結滿悶目暗方黑又

芫花^三 巴豆^八 杏仁^五

桂心^三 桔梗^{各四}

右五味為末蜜丸如胡豆每日服三九稍增得快下止

順流紫圓治心腹積聚兩脇脹滿留飲痰癖

大小便不利小腹切痛膈上塞方

石膏^五 代赭 烏賊骨

半夏^{各三} 桂心^四 巴豆^七

右六味為末蜜丸如胡豆平旦服一丸加至二九

胡洽有藥蘆薹各當歸各三分芫花注方無石膏半夏有當歸一分

芫三分 蘆二 薹二

治停痰癖飲結在兩脇腹滿羸瘦不能飲食

食不消喜噎乾嘔大小便或澀或利方

旋復花 大黃 附子

茯苓 椒目 桂心

芫花 狼毒 乾薑

芍藥 枳實 細辛^{各八}

右十二味為末蜜丸如梧子飲下三九日

三服後漸增

治風氣膈上痰飲方

不開口苦飢湯煮三五沸以物裹熨心

膈上

治結積留飲癖囊胃滿飲食不消方

後通谷五十壯

九蟲第七方

論曰人腹中有尸蟲此物與人俱生而為人

大害尸蟲之形狀似大馬尾或如薄筋依脾

而居乃有頭尾皆長三寸又有九蟲一曰伏

蟲長四分二曰虻蟲長一尺三曰白蟲長一

寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀如蠅六

曰胃蟲狀如蝦蟇七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰

赤蟲狀如生肉九曰螻蟲至細微形如菜蟲

狀伏蟲則牽蟲之主也虻蟲貫心則殺人白

蟲相生子孫轉多其母轉大長至四五寸亦

能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人欬嗽胃蟲

令人嘔吐胃逆喜噎弱蟲又名膈蟲令人多

唾赤蟲令人腸鳴螻蟲居胴腸之間多則為

痔劇則為癩因人瘡瘻即生諸癰疽癰癩痛

疥癬蟲無所不為人亦不必盡有有亦不必

盡多或偏有或偏無類婦人常多其蟲凶惡

人之極患也常以白蓮草沐浴佳根葉皆可

用既是香草且是尸蟲所畏也

論曰凡欲服補藥及治諸病皆須去諸蟲并

痰飲宿癖醒醒除盡方可服補藥不爾必不

得藥力

治肝勞生長蟲在肝為病恐畏不安服守方

蠟 吳茱萸東行椶皮^{各二}

乾漆^四 雞子^{五枚} 粳米粉^半

右五味搗菜葉皮為末和藥銅器中煎可

丸如小豆大宿勿食平旦飲服一百丸小

兒五十九蟲當爛出^{詳驗方無茱萸}

治心勞熱傷心有長蟲名曰蠱長一尺貫心

為病方

雷丸 橘皮 桃仁^{一作}

石蠶^{各五} 狼牙^六 貫衆^二

僵蠶^三 吳茱萸椶皮^七

蕪荑 青箱 乾漆^{各四}

亂髮^{如雞子}

右十二味為末蜜丸如梧子空腹苦酒下

七丸加至二七丸日二服一方無石蠶

治脾胃熱有白蟲在脾中為病令人好嘔下
蟲方

大麻子升八 東引吳茱萸根一大者
橘皮二

右三味以咀以水煎臨時量服凡合禁聲

勿語道作藥蟲當開便不下切忌之
治肺勞熱生蟲在肺為病方

狼牙三 東行桑根白皮切一
東行吳茱萸根白皮合五

右三味以咀以酒七升煮取一升平旦頓
服之

治腎勞熱四肢腫急蟻蟲狀如菜蟲在腎中
為病方

蕪荑 胡粉 槐皮各一
乾漆二 貫衆三 杏仁四
吳茱萸五 枳實十

右七味治下篩平旦并花水服方寸匕加
至一七半瘥止

治蟻蟲方
以好鹽末二兩苦酒半升合銅器中煮

數沸宿不食空心頓服之
又方

真珠二 亂髮如雞子
右二味治下篩以苦酒調旦起頓服之肝

藜蘆治少小有蛇蟲結在腹中數發腹痛
微下白汁吐酸寒熱飲食不生飢皮肉痿黃
四肢不相勝舉方

藜蘆 貫衆 雷丸
山茱萸 天門冬 狼牙各八

右八味為末蜜丸如大豆三歲飲服五丸
五歲以上以意加之漸至十九加藜蘆六
分名藜蘆丸治老小及婦人等滿病腹內
冷熱不通急滿痛骨隔堅滿手足煩熱上
氣不得飲食身體氣腫腰脚不遂腹內狀
如水雞鳴婦人月經不調無所不治

治蛇蟲方
藜蘆末以飲醴和服方寸匕七不覺加之

備急以
治蛇蟲

治熱患有蛇蟲懊懷方

藜蘆分十 乾漆 篇竹各二
右三味治下篩米飲和 合服之日三

治蛇蟲在胃中漸漸羸人下

醇酒 好漆外臺作 白蜜各一
右三味內銅器中微火煎令可丸如桃核
一枚溫酒中宿勿食且服之蟲必下未下
更服外臺治

又方取棟實淳苦酒中浸再蜜用綿裹內穀
道中入三寸一日易之集驗文用

治蛇蟲攻心腹痛方
劉薏苡根二斤以水七升煮取三升先
食服之蟲即死出

又方鶴蝮苦酒空腹服方寸匕佳
又方七月七日採蕪蕪子陰乾燒灰先食服
方寸匕日三即瘥

治寸白蟲方
吳茱萸細根一 大麻子三升
右二味以水三升和搗取汁平旦頓服至
已時與好食令飽須臾蟲出不瘥明且更

合服之不瘥三日服附後治三蟲以酒漬取汁服

又方

燕萁六分 狼牙四分 白欬二分

右三味治下篩以苦酒二合和一宿次早

空腹服之規八

又方

胡麻升 胡粉兩

右二味為末明旦空腹以猪肉臠汁散盡

即瘥

又方榧子四十九枚去皮以月上旬平旦空

腹服七枚七日服盡蟲消成水永瘥

又方取吳茱萸北陰根乾去土切一升以酒

一升浸一宿平旦分二服凡茱萸皆用細根

東引北陰者良若如指以上大不在用

又方用石榴根如茱萸法亦可水煮

又方研大麻取汁五升分五服亦治小兒疳蟲

又方以好油麻二升煎令熟內葱白三寸葱

白黑便熟冷頓服之

又方葵錫令十分燥作末以藥方寸七內羊

肉臠中服之

又方桑根白皮切三升以水七升煮取二升宿勿食平旦空腹頓服肘後云平大行中見是腹中已多蟲故也

理之

又方檳榔二七枚治下篩以水二升半先煮

其皮取一升半去滓內末頓服暖即蟲出或

不盡更合服取瘥止宿勿食且服之

論曰凡得傷寒及天行熱病腹中有熱又人

食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及

下部若齒斷無色舌上盡白甚者唇裏有瘡

四肢沉重忽喜眠當數看其上脣內有瘡

唾血脣內如粟瘡者心內懊憹痛悶此蟲在

上蝕其五臟下脣內生瘡者其人喜眠此蟲

在下蝕其下部人不能知可服此蝕蟲藥不

爾醫蟲殺人又曰凡患濕腫者多是熱病後

或久下不止或有寒熱結在腹中或易水土

溫涼氣著多生此病亦有乾膿不甚泄痢而

下部瘡癢不問乾濕久則殺人凡濕得冷而

苦痢單黃連及艾葉苦參之屬皆可用之

若病人齒斷無色舌上白者或喜眠煩憤不

知痛癢處或下痢急治下部不曉此者但攻

其上不以下部為意下部生蟲蝕其肛肛爛見五臟便死燒艾於竹筒熏之

治傷寒蠱病方

取生雞子小頭叩出白入椀一合熟和

攪令極調當沫出更內著殼中仰吞之

食頃或半日乃吐下蟲劇者再服盡

熱除病愈

治濕蠱方

黃連 生薑各十兩 艾葉兩八

苦參兩四

右四味艾咀以水一斗煮取三升分三服

又者服三劑

懊憹散治濕蠱瘡爛殺蟲除蠱方

篇竹兩半 藜蘆 雷丸

青箱 女青 桃仁各三兩

右六味治下篩搗飲服方寸七日三加至

二七亦酒服

青箱散治熱病有蠱下部生瘡方

青箱子兩一 橘皮 篇竹各二兩

藜蘆兩四 甘草分一 狼牙分三

右六味治下篩米飲和每服一合日三不
止稍加之小品集

營蜜湯治濕蠱方

生薑汁合 白蜜合 黃連兩三

右三味以水二升別煮黃連取一升去滓

內薑蜜更煎取一升二合五歲兒平旦空
腹服四合日二

治蠱蝨蝨下部癢殺道中生瘡方

阿膠 當歸 青箱子各二

艾葉一

右四味以咀以水八升煮取二升半去滓
分三服

杏仁湯治蠱方

杏仁伍十 苦酒升二 鹽合

右三味和煮取五合須服之小兒以意量

服

桃皮湯治燒蟲蛔蟲及痔蠱蝨食下部生瘡

方

桃皮 艾葉各一 槐子三

大棗三十

右四味以咀以水三升煮取半升頓服之
良

豬膽苦酒湯治熱病有膿上下攻移殺人方

豬膽一具苦酒半升和之火煎令沸三

上三下藥成放溫空服飲三滿口蟲死
便愈

治濕病下部有瘡蝨蝨人五臟方

雄黃 皂莢各一 麝香

朱砂各二

右四味為末蜜和搗萬杵初得病酒服如

梧子大一九日二若下部有瘡取如梧子

大末內下部日二

治下部生瘡方

濃煮桃皮煎如糖取內下部口中有瘡

含之

治濕蠱方

取生薑刮去皮斷理切之極熟研取汁

一升半又以水一升半合和相得平旦

空腹服仍削生薑二枚如蘭大以楸葉

苦桃葉數重裹訖於爐灰火中燒令極

熱內下部中食頃若濕感者三日作頓
服無有不瘥

又方

青黛兩二 黃連 黃蘗

丁香各一 麝香分二

右五味治下篩以小棗大內下部中日一
度重者棗大和車脂二三合灌下部中日

二服

雄黃散治時氣病蠱下部生瘡方

雄黃兩半 桃仁兩一 青箱子

黃連 苦參各三

右五味為末綿裹如棗核大內下部亦可

棗汁服方寸七日三

治病蠱蝨方

燒馬蹄灰作末以豬脂和傅綿繩上內

下部中日四五度

治大孔蟲瘻方

蒸大棗取膏以水銀和捻長三寸綿裹

訖宿內大孔中明旦蟲皆出水銀損腸

宜慎之

治蟲蝕下部方

胡椒 雄黃

右二味各等分為末著穀道中亦治小兒

治傷寒熱病多睡變成濕腫四肢煩疼不得

食方

羊桃十斤切搗令熟暖湯三斗淹浸之

日正午時入中坐一炊久不過三度瘡

治熱病結毒令人喜寐不知痛處面赤如醉

下利膿血當數視其人下部大小之孔殺殺

然一云殺赤則膿瘡者也劇因殺人見人肝

肺服藥不瘥可煮之方

以泥作小甕令受一升竹筒一枚如指

大者一頭橫穿入甕腹中一頭內人較

道中淺入可取熱艾如雞子大者八帶

然之於甕口吹煙令入人腹艾盡乃止

大人可益艾小兒減之贏者不得多多

亦害人日再煮不過三作蟲則死下斷

亦可未燒雄黃如此煮之

孫真人備急千金要方卷之五十八

孫真人備急千金要方卷之五十九 規九

宋劉宗素字素小南元初醫學博士

腎臟方

腎臟論第一

論曰腎主精腎者生來精靈之本也為後宮

內官則為女主所以天之在我者德也地之

在我者氣也德流氣薄而生者也故主來謂

之精精者腎之藏耳者腎之官也腎氣通於

耳耳和則能聞五音矣腎在竅為耳然則腎

氣上通於耳下通於陰也左腎主右腎發循

環玄宮上出耳門候開四遠下迴玉海俠脊

左右與臍相當經於上焦榮於中焦衛於下

焦外主骨內主膀胱腎重一斤一兩有兩枚

神名淵澗主藏精號為精藏隨節應會故云

腎藏精精舍志在氣為火在液為唾腎氣虛

則厥逆實則脹滿四肢正黑虛則使人夢見

舟船溺人得其時夢伏水中若有異怖腎氣

虛則夢腰脊兩解不相屬厥氣客於腎則夢

臨淵沒居水中

凡腎藏象水與膀胱合為腑其經足少陰與

太陽為表裏其脈沉相於秋至於冬冬時萬

物之所藏百蟲伏蟄陽氣下陷陰氣上升陽

氣中出陰氣例而為霜遂不上昇化為霜雪

猛獸伏蟄螺蟲隱藏其脈為沉沉為陰在裏

不可發汗發之者如螺蟲出見其霜雪陰氣

在表陽氣在藏慎不可下下之者傷脾脾土

弱即水氣妄行如魚出水蛾入湯重客在裏

慎不可熏熏之逆客其息則喘無持客熱令

口爛瘡陰脈且解血散不通正陽遂厥陰不

往從客熱狂入內為結胃脾氣遂弱續續

通

冬脈如營冬脈者腎也北方水也萬物之所

以合藏也故其氣來沉以搏故曰營反此者

病何如而反其氣來如彈石者此謂太過病

在外其去如數者此謂不及病在中太過則

令人解俠脊脈痛而少氣不欲言不及則令

人心懸如病飢飢中清脊中痛小腹滿小便

變赤黃

腎脈來喘喘累累如勾按之而堅曰平冬以

胃氣為本腎脈來如引葛按之益堅曰腎病