

孫真人備急千金要方卷之七十四 蠱三

宋劉奉璋中太常少卿元秘開按理林樞等狀正

解毒方

蠱毒第四論

論曰蠱毒千品種種不同或下鮮血或好卧閣室不欲光明或心性反常乍噴乍喜或四肢沈重百節酸疼如此種種狀貌說不可盡亦有得之三年乃死急者一月或百日即死其死時皆有九孔中或於腸下肉中出去所以出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蠱貓鬼狐狸老物精魅水不敢著人養生之家大須慮此俗亦有灸法初中蠱於心下捺便大炷灸一百壯并主貓鬼亦灸得愈又當足小指尖上灸三壯當有物出酒上得者有酒出飯上得者有飯出肉菜上得者有肉菜出即愈神驗皆於灸瘡上出凡中蠱毒令人心腹絞切痛如有物當或吐下血皆如爛肉若不即治蝕入五臟盡乃死矣欲驗之法當令病人唾水沈者是蠱不沈者非蠱也

凡人患積年時復大便黑如漆或堅或薄或微赤者皆是蠱也

凡人忽患下血以斷下方治更增劇者此是中蠱也

凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆是蠱

毒粗醫以斷痢藥處之此大非也

世有拙醫見患蠱脹者遍身腫滿四肢如故小便不甚澀以水病治之延日服水藥經五十餘日望得痊愈日復增加奄至隕歿如此者不一學者當細尋方意消息用之萬不失

一醫方千卷不盡其理所以不可一一備述云耳

凡人中蠱有人行蠱毒以病人者若服藥知蠱主姓名當使呼喚將去若欲知蠱主姓名者以敗鼓皮燒作末以飲服方寸匕須臾自呼蠱主姓名可語令去則愈又有以蛇涎合

作蠱藥者飲食中使人得痲病此一種積年乃死療之各自有藥江南山間人有此不可不信之

太上五蠱圓治百蠱吐血傷中心腹結氣堅

寒咽喉語聲不出短氣欲死飲食不下吐逆上氣去來無常狀如鬼祟身體浮腫心悶煩寒寒戰夢與鬼交狐狸作魅卒得心痛上又胃腸痛如刀刺經年累歲者牀不起惡主之方

雄黃

椒目

巴豆

莽草

芫花

真珠外臺用木香

鬼臼

礬石

藜蘆各四分

附子五分

獾肝一分

蜈蚣二枚

斑貓三十枚

右十三味為末蜜和更搗二千杵丸如小豆先食飲服一九餘密封勿泄藥氣十九

為一劑如不中病後日增一九以下利為度當下蠱種種狀狀不可具述下後七日將息服一劑三十年百病盡除息五辛

太乙追命圓治百病若中惡氣心腹脹滿不得喘息心痛積聚腫脹疝瘕宿食不消吐逆嘔啞寒熱瘰癧蠱毒婦人產後餘疾方

蜈蚣一枚

丹砂

附子

礬石一作

雄黃

藜蘆

此方乃孫真人備急千金要方卷之七十四中蠱毒第四論之解毒方。其方中列有雄黃、椒目、巴豆、莽草、芫花、真珠、鬼臼、礬石、附子、獾肝、蜈蚣、斑貓等藥。此方主治寒咽喉語聲不出、短氣欲死、飲食不下、吐逆上氣、去來無常、狀如鬼祟、身體浮腫、心悶煩寒、寒戰、夢與鬼交、狐狸作魅、卒得心痛、上又胃腸痛如刀刺、經年累歲者牀不起、惡主之方。

鬼曰各一 巴豆二分

右八味為末蜜丸如麻子一服二九日一服傷寒一二日服一丸當汗出綿裹兩丸塞兩耳中下利服一丸一丸塞下部蠱毒服二丸在外膏和摩病上在臍上吐膈下

利有瘡一丸塗之毒自出產後餘疾服一丸耳聾綿裹塞耳

治人得藥雜蠱方

斑貓六枚 桂心 藜蘆各如大
釜月下土九如彈丸大

右四味治下篩水服一錢匕下蠱蛇蟻蠅萬病圓治蠱注四肢浮腫肌膚消索咳逆腹大如水狀死後轉易家人一名蠱脹方小品名萬病丸一名萬病丸

雄黃 巴豆 莽草

鬼曰各四兩 蜈蚣三枚

右五味為末蜜和搗三千杵丸如小豆密封勿泄氣宿勿食平旦空腹一丸一炊久不知更加一丸當先下清水次下蠱長數

寸及下蛇又下蠱雞子或白如膏下後作惡歧粥補之百種煖將息

治中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝病變無常處方肘後古今錄驗方俱云用鐵服三九日再蒸者不過十日千金用後方極千金錄

殺羊皮寸方五 犀角 芍藥

黃連 牡丹兩各一 藜蘆四兩

施子仁枚七

右七味以水九升煮取三升分三服葛氏崔氏同無芍藥牡丹施子用苦參升麻當歸

犀角圓治蠱毒百病腹暴痛飛屍惡氣腫方

犀角屑 鬼臼屑 桂心末

羚羊角屑各四錢七 天雄

莽草 真珠 雄黃各一

貝子五枚 蜈蚣五 巴豆五十枚

麝香分 射罔如雞子黃大一枚

右十三味為末合搗蜜丸如小豆服一丸

日二合咽不知少增之卒得腹滿蜚屍服如大豆許二丸若惡氣腫以苦酒和塗上縫袋子感藥繫左臂辟不祥鬼疰蠱毒可

以備急

治蠱毒方

茜根 藜蘆根各三

右二味以水四升煮取二升頓服肘後方云治中蠱吐血或下血皆如爛肝者白如蠱生姓名

又方

蝟皮灰 亂髮灰各一方

生麻子汁五升 榭樹北陰白

桃根皮各五

右五味先煮榭皮桃根取濃汁一升和麻

子汁髮灰等令勻患人宿少食豆服一大升須臾者盆水以雞翎撻吐水中如牛涎

積胎及諸蟲並出

又方榭樹北陰白皮一大握長五寸水三升煮取一升空腹服即吐蟲出亦治中蠱下血

又方蝟皮灰水服方寸匕亦出蟲

又方

大戟

斑貓分一

五月五日桃白皮必欲方云以東引者大戟之各四分

右三味治下篩旦空腹以水一雞子許服

八拾用二指相若如開頓服之若指頭相離取藥太多恐能損人肘後方云服藥極服必效方云服半方寸匕其毒即出不出一更一服李純別云若以酒中得則以酒服以食中得飲服之

治蛇蠱方蛇毒入果中食之令人得病名曰蛇蠱

大豆末以酒漬絞取汁服半升

治諸熱毒或蠱毒鼻中及口出血醫所不治者方

取人屎尖七枚燒作火色置水中研之頓服即愈亦解百毒時氣熱病之毒服

極神驗

治蠱吐下血方

樟皮廣五寸長一尺又盧菝根五寸如足大指口

右二味以水二升煮取一升頓服極下蠱

治中蠱下血日數十行者方

巴豆二七 元青 藜蘆

附子 礬石各二分

右五味為末別治巴豆合篩和相得以綿裹藥如大豆許內下部中日三瘡

又方苦瓠一枚以水二升煮取一升稍稍服之當下蠱及吐蝦蟇蝌蚪之狀一月後乃盡范江方云香絲藥當臨時量用之附後方云用苦瓠升煮

治下血狀如雞肝腹中攪痛難忍者方

茜根 升麻 犀角各三兩

桔梗 黃蘗 黃芩各二兩

地榆 白蘘荷各四兩

右八味以水九升煮取二升半分三服此蠱利血用之

又方

桔梗 犀角各等

右二味為末酒服方寸七日三不能自服絞口與之藥下心中當煩須臾自靜有頃

下服至七日止可食猪脾臟自補養治蠱下血如雞肝日夜不解欲死者皆可用

治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不瘥者方

牛膝一兩搥散切以薄清酒一升漬一宿平旦空腹服之再服便愈

北地太守酒治萬病蠱毒風氣寒熱方

烏頭 甘草 芍藥

黃芩 桂心 藜蘆

附子各四兩 白欬 桔梗

半夏 柏子仁 前胡

麥門冬各六兩

右十三味七月麴十斤秋末一斛如醞酒法以藥以絹袋盛之沈於瓮底酒熟去糟還取藥津以青布袋盛沈著酒底泥頭

秋七日夜五日冬十日空腹服一合日三以知為度藥有毒故以青布盛之服勿中止二十日大有病出其狀如漆五十日病

悉愈婦人年五十被病連年腹中積聚冷熱不調時時切痛達臍絞急上氣胃滿二十餘年服藥二十七日所下三四升即愈又有女人病偏枯終產服二十日吐黑物大如刀帶長三尺許即愈其年生子又有女人小得癩病服十八日出血二升半愈有人被杖崩血內癢卧著九年服藥十三日出黑血二三升愈有人耳聾十七年服藥三十五日鼻中出血三升耳中出黃水五升便愈古方云煮平二年北地太守臣光

上然此偏主蠱毒有人中蠱毒者服無不愈極難癒者不過二七日所有效莫不備出曾有一女人年四十餘偏枯羸瘦不能起長卧牀枕耳聾一無所聞兩手不收已經三年余為合之遂得平復如舊有人中蠱毒而先患風服茵芋酒傷多吐出蠱數十枚遂愈何況此酒而不下蠱也嘉其功效有異常方故具述焉

胡臭漏腋第五方

論曰有天生胡臭有為人所染臭者天生臭者難治為人所染者易治然須三年醋傳藥石散勿止并服五香丸乃可得瘥勿言一度傳藥即瘥正一傳藥時暫得一瘥耳五香丸見前第六卷中凡胡臭人通忌食芸薑五辛治之終身不瘥

石灰散治胡臭方

石灰一斤 楓香一作 丁香
薰陸香 青木香各二兩 礬石四兩
橘皮 陽起石各三兩
右八味治下篩以綿作篆子粗如指長四寸

展取藥使著篆上以絹袋盛著腋下先以布措令痛然後挾之

又方三年苦酢和石灰傳之

治胡臭方

辛夷

芎藭

細辛

杜蘅

藁本各二兩

右五味吹咀以淳苦酒漬一宿煎取汁傳之欲傳取臨卧時以瘥為度

又方

青木香

附子

白灰各二兩

礬石一斤

右四味為散著粉中常粉之肘復無

又方赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹

腋下冷復易

又方櫛葉切三升以水五升煮取一升用洗

腋下即以白苦蘇燒令煙出熏之數數作用

又方

辛夷

細辛

芎藭

青木香分

右四味治下篩重竟粉之

又方馬齒菜一束搗碎以蜜和作團以絹袋盛之以泥紙裹厚半寸曝乾以火燒熟破取更以少許蜜和使熱勿令冷先以生布措之夾藥腋下藥痛久忍之不能然後以手中勒兩臂

又方

牛脂

胡粉各等分

右二味煎令可丸塗腋下一宿即愈不過三劑肘復方云

又方伏龍肝作泥傳之

六物散治漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕臭者方

乾枸杞根

乾薔薇根肘復作

甘草各半兩

商陸根

胡粉

滑石各一兩

右件藥治下篩以苦酒少少和塗當微汗

出易水復更塗上不過三著便愈或一歲復發發復塗之

又方

水銀

胡粉外壹作

右二味以面脂研和塗之良驗

又方

石灰^{升三} 銀屑^{一作升一}

右二味合和銷囊盛汗出粉之妙

又方正旦以尿洗腋下神妙

又方黃礬石燒令汁盡治為末銷囊盛粉之即瘥

脫肛第六方灸法

肛門主肺肺熱應肛門熱則閉塞大行不通腫縮生瘡允通方

白蜜三升煎令燥冷水中調可得為丸長六七寸內肛門中到身上頭向下少時取燂斯須即通洞泄

豬肝散肛門主大腸大腸寒應肛門寒則洞瀉肛門滯出

豬肝^{一斤} 黃連^三 阿膠^{十二} 芎藭^{各二} 艾葉^一 烏梅肉^五

右六味治下篩溫清酒一升服方寸匕半日再若不能酒與清白米飲亦得

壁土散治肛門滯出方

故屋東壁土^{一升}

皁莢^三 枳殼^{各長}

右二味先搗土為散挹粉肛頭出處次取皁莢炙煖更過敷取入則止

又方炙故麻履底按令入頻按令入永瘥

海藻 龍膽 海蛤 昆布 卷石^{一作卷石}

通草

松蘿^{各三} 麥麩^{分四} 半夏^{分二}

右九味治下篩酒服方寸匕日三禁食魚

猪肉五辛生菜諸難消之物十日知二十日愈

又方

小麥麩^一 海藻^一 特生卷石^十

右三味以三年米醋漬小麥麩曝乾各搗為散合和服一方寸匕日四五服藥合極乃咽之禁薑五辛猪魚生菜大吹大讀誦大叫語等

又方

昆布 松蘿 海藻^{各三}

桂心 海蛤 通草

海藻

白欬^{各二}

右七味治下篩酒服方寸匕日三

又方

海藻 海蛤 昆布 松蘿^{各一}

半夏^{各三} 土瓜根 龍膽^{各二}

通草 白欬

右十味治下篩酒服方寸匕日再不得作重用力

又方昆布二兩洗切如指大醋漬合咽汁盡愈

又方

海藻^{一斤} 小麥麩^一

右二味以三年醋一升浸麩末曝乾往反醋盡合搗為散酒服方寸匕日三服忌勞力崔氏云療三

五癭圓方

菖蒲^二 海蛤 白欬

續斷 海藻 松蘿

桂心 蜀椒 到掛草

半夏^{各一} 神麩^三 羊鬻^百

右七味治下篩酒服方寸匕日三

又方

海藻^{一斤} 小麥麩^一

右二味以三年醋一升浸麩末曝乾往反醋盡合搗為散酒服方寸匕日三服忌勞力崔氏云療三

五癭圓方

菖蒲^二 海蛤 白欬

續斷 海藻 松蘿

桂心 蜀椒 到掛草

半夏^{各一} 神麩^三 羊鬻^百

右七味治下篩酒服方寸匕日三

又方

海藻^{一斤} 小麥麩^一

右二味以三年醋一升浸麩末曝乾往反醋盡合搗為散酒服方寸匕日三服忌勞力崔氏云療三

五癭圓方

菖蒲^二 海蛤 白欬

續斷 海藻 松蘿

桂心 蜀椒 到掛草

半夏^{各一} 神麩^三 羊鬻^百

右十二味治下篩以牛羊髓脂為丸如梧
子日服三九

又方取鹿脂以佳酒浸令浸炙乾肉酒中更
炙令香含咽汁味盡更易盡十具愈
灸法

瘦惡氣灸天府五十壯千金翼云又

瘦上氣短氣灸肺輪百壯

瘦上氣留滿灸雲門五十壯

瘦勞氣灸衝陽隨年壯

瘦氣面腫灸通天五十壯

瘦灸天瞿三百壯橫三間寸灸之

又灸中封隨年壯在兩足趺上曲尺宛宛中

諸瘦灸肩髃左右相當宛宛處男左十八壯

右十七壯女右十八壯左十七壯或再三取

瘥止

又灸風池百壯俠項兩邊

又灸兩耳後髮際一百壯

又灸頭衝一作頭衝在仰兩手直向前令臂

著頭對鼻所注處灸之各隨年壯千金翼云

凡肉痛勿治治則殺人慎之附後方云

陷腫散治二三十年瘦瘤及骨瘤脂瘤石瘤
肉瘤膿瘤血瘤或息肉大如杯杆升斗十年
不瘥致有漏潰令人骨消肉盡或堅或軟或
潰令人驚悸寤寐不安身體瘦縮愈而復發
方

烏賊骨

紫石英

琥珀

大黃

石硫黃各一分

鍾乳各二分

附子

乾薑各四分

白石英

丹參三分

胡蘆屎

右十一味治下篩以韋囊盛勿泄氣若瘡

濕即傅若瘡乾猪脂和傅日三四以乾為

度若汁不盡者至五劑十劑止藥令人不

痛若不消加砒硃二兩佳

治瘦瘤方

昆布

各一

羊脂七枚

海藻

桂心

逆流水柳鬚

乾薑各二分

右六味為末蜜丸如小彈子大含一九咽

又方

礬石 芎藭 當歸
大黃 黃連 黃芩
白欬 芍藥 吳茱萸
右九味治下篩雞子黃和塗故細布上隨
痛大小厚薄帖之乾則易者藥熱當作膿
脂細細從孔中出須以膿血盡著生肉膏
若膿不盡復起如故

當歸

附子

甘草

白芷

芍藥

薤白

生地黃

右七味吹咀以猪脂三升半煎白芷黃去

滓稍以傅之日三

又方以狗屎蝦雞子傅之去膿水如前方說

傅生肉膏取瘡方見前二

陰癩第八論

論曰癩有四腫有腸癩卵脹氣癩水癩腸癩

卵脹難瘥氣癩水癩針灸易治

治癩圓方

桃仁

蜘蛛

桂心

蕤藜子 地膚子

澤瀉

防風

五味子

橘皮

茯苓

防葵

芍藥各二兩

牡丹皮

細辛

海藻各一兩

狐陰具一

右十六味為末蜜和丸如梧子服十九丸稍加至三十九丸方角處一丸令頓上兩角各令半丸上爪指佳七壯愈

陰癩灸足大趾下理中十壯隨腫邊灸之時方云灸足大趾第二節下橫文正中央五壯姚氏云足大趾本三壯

男兒癩先將兒至碓頭祝之曰坐汝令兒某甲陰囊癩故灸汝三十七一一枚灸訖便牽

小兒令雀頭下向着囊縫當陰頭灸縫上七壯即消已驗艾炷獨替頭許

大凡男癩當騎碓軸以莖伸置軸上齊陰莖頭前灸軸木上隨年壯

論曰有人自少至長陰下常有乾癬者宜依癬方主之有五勞七傷而得陰下瘡濕搔之黃汁出者宜用補丸散主之仍須傳藥治之亦有患如精瘡者以如精方治之夫如精瘡

者男子在陰頭節下婦人在玉門內並似甘瘡作日齊食之大痛甘即不痛也

蕤藜子湯凡虛熱石熱當路門冷濕傷肌熱聚在裏變成熱及水病腫滿腹大氣急大小便利腫如皮紙盛水見見如老蠶色陰莖

堅腫為瘡水出此皆腎熱虛損強取風陰濕傷脾胃故也治之法內宜依方服諸利小便藥外以此湯洗四肢竟以葱白膏傳之別以

猪蹄湯洗莖上蕤藜子湯方

蕤藜子 葱心青皮 赤小豆各一升

菘菜子升二 葫蘆升五 巴豆一枚合

右六味以水二斗煮取八升以淋洗腫處

猪蹄湯治服石發熱因勞損熱盛當風露臥並腫方

猪蹄雙 蒺藜子一升

葶藶子合五 黃蘗合五 地榆

右六味以水一斗五升煮取六升去滓適令煖便洗瘡日再或只煮黃蘗汁洗亦佳

孫真人備急千金要方卷之七十四