

孫真人備急千金要方卷之七十七

慈安

備急方

宋朝奉郎守太常少卿光和閣使理林儀等校正

被打及諸傷損第三方

論曰凡被打損血悶搶心氣絕不能言可擘

開口屎中令下咽即醒又墮車落馬及車碾

木打已死者以死人安著以手袖掩其口鼻

眼上一食頸活眼開與熱小便二升

治被打擊頭眼青腫方

炙肥豬肉令熱揜上時後方云治血氣者皮膚間不消散者

又方牆上朽骨唾於石上研磨塗之乾即易

又方炙猪肝貼之

又方新殺羊肉乘熟封之

又方大豆黃爲末水和塗之

治被打傷破腹中有瘀血方

右三味治下節以酒服方寸匕日三夜一

又方當歸桂心各二

蒲黃半兩

右三味㕮咀以水二升煎取七合復內酒

劉寄奴 延胡索 骨碎補各一

及小便各一合熱溫頓服

又方

塵蟲

蠶蟲

水蛭各三枝

桃仁十五枚

桂心二兩

大黃五兩

右六味㕮咀以酒水各五升煮取三升分

五服

又方生地黃汁三升酒一升半煮取二升七

合分三服時後方云治從高墮下瘀血者

又方蕎苔子爲末傅瘡上

白馬蹄散治被打腹中瘀血并治婦人瘀血

化血爲水方

白馬蹄燒令煙盡搏篩酒服方寸匕日三夜一

治被歐擊損傷聚血腹滿煩渴方

豉一升以水三升煮三沸分再服不瘥

重作更取麻子煮如豉法不瘥更煮豉

上法

治有瘀血者其人喜忘不欲聞人聲胷中氣

塞短氣方

甘草一兩

茯苓二兩

杏仁五十枚

右三味㕮咀以水二升煮取九合分二服

治從高墮下傷折瘀痛煩燥啼叫不得卧方

取鼠屎燒末以豬膏和塗痛上即急裹

之時後方云

之塞骨破碎

治從高墮下又爲木石所迮或因落馬凡傷

損血瘀凝積氣絕欲死無不治之方

取淨土五升蒸令溜分半以故布數重

裹之以慰病上勿令大熱恐破肉冷則

易之取痛止即已凡有損傷皆以此法

治之神效已死不能言者亦活三十年

者亦瘥

治墮車馬間馬鞍及諸物隱體內斷方

以酢和麪塗之

當歸散治落馬墮車諸傷腕折臂脚痛不止

方

當歸桂心蜀椒附子澤蘭各一分

甘草五分

附子分二

澤蘭分一

芎藭分六

右七味並熬令香治下節酒服方寸匕日三丸是傷損皆服之十日愈小兒亦同

意

方云治墮馬落車跌打傷腕折臂呻吟痛  
日筋骨相連

蓄著散治腕折方

黃耆

芍藥各三兩

當歸

乾地黃

附子

續斷

大黃一兩

乾薑

通草各二兩

桂心

蜀椒一兩

烏頭半兩

右十二味治下篩先食酒服五分匕日三

鹿角散治同前

右酒服方寸匕日三升

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

苦參

當歸

羌活

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

阿膠

艾葉

乾薑各二兩

桂心

蜀椒

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

大黃

烏頭

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

桂心

蜀椒

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

大黃

烏頭

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

桂心

蜀椒

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

大黃

烏頭

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

桂心

蜀椒

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

大黃

烏頭

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

桂心

蜀椒

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

大黃

烏頭

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

桂心

蜀椒

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

大黃

烏頭

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

桂心

蜀椒

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

大黃

烏頭

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

桂心

蜀椒

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

大黃

烏頭

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

桂心

蜀椒

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

大黃

烏頭

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

桂心

蜀椒

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

大黃

烏頭

烏頭

以水二升漬取汁服之

附後方治從高墮下者

芍藥三兩

艾葉

乾薑各二兩

桂心

蜀椒

下血不止者神良

竹皮湯治爲兵杖所加木石所连血在督背及腸中痛不得氣息方

青竹刮取茹亂髮各如雞子大二枚

右二味於炭火上炙令焦燥合搗下節以

酒一升煮三沸上一服盡之三服愈

治墮馬落車及樹間崩血腹滿短氣方

大豆五升以水一斗煮取二升去豆一

服令盡劇者不過三作

○乾藕根爲末以酒服方寸匕日三如無。

取新藕汁服

桃仁湯治從高墮下落大木車馬間骨膜中

有血不得氣息方

桃仁枝十四 大棗二十 大黃

硝石 甘草兩各一 蒲黃半兩

又方 桃仁枝五十 蜜蠟

水蛭各三 大黃五兩 桂心二兩

右六味㕮咀以水八升煮取三升去滓

○適寒溫飲一升日三服

又方治腕折瘀血方

右三味以布方廣四寸以繞亂髮燒之咬

欲之即止

又方治腹中瘀血痛在腹中不出滿痛短氣

### 大小便不通

桃仁

蟻蟲各三枚

荆芥半分

大黃

苦蕎各各三兩

當歸

桂心

甘草各二兩

蒲黃五兩

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

### 又方治墮落瘀血方

桃仁枝五十

水蛭

蟻蟲各二枚

當歸各二兩

甘草

桂心

大黃四兩

硝石三兩

桂心

當歸各二兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升去滓

○適寒溫服一升日三服

深師方無此謂

### 又方

桃仁枝六十

大黃兩六

桂心二兩

右三味㕮咀以酒六升煮取三升分三服

當下血瘀

蒲黃散治從高墮下有瘀血方

○蒲黃八兩

附子一兩

右二味爲末酒服方寸匕日三不知增之

以意消息

### 又方治腕折瘀血方

蒲黃一升

當歸二兩

右二味治下節先食酒服方寸匕日三

### 又方

蜜蠟二十

牡丹一兩

右二味治下節酒服方寸匕血化爲水

急備方云治久瘀血在諸骨筋及外不去者二味等分

又方取蕪蕪草汁飲之子亦可服

盡出時後云仲景方用大黃三兩

桂皮長三寸切甘草一枚桃人四十枚熟蕪草一枚

便量多少煎湯或內酒一大盞次下大黃一小

立效後重覆煎到敗蕪草半領煎湯以大黃小

便分溫多步煎別到敗蕪草半領煎湯以大黃小

又方凡被打及產後惡血及一切血皆煮續

骨木汁三升飲之

治從高墮下崩中方

當歸

大黃各二分

右二味治下篩酒服方寸匕日三

治杖瘡方

石灰斤 新豬血升

右二味和爲丸熟燒之破更丸燒三遍止

爲末傅上

又方金月下土爲細末以油和塗訖卧羊皮

○上

又方服小便良

治竹木刺在皮中不出方

羊屎燒者燒作灰和猪脂塗刺上若不

出重塗乃言不覺刺出時一云用乾羊

屎末

又方薔薇灰水服方寸匕日三服十日刺出

又方酸棗核燒末服之

又方頭垢塗之即出

治刺在肉中不出方

煮山瞿麥汁飲之日三瘥止

又方用牛膝根莖生者併搗以薄之即出瘡

已合猶出也

又方白茅根燒末以膏和塗之亦治瘡因風

致腫者

○天師清微弟子子

○治因瘡脰痛劇者數日死或中風寒或中水

又方溫白馬尿漬之

治因瘡脰痛劇者數日死或中風寒或中水

或中狐尿刺主之方

燒黍穀若牛馬屎若生桑條取得多煙

之物燒熏汁出愈

又方熱蠟內瘡中新瘡亦善

又方以免公英草摘取根莖白汁塗之惟多

塗爲佳瘡止余以貞觀五年七月十五日患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如

熱小丘色嘗開長者之論有此治方試復爲之手下即愈痛亦即除瘡亦即瘡不過十日尋得平復此大神效故號之勇人名耳瘡不過十日

○藥中名苟乳

○乳狀苟切

治瘡中水腫方

白灰 胡粉 炭各等分

右三味脂和塗瘡孔上水出則痛止

治手足卒中刺中水毒方

○擣韭及藍青置上以火炙熱徹即愈

治瘡因風致腫方

櫟木根皮一斤濃煮內鹽一把漬之

治破傷風腫方

厚塗杏人膏然麻燭送灸之

治因瘡腫痛者皆中水及中風寒所作腫入

腹則殺人方

溫桑灰汁清冷復溫之當令熱神祕

治刺傷中風水方

服黑牛熟尿一服二升三服即止

又方蠍一兩熱炙熨薄裹上令水出愈

又方魚目燒灰傳之

又方熟煮韭搗之

又方刮箭羽下漆塗之

○治瘡犯露腫方凡八月九月中刺手足犯露腫殺人不可輕

生桑枝三枚內塘灰中推引令極熱所

斷正以枝頭挂瘡口上熱盡即易之盡

又方燒五兩湯浸以洗之

又方取豬膏塗之

又方礬石著湯中令消洗之

又方宜噉豬肉嚼襟敷塗之

○治漆瘡方

生柳葉三斤細切以水一斗五升煮取

七升適寒溫洗之日三

附後方云老御皮尤妙

又方以磨石下滓泥塗之取瘥止大驗

又方濃煮鼠查葉以洗漆上亦可搗葉取汁

塗之

又方爛搗七姑草封之救急方云七姑草和研塗之

又方貴衆爲末以塗上乾以油和之即愈

又方蓮葉燥者一斤以水一斗煮取五升洗

瘡上日再

又方羊乳汁塗之

又方硝五兩湯浸以洗之

又方取猪膏塗之

又方礬石著湯中令消洗之

又方宜噉豬肉嚼襟敷塗之

○治火瘡等病第四論方

孫真人備急千金要方卷之七十八 慈七

宋朝奉郎宇文常少卿充國校理林德等校正

火瘡等病第四論方

論曰凡火燒損慎勿以冷水洗之火瘡得冷急向火更炎雖大痛強忍之一食久即不痛神驗治火燒悶絕不識人以新屎冷飲之及冷水和蜜飲之口噤絞開與之然後以下方治之

○治火瘡方

施子四十 白斂

黃芩各五兩

右三味㕮咀以水五升油一升合煎令水

氣歇去滓待冷以淋之令溜去火熱毒則肌得寬也作二日任意用膏傳湯散治之

又方熬油麻爲末和施子入塗之惟厚爲佳

已成瘡者燒白糖灰粉之即燐立瘥

○治火燒瘡方

死鼠頭一枚以臘月猪膏煎令消盡以

傳乾即傳之瘥不作瘢神效亦治小兒

火瘡