

孫真人備急千金要方卷之九十三 隱士

客卿秦郎守常少卿尤秘閣校理林僅等校正

針灸孔穴方

熱病第五

熱病

魚際 陽谷 主熱病振慄鼓領腹滿陰脢

色不變

經渠

陽池

合谷

支溝

前谷

內庭

後谿

腕骨

陽谷

屬兌

衝陽

解谿

主熱病汗不出

○乳最主臂厥熱痛汗不出皆炙刺之此穴。

可以出汗
列缺 曲池主熱病煩

心心悶先手臂身熱壅蒸脣口聚鼻張目

下汗出如珠

甲乙云兩乳下二寸墜脣下滿慄

中衝

勞宮

大陵

間使

關衝

少衝

陽谿

天突

主熱病煩心心悶而

汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫煩滿

舌本痛

久云間使主熱病煩心喜

勞宮主熱病三日已往不得汗休陽

甲乙云主中冷清喜動而熱

陽督不可反側致滿而赤小便血衄不

止嘔吐氣逆噫不止益中痛食不下喜湯舌中爛掌中熱欲嘔

三間主氣熱身熱喘熱鳴息口急痛甚驚

曲澤主傷寒溫病身熱煩心口乾手清逆氣噃噃而寒

喜驚身熱煩心口乾手清逆氣噃噃而寒

善搖頭清汗出不過眉傷寒溫病曲澤

之主曲池主傷寒餘熱不盡

拔門 中渚 通理主熱病先不樂頭痛

面熱無汗

大云通理主熱病先不樂數日

承裝主汗出衄血不止

溫留主傷寒寒熱頭痛齒肩不舉

上管 曲差 上星 陶道 天柱

上竅 懸釐 風池 命門 膀胱輪主

煩滿汗不出 飛揚主下部寒熱汗不

出體重

五處 搘竹 正營

上管 缺盆 中府主汗出寒熱

巨闕主煩心喜嘔

甲乙云心腹脹滿

二不遇利百會主汗出而嘔

商丘主寒熱好嘔

懸顙主熱病頭痛身熱

少澤主振寒小指不用頭痛

大都主熱病汗出且厥足清

外臺云汗不出足清

陶道主汗不出悞厥惡寒

大推主傷寒熱厥煩嘔

懸釐 橋尾主熱病偏頭痛引目外眞

脾輪 中府主寒熱皮肉骨痛少氣不得

卧支滿

又云關輪主者卧忘情不

列缺主寒熱掌中熱

神道 關元主身熱頭痛進退往来

曲泉主身熱頭痛汗不出

三焦輪主頭痛食不下

魚際主頭痛不甚汗出

○天井主振寒頸項痛

腎輪主頭身熱赤振慄腰中四肢溼澀欲

嘔

肩井 關衝主寒熱悞

索氣上不得卧

尺澤主氣隔喜嘔鼓領

不得汗煩心身痛

肩貞主寒熱項脰

甲乙云耳鳴無聞引

委中主熱病俠脊痛

衛陽主振寒而欠

太白主熱病先頭重額痛煩悶心身熱熱

處主偏癩 脾中 石門 天樞

氣海主小腹疝氣遊行五臟

脾衝胃不得息

甲乙云脾氣逆歸脾痛衝胃
不得息火炎脾中脾疝燒脾

脾痛時止

甲乙云脾主之

四滿主脾下疝積

甲乙云脾中有血

大敦主卒疝暴痛陰跳上入腹寒疝陰挺

出偏大腫脹腹中悒悒不樂小便難而痛

灸刺之立已左取右右取左

甲乙云照海注之

大陰却 衝門主疝痔陰痛

天樞主氣疝嘔

大巨主癩疝偏枯

○交信主氣壅癓疝急股樞脅內廉痛

中封主癩疝瘻暴痛瘻厥身體不仁

氣衝主癓陰腫痛陰瘻莖中痛兩丸瘻痛

不可仰卧

少府主陰痛實時挺長

寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴瘻氣逆卒疝

小便不利

大赫 然谷主精溢陰

上縮

陰市主寒疝下至腹脰

膝腰痛如清水小腹諸痛按之下至

膝上伏兔中寒疝痛腹脰滿瘻少氣

大衝 中封 地機主癩疝精不足

大赫云

中極主失精

魚際主陰濕腹中餘疾

五樞主陰疝兩丸上下小腹痛

○陰交 石門主兩丸騫

又云石門主

大衛主兩丸審縮腹堅不得卧

甲乙云環

行間主革中痛

會陰主陰頭寒

陰谷主陰瘻不用小腹

較以右手從右肩上柱指頭表所不及者是

也左手亦然乃以前法灸之若不能久正坐

當伸兩臂者亦可伏衣櫈上伸兩臂令人挽

兩胛骨使相離不爾胛骨覆穴不可得也所

伏衣櫈當令大小常定不爾則失其次也此

灸訖後令人陽氣康盛當消息以自補養取

身體平復其穴近第五椎相準望取之

論曰昔秦緩不灸督脈之疾以其在膏之上

膏之下針藥所不及即此穴是也時人拙不

能求得此穴所以宿病難遣若能用心方便

求得父之無疾不愈矣

三里主腹中寒脹滿腸鳴腹痛腎腹中瘀血

小腹脹皮腫陰氣不足少腹堅熱病汗不出

喜嘔口苦壯熱身反折口噤鼓領腰痛不可

以顧顧而有所見喜悲上下求之口僻乳腫

之表肋間空處按之自覺牽引腎戶中灸兩

柱滿不能久立膝痠寒熱中消穀苦飢腹熱

身煩狂言乳癰喜噫惡聞食臭狂歌妄笑恐

怒大罵霍亂遺尿失氣陽厥悽慘惡寒頭眩

小便不利喜噦凡此等疾皆灸刺之多至五

百壯少至二三百壯

涌泉主喜喘喉痺身熱痛脊脇相引忽忽喜忘陰彈脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食喘逆足下清至膝咽中痛不可內食瘡不能言小便不利小腹痛風入腸中癲疾俠臍痛急胃腸柱滿痛衄不止五指端盡痛足不踐地凡此諸疾皆主之

婦人病第八

○小腹堅痛月水不通刺帶脉入六分灸五壯

○在手肘端一寸八分端一作下

漏下若血閉不通逆氣脹刺血海入五分灸五壯在膝臍上內廉白肉際二寸中漏血小腹脹滿如阻體寒熱腹偏腫刺陰谷入四分灸三壯在膝內輔骨後大筋之下小筋之上屋膝甲乙云漏血小便黃臨谷主之乃得之

女子疝瘕按之如以湯沃兩股中小腹脹陰挺出痛經水來下陰中腫或壅滯青汁如葵羹血閉無子不嘗食刺曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得之刺入六分

灸三壯

○疝瘕按之如以湯沃股內至膝墮泄陰中痛小腹痛堅急重下濕不嗜食刺陰陵泉入二分灸三壯在膝下內側輔骨下陷中伸足乃得之

○經逆四肢溼泄陰暴跳疝小腹偏痛刺陰蹻

○入三分灸三壯在內踝下容爪甲即照海穴也

○小腹大字難嗌乾嘔飲俠臍疝刺中封入四

○分灸三壯在踝前一寸半伸足取之

○女子不字陰暴出經漏刺然谷入三分灸三

○壯在足內踝前起大骨下陷中

○字難若胞衣不出泄風從頭至足刺崑崙入

○五分灸三壯在足外踝後跟骨上

○月事不利見赤白而有身反敗陰寒刺行間

○入六分灸三壯在足大趾間動應手

○月閉漏赤脊強互引反折汗不出刺腰輸入

○二寸留七呼灸三壯在第二十一椎節下間

○絕子瘡寒熱陰挺出不禁白瀝瘡脊反折刺上穿入三寸留七呼灸三壯在第一空腰隙

○下一寸俠脊
○赤白瀝心下積脹腰痛不可俛仰刺次穿入三寸留七呼灸三壯在第二空俠脊陷中赤瀝時白氣癃月事少刺中穿入二寸留七呼灸三壯在第三空俠脊陷中下蒼汁不禁赤瀝陰中瘡痛引小腹控脅不可以俛仰刺腰尻交者兩肺上以月生死爲痛數發刺立已一云下穿○腸鳴泄注刺下穿入二寸留七呼灸三壯在第四空俠脊陷中赤白裏急瘡瘍刺五椎入一寸灸五壯在第五空俠脊陷中脉下三寸拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絕子陰養責脈上腹堅痛下引陰中不得小便刺陰交入八分灸五壯在臍下一寸腹滿疝積乳餘疾絕子陰養責脈上腹滿痛下引陰中不得小便刺石門入五分在臍下二寸忌灸絕孕絕子衄血在內不在胞轉不得尿小腹滿石水痛刺關元入二寸灸七壯在臍下三寸又主引肋下脹頭痛身背熱質脈寒小便數泄

不
止

子門不端小腹苦寒陰癰及痛貴脈捨心飢不能食腹脹經閉不通小便不利乳餘疾絕子內不足刺中極入二寸留十呼灸三壯在臍下四寸

赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹脹堅小便閉刺屈骨入一寸半灸三壯在中極下一寸月水不通奔泄氣上下引腰脊痛刺氣穴入一寸灸五壯在四滿下一寸胞中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胃刺天樞入五分灸三壯去肓輸一寸半

產餘疾飲食不下貢脈上下傷食腹滿刺期門入四分灸五壯在第二肋端

乳癰驚脾脛重足跗不收跟痛刺下廉入三

分灸三壯在上廉下三寸

月水不利見血而有身則敗乳腫刺脇泣入半

二分灸三壯在足小趾次趾間去俠谿一寸

女子疝及小腹腫滿泄癰遺尿陰痛面塵黑目下皆痛漏血刺大衝入三分灸三壯在足大趾本節後二寸中動脈

女子疝赤白溼下時多時少暴腹痛刺蟲溝

入三分灸三壯在內踝上五寸○女子無子欬而短氣刺涌泉入三分灸三壯

在足心陷者中正

○女子疝赤白溼下時多時少暴腹痛刺蟲溝

半

小腹脹滿痛引陰中月水至則腰背痛胞中

瘕子門空大小便不通刺水道入二寸半灸

五壯在大巨下三寸

○女子疝赤白溼下時多時少暴腹痛刺蟲溝

在府舍下上去大橫五寸

本神前頂顙會天樞主小兒驚癇手

月水不利或暴閉塞腹脹滿癰溼潔身熱乳

難子上捨心若肥不出氣盡亂腹中絞痛不得反息正仰卧屈一膝伸一膝並氣衝針

上入三寸氣至漏之在歸來下一寸動脉應

血不通刺會陰入二寸留七呼灸三壯在大

本神前頂顙會天樞主小兒驚癇手

月水不利或暴閉塞腹脹滿癰溼潔身熱乳

難子上捨心若肥不出氣盡亂腹中絞痛不得反息正仰卧屈一膝伸一膝並氣衝針

上入三寸氣至漏之在歸來下一寸動脉應

便前小便後子藏中有惡血內逆滿痛刺石關入一寸灸五壯在陰都下一寸

育門主乳餘疾

三里主乳癰有熱

神封膺窓主乳癰寒熱短氣卧不安

乳根主膚腫乳癰悽索寒熱痛不可接

大谿伏谿主乳腫癰潰

又云伏谿主小腹聖痛月水不通

大泉主婦乳膚胃痛

大赫主女子赤沃

四滿主子藏中有惡血內逆滿痛疝

又云子藏中有血中極主拘攣腹疝月水不下乳餘疾絕子陰

瘻

氣衝主無子小腹痛

支溝主女人脊急目

築賓主大疝絕子

陰廉主絕產若未曾產

涌泉陰谷主男子如盡女子如阻身體腰

又云腰或癱瘓清汁若裏汗

春如解不欲食

木原照海主不字陰暴出淋漏月水不來

而多悶心下痛

又云照海主陰挺下血陰

○小兒病第九

本神前頂顙會天樞主小兒驚癇手

臨泣主小兒驚癇反視

顙息主小兒癇喘不得息

然谷主小兒臍風口不開善驚

瘻脉長強主小兒驚癇瘻癰嘔吐泄注驚

恐失精暗視不明賜

懸鍾主小兒腹滿不能飲食

諺語主小兒食晦頭痛

孫真人備急千金要方卷之九十三

急救仙方序

側一

醫之療疾莫難於婦人婦人之疾莫重於胎

產胎產之重者何蓋以一身之疾否繫乎母

予之存亡故千金方部居獨以婦人列其首

此思邈孫真人之用心不苟矣世之胎產諸

方不爲不富然其間多犯冗僻貴冗則倉卒

之際難備僻則窮鄉下邑難得貴則貧窶之

家難求是三者雖非君子用心之不周而人

之蒙其惠者往往求什一於千百今此方之

編分爲三類末附以雜病雖不能如諸方之

廣載博該要之不犯冗僻貴而凡胎產危急

之證大略亦盡之矣俾倉卒之際窮鄉下邑

貧窶之家皆得易而求之雖一草一木足以

收效豈若前三者之難爲功哉苟有用者始

信其爲閨門之重寶云金川徐守貞序

急救仙方卷之一

妊娠諸疾品

木芩湯治婦人胎孕不安

白木黃芩各等分

右爲粗末每服三錢水二盞當歸一根同煎至一盞稍溫服

立效散治胎動不安如意物所墜冷如冰

川芎當歸各等分

右爲粗末每服五錢水煎食前溫服或下血心腹痛酒水相半煎服

連皮縮砂不以多少炒黑去皮

保安散治妊娠因有所傷胎動疼不可忍及

血崩不止

右爲細末溫酒調下覺腹中熱則胎已安矣

治妊娠胎動不安或腰痛胞轉擔心下血不止

石菖蒲根姜汁三
升煎之

又方艾葉如雞子大以酒四升煮取二升分
二服良