

桂心

生姜

右同煎取二合以火先炙背摩令熱塗藥

盡妙

治產後經脈不調四肢煩疼飲食全少日漸

羸瘦

琥珀

牛膝

生地黃

當歸

桃仁

赤芍藥

右粗末

三五錢水一盞姜三斤煎去

津溫服

○治產後心膈迷悶腹藏撮痛氣急月信不通

烏藥

當歸

莪朶

右細末

每服二錢溫酒調下服後以食

○右爲細末每服二錢溫酒調下服後以食

○壓之大忌生冷油膩等物

### 急救仙方卷之二

急救仙方卷之三

婦女雜病品

附三

若中濕身沈重無力身涼微汗加白朮茯苓

若筋骨節痛及頭痛增寒加羌活防風

若腰下虛冷腹痛及腰脊間悶痛加玄胡索本細辛

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛加玄胡索本細辛

若虛煩不得睡加竹葉人參酸棗仁

若目赤暴發作雲翳疼痛不可忍加防風

羌活防已酒浸草龍膽酒浸

苦歸湯

川芎  
當歸各等分

右㕮咀水煎熱服

若產後眩運加芍藥甘菊花

若產後腹痛加官桂酒量便合煎

若妊娠子死或不死胎動加紫蘇酒水合

煎死者即下未死者即安

○若臨月服之則縮胎易產

若倒橫難生或子死腹中加黑豆一合先

炒熟水煎便合煎

若腸風藏毒加槐花末半錢三日取下血

塊即愈

○若吐血加生地黃黃芩枳殼

若血氣上喘下脹腫加艾煎湯空心調散

服

若產後血闊心迷喘急腹痛加炒黑豆一

合入姜汁同煎服

若崩中漏下失血不止加香附子炒每兩

入甘草一錢湯熱服

若白帶加芍藥半兩乾姜二錢半同爲末

未飲調下

若赤白帶下加香附子棕櫚燒灰同爲末

米飲調下

苦練九治赤白帶

苦練炒細末

茴香炒細末

當歸各五分

右爲細末酒糊爲丸每服五十九空心溫

酒送下

又方雲母爲粉溫水和服三方寸七立見神。

○又方夏枯草花開時採搗爲末每服二錢食

前溫飲調下能飲者酒服

又方用酸漿草陰乾爲末空心酒下三錢七

治月候泄濁赤白帶下多年不差者

石燕一枚於堅硬甕器內以溫水磨服之

丁香膠艾湯治白崩之物雖多間有如

屋漏水下時有鮮血

○萬金散治婦人血崩不止

香附子四兩  
當歸尾二錢  
五靈脂一兩  
炒白芍一錢  
甘草一錢  
白芍藥一錢

右爲細末每服五錢醋調空心服立愈

當歸散治血崩

當歸一兩  
龍骨一兩  
香附子三錢  
炒白芍一錢

川芎各半  
阿膠六分  
丁香四分

生艾葉一錢  
川芎一錢  
阿膠六分  
丁香四分

右當歸酒洗剉艾亦剉川芎丁香地黃爲  
細末都作一服水五盞先煎作一盞半去  
滓入阿膠再煎至一盞帶熱空心服之三

兩服愈

補經固真丸治心胞尺脉極微白帶流而不

止

甘草去根  
柴胡各一錢  
黃芩一錢  
人參一錢  
白芍花十六錢  
橘皮半錢  
郁李仁一錢  
甘草一錢

右件除芩外以水三盞煎至盞七分再入

黃芩同煎至一盞去滓空心熱服少時以

早膳壓之

棕毛灰

桃仁

玄胡索

當歸

右爲細末空心米飲調下四錢忌油膩等物

牡丹皮 川芎 木香各七錢  
右爲細末每服方寸匕溫酒調下食前

蓮殼散治血崩

右以溫酒調下方寸匕食前

乾蓮蓬

燒存

棕皮及毛

燒存各半兩

烏賊魚骨

燒存

凌霄花

不以多少  
燒存爲末

螺旋散治漏下臍腹痛久不止者

年乾血氣

右爲細末每服四錢空心米飲調下  
小薑湯治崩漏不止

右研爲細末每服二錢煎水服下  
紅花散治婦人產後血昏血崩月事不調遠  
年乾血氣

小薑莖葉

研汁

生地黃

一錢

乾荷葉

牡丹皮

當歸

右每服二錢溫酒調下食前服

衛生湯治婦人女子虛弱月事不來

白芍藥

當歸各二兩

黃耆

兩

甘草

人參各一兩

黃耆

兩

○右三件入水一盞煎至一半去滓溫服

萬病九治女人月經瘀閉月候不來繞臍痛  
衣不下調榆白皮末半兩服之立下

右爲粗末每服五錢水煎空心服

二神九治室女血氣相搏腹中刺痛經候不  
調

橘紅

玄胡索

當歸

各一兩

石蒜

當歸

各一兩

酒浸炒

右爲末酒煮米糊丸如桐子大每服一百

丸艾醋湯下

九艾醋湯下

七

○右爲末以生地黃汁一升入二味藥末瓦  
盆內慢火熬可丸即丸如桐子大每服  
二丸空心米飲調下

牛膝散治婦人月水不利臍腹疼痛  
右先用酒五盞煮芍藥第一盞去滓下地黃  
汁再煎三二沸分爲三服

右爲細末每服二錢熱酒調下

徹清膏治婦人頭痛

川芎

蔓荆子

細辛

○右爲末空心米飲調下四錢忌油膩等  
藥散治崩中或下赤白不問年月遠近並  
槐灰散治崩中或下赤白不問年月遠近並

薄荷	甘草	當歸	生甘草
半夏	半夏	二錢	半錢

日三服

右用無灰酒三升銀石器內慢火熬取一升清汁分三服

右爲細末食後茶清調下二錢  
石膏散治頭痛不可忍

**葛根根** 薄荷幹等分爲末  
右先喫羊骨汁一椀次服藥後再喫葱絲  
羊羨少時微汗出效

**何首烏**

川芎散治婦人偏頭疼  
川芎 甘菊花 石膏 各三錢

右爲極細末每服三錢茶清調下

清寧散治婦人偏頭痛連睛痛者

石膏  
菊花  
黍粘子  
細辛  
川芎

右爲末茶清調下食前

湧泉散治婦人姍汗因氣絕少

**瞿麥穗** 麥門冬 心 **龍骨**

川山甲  
黃  
王不留行

羹少許又用木梳左右乳上梳三二十下



乳勿令多至日中當小下則熱除若未全除明日更與一粒如百日兒圓如小豆一

川鳥  
大南星  
白附子各五錢  
陳半夏各二錢  
生用

右剉碎以新汲井花水拌濕瓦器中浸之  
春五夏三秋七冬十日晒夜露一日一換  
薪水日足晒乾爲末以好大粒朱砂五錢

**大粒朱砂**五錢另研為末  
**猪牙皂角**二兩打碎  
**煎湯汁**

蓋小兒初生骨骼未成筋骨未就臟腑未充精神未全氣血虛浮肌膚軟脆資乳以  
養續漸增長故有變蒸之候三十二日爲一變變者變其形容再變者一蒸蒸者蒸

**重另研爲細末**和如桃紅色爲度  
治急驚風薄荷同煎慢驚用全蜀的藤同煎大劑

養積漸增長故有變蒸之候三十二日爲一變變者變其形容再變爲一蒸蒸者蒸長肌肉十變而五小蒸又四大蒸積五百七十六日大小蒸俱畢乃得成人故當變

○ 咳下虛則百病生，下虛久則百病生。○ 呕嘯通蒸，煎湯下或老茶，或老米飯加酸醋一呷下。○ 美湯得用。○ 癪癥白皮下。○ 老陳根皮煎湯，露一宿下。

蒸之時輕者體熱而微驚耳冷戾令上唇頭有白泡起如魚目珠子微汗時出其重

傷風咳嗽姜茶煎湯下後用  
姜湯調末子服尤佳

者體壯熱而脉亂或汗或不汗不欲乳食  
食輒吐嘔目白微赤黑睛微白變蒸異則

心角弓反張睡中驚跳哭泣敗偏擣斜目  
青臉亦兩眼直視手足搐搦天吊客忤搖

目明矣此乃氣血周流肌膚充溢所致謹無他治但少與紫圓微下其熱即退若二

**大箇無油南星** 二兩  
梗 **朋砂** 淨六

次下後身有熱而耳熱尻熱乃爲他病宜別治焉

**白殼蟬** 二兩姜  
**退火** 藥足炒  
**退火** 去皮  
**白礬** 大一兩  
**祿神** 去皮  
**祿神** 去皮  
**大一兩**

你嬰桃紅散亦可用水煮麵糊爲丸如龍眼人臨用各依湯便磨化服如用吞服則丸如

天龍山  
白帶酒  
全蝎  
去頭  
尾  
身  
切  
末  
炒  
黃  
爲  
末  
去  
末

菉豆大舞服十五丸

**遠志**去骨用淨肉一兩甘草一節同煮過去草

急救仙方卷之三