

仙傳外科秘方卷之五

達五

凌儀東陽子趙宜真集

治癰疽經驗品

治消渴證多發癰疽之疾娶此水立效
右收下臘月水以攏取絲留湯沉清冷溫

服二十三次病退不渴

內補黃芪散治癰疽內虛不足臘水不絕四
肢乏弱不能進飲食久不好必為內渴證

附子

黃芪

肉蓯蓉

附子

黃芪

桂心

甘草

赤小豆

黃芩

白欽

防風

川升麻

沉香

黃芩

白欽

甘草

赤小豆

黃芩

白欽

甘草

內補散治癰疽發背有陰證惡重者

附子

白欽

桂心

乾姜

人參

蜀椒

赤小豆

黃芩

白欽

防風

川升麻

沉香

黃芩

白欽

甘草

赤小豆

黃芩

白欽

甘草

右咬咀每服四錢重水煎食遠溫服熱甚
加淡竹葉燈草

木通散治癰疽諸發氣壅大小便不通

木通錢

黃芩錢

大黃錢

土瓜根錢 漏蘆錢 甘草錢

朴硝錢

梔子仁錢

大南星各二兩
酒浸一合

右咬咀水煎食前溫服以利為度
瞿麥散治癰疽發背排膿止痛利小便
桂心 赤芍 當歸

黃芩 芳菊 瞿麥

麥門冬各等

赤小豆一合

酒浸一合

○

右內用南星一半切作片子却用不蛀皂

角截斷七片各一寸長用水同南星煮乾

為度去了皂角只用南星焙乾用前藥總

為細末水打硬麩糊候冷用濃生姜自然

汁在內化開麩糊為丸如梧桐子大每服

三五十九空心卧用淡姜湯吞下立效

○

嗽膿血肩背煩悶小便赤黃大便多澁不進

如諸癰已潰未潰瘍中膿血不絕痛不可

忍加細辛 白芷 白欽 蒼朮仁

右咬咀每服四錢重入酒煎溫服

○

右咬咀每服四錢重水一盞半煎至食前

牡丹散治腸中未成膿腹中疼痛不可忍者

牡丹 木香 賦醫

川大黃

甘草

桑白皮

赤芍

桃仁

芒硝

杏仁

生乾地黃各一兩

枳殼各三錢

當歸半兩

荳母

蒼朮仁

黃柏半兩

白芨半兩

血竭半兩

檳榔半兩

荳蔻半兩

右總爲細末

鈍蜜爲丸如梧桐子大強人

進藥飲下五丸羸人下三丸若病在膈上

者吐出也若膈下者利出也若下多不止

者冷飯三四匙補之即止

○

治腸癰壯熱大微汗氣急小腹腫痛小便澁

似淋或大便澁難如刀刺痛及背肺疼痛腸

中已成膿或大便下膿者用

牡丹散治腸中未成膿腹中疼痛不可忍者

牡丹 木香 賦醫

川大黃

甘草

桑白皮

赤芍

桃仁

芒硝

杏仁

生乾地黃各一兩

枳殼各三錢

當歸半兩

荳母

蒼朮仁

黃柏半兩

白芨半兩

血竭半兩

檳榔半兩

荳蔻半兩

右總爲細末

鈍蜜爲丸如梧桐子大強人

進藥飲下五丸羸人下三丸若病在膈上

者吐出也若膈下者利出也若下多不止

者冷飯三四匙補之即止

○

治腸癰壯熱大微汗氣急小腹腫痛小便澁

似淋或大便澁難如刀刺痛及背肺疼痛腸

中已成膿或大便下膿者用

牡丹散治腸中未成膿腹中疼痛不可忍者

牡丹 木香 賦醫

川大黃

甘草

桑白皮

赤芍

桃仁

芒硝

杏仁

生乾地黃各一兩

枳殼各三錢

當歸半兩

荳母

蒼朮仁

黃柏半兩

白芨半兩

血竭半兩

檳榔半兩

荳蔻半兩

右總爲細末

鈍蜜爲丸如梧桐子大強人

進藥飲下五丸羸人下三丸若病在膈上

者吐出也若膈下者利出也若下多不止

者冷飯三四匙補之即止

○

治腸癰壯熱大微汗氣急小腹腫痛小便澁

似淋或大便澁難如刀刺痛及背肺疼痛腸

中已成膿或大便下膿者用

牡丹散治腸中未成膿腹中疼痛不可忍者

牡丹 木香 賦醫

川大黃

甘草

桑白皮

赤芍

桃仁

芒硝

杏仁

生乾地黃各一兩

枳殼各三錢

當歸半兩

荳母

蒼朮仁

黃柏半兩

白芨半兩

血竭半兩

檳榔半兩

荳蔻半兩

右總爲細末

鈍蜜爲丸如梧桐子大強人

進藥飲下五丸羸人下三丸若病在膈上

者吐出也若膈下者利出也若下多不止

者冷飯三四匙補之即止

○

治腸癰壯熱大微汗氣急小腹腫痛小便澁

似淋或大便澁難如刀刺痛及背肺疼痛腸

中已成膿或大便下膿者用

牡丹散治腸中未成膿腹中疼痛不可忍者

牡丹 木香 賦醫

川大黃

甘草

桑白皮

赤芍

桃仁

芒硝

杏仁

生乾地黃各一兩

枳殼各三錢

當歸半兩

荳母

蒼朮仁

黃柏半兩

白芨半兩

血竭半兩

檳榔半兩

荳蔻半兩

右總爲細末

鈍蜜爲丸如梧桐子大強人

進藥飲下五丸羸人下三丸若病在膈上

者吐出也若膈下者利出也若下多不止

者冷飯三四匙補之即止

○

治腸癰壯熱大微汗氣急小腹腫痛小便澁

似淋或大便澁難如刀刺痛及背肺疼痛腸

中已成膿或大便下膿者用

牡丹散治腸中未成膿腹中疼痛不可忍者

牡丹 木香 賦醫

川大黃

甘草

桑白皮

赤芍

桃仁

芒硝

杏仁

生乾地黃各一兩

枳殼各三錢

當歸半兩

荳母

蒼朮仁

黃柏半兩

白芨半兩

血竭半兩

檳榔半兩

荳蔻半兩

右總爲細末

鈍蜜爲丸如梧桐子大強人

進藥飲下五丸羸人下三丸若病在膈上

者吐出也若膈下者利出也若下多不止

者冷飯三四匙補之即止

○

治腸癰壯熱大微汗氣急小腹腫痛小便澁

似淋或大便澁難如刀刺痛及背肺疼痛腸

中已成膿或大便下膿者用

牡丹散治腸中未成膿腹中疼痛不可忍者

牡丹 木香 賦醫

川大黃

甘草

桑白皮

赤芍

桃仁

芒硝

杏仁

生乾地黃各一兩

枳殼各三錢

當歸半兩

荳母

蒼朮仁

黃柏半兩

白芨半兩

血竭半兩

檳榔半兩

荳蔻半兩

右總爲細末

鈍蜜爲丸如梧桐子大強人

進藥飲下五丸羸人下三丸若病在膈上

者吐出也若膈下者利出也若下多不止

者冷飯三四匙補之即止

○

治腸癰壯熱大微汗氣急小腹腫痛小便澁

似淋或大便澁難如刀刺痛及背肺疼痛腸

中已成膿或大便下膿者用

牡丹散治腸中未成膿腹中疼痛不可忍者

牡丹 木香 賦醫

川大黃

甘草

桑白皮

赤芍

桃仁

芒硝

杏仁

生乾地黃各一兩

枳殼各三錢

當歸半兩

荳母

蒼朮仁

黃柏半兩

白芨半兩

血竭半兩

檳榔半兩

荳蔻半兩

右總爲細末

鈍蜜爲丸如梧桐子大強人

進藥飲下五丸羸人下三丸若病在膈上

者吐出也若膈下者利出也若下多不止

者冷飯三四匙補之即止

○

治腸癰壯熱大微汗氣急小腹腫痛小便澁

似淋或大便澁難如刀刺痛及背肺疼痛腸

中已成膿或大便下膿者用

牡丹散治腸中未成膿腹中疼痛不可忍者

牡丹 木香 賦醫

川大黃

甘草

桑白皮

赤芍

桃仁

芒硝

杏仁

生乾地黃各一兩

枳殼各三錢

當歸半兩

荳母

蒼朮仁

黃柏半兩

白芨半兩

血竭半兩

檳榔半兩

荳蔻半兩

右總爲細末

鈍蜜爲丸如梧桐子大強人

進藥飲下五丸羸人下三丸若病在膈上

者吐出也若膈下者利出也若下多不止

者冷飯三四匙補之即止

○

治腸癰壯熱大微汗氣急小腹腫痛小便澁

似淋或大便澁難如刀刺痛及背肺疼痛腸

中已成膿或大便下膿者用

牡丹散治腸中未成膿腹中疼痛不可忍者

牡丹 木香 賦醫

川大黃

甘草

桑白皮

赤芍

桃仁

芒硝

杏仁

生乾地黃各一兩

枳殼各三錢

當歸半兩

荳母

蒼朮仁

黃柏半兩

白芨半兩

血竭半兩

檳榔半兩

右咬咀用酒煎服三四日即效矣

牛黃散治腸癰成膿者

牛黃一錢

血竭半錢

大黃

牽牛

破故紙

牛蒡子

右總爲細末用冷溫酒調服以利下腹血

爲度

千金方治凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯初

患腹中苦疼痛或達臍痛有瘡如粟皮熱便

膿似赤白下者不治必死也

漏蘆湯

漏蘆三兩

黃芩三兩

白芨三兩

麻黃三兩

大黃三兩

升麻二兩

白薇二兩

枳殼二兩

芍藥二兩

粉草三兩

甘草三兩

赤芍藥一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分空心

熱服本方芒硝去之若見熱而實者加

大黃或加芒硝亦可

升麻和氣飲治瘡疥發於四肢痛痒不常甚
至增寒發熱腫下濕痒並皆治之

升麻一兩

蒼术一兩

乾姜半兩

甘草一兩

大黃半兩

半夏半兩

桔梗一兩

枳殼半兩

陳皮一兩

白芷一兩

當歸半兩

芍藥七錢

甘葛一兩

桔梗一兩

半夏製半兩

仙傳外科秘方卷之五

右咬咀每服四錢重水一盞生姜燈心同
煎食前溫服

復元通氣散治諸氣滯耳聾腹癰便癰瘡疽
無頭上痛消腫

青皮四兩

陳皮四兩

川山甲一兩

甘草三兩

桔梗根三兩

金銀花一兩

當歸半兩

甘草三兩

桔梗根三兩

金銀花一兩

當歸半兩

川山甲一兩

甘草三兩

桔梗根三兩

金銀花一兩

當歸半兩

川山甲一兩

甘草三兩

桔梗根三兩

金銀花一兩

當歸半兩

川山甲一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分空心

黃芩茯苓湯治諸癰疽膿出大多虛熱

赤茯苓一兩

升麻一兩

大黃一兩

遠志一兩

赤芍藥一兩

甘草二兩

人參二兩

麥門冬一兩

黃芩一兩

升麻一兩

大黃一兩

遠志一兩

赤芍藥一兩

甘草二兩

人參二兩

麥門冬一兩

黃芩一兩

升麻一兩

大黃一兩

遠志一兩

赤芍藥一兩

甘草二兩

人參二兩

麥門冬一兩

右咬咀每服四錢重煎服