

江子七粒去殼
上燒存性
 右為末和酥點舌上三次含化嚥之疔自
 爆切忌用鐵器

仙傳外科秘方卷之六

仙傳外科秘方卷之七

淡儀原陽子趙宜真集

造七

神效治癩瘰癧品

如治癩瘰不問年久月深者先用箍了箍住其瘡以後用艾火從下面兒癩上灸一箇起以等下灸上去灸到母發之處即住每一箇上用大蒜一片貼之灸五七壯止隨灸一箇便用膏藥貼之當時一日一換立見神效

秘傳膏藥

真菜粉二兩半炒用銅鏡子 乳香半兩

檀香半兩 香鴉香鴉亦可半兩 沒藥半兩

膽礬半兩 輕粉半兩 南蛇膽無亦齋香初灸不用

右各為細末諸藥半兩可用豆粉五兩重

米醋調成膏攤開油紙上貼之不生肌加

生肌藥即愈矣

五香連翹散治一切積熱結核癩癰癰瘰癧惡瘡癬

沉香 連翹去毒 乳香

升麻 大黃生用 桑寄生亦升麻

丁香去核 麝香破者 獨活

木通 羌活 甘草

青木香各等

又一方加生黃芪

右吹咀每服四錢重水二盞煮取八分食

後熱服以利下惡毒為度本方有竹瀝芒

硝隨證熱輕重當自加減為妙立效用此

滓煎湯洗之其瘡立愈矣

治癩癰立效散名六一散益元散初發服此藥即安

滑石一兩 甘草二錢

右先將此末每服一錢半重用米飲調之

臨睡進一服半夜時再進一服

又方用荆芥穗 姜蠶 黑牽牛各四錢

斑蝥二十八隻去頭足翅用糖

右總為細末每服一錢重五更初却用溫

酒調服之等惡毒物從小便中如小便無

惡物行次日再進一服又不行第三日早

五更初先進白糯米稀粥却又再一服更

以燈草湯調琥珀末一錢服之以小便內

利下惡物為效絕根不發如肚疼痛不止
利惡毒不住可用生冷茶補之肚痛不止
用防風搗水解之前藥不可多用

牛旁子丸治風毒結核癰腫痛不止

牛旁子一枚何首烏一兩乾薄荷二兩

雄黃二兩牛黃二錢麝香二錢

皂角七皮水二升
搜行鍊膏

右以前藥為末用皂角膏丸如梧桐子大
每服二十九煎黃耆湯下

四聖散治癰癩去利復用此補之

海藻 右決明 羌活 瞿麥穗各等分

右總為細末每服二錢重米湯調下

經驗治咽喉品

夫咽喉者為一身之總要與胃相接呼吸之
所從出若有胃膈之間蘊積熱毒致生風疾
壅滯不散發而為咽喉之病喉內生瘡或狀
如肉腐為腫為痛窒塞不通吐嚥不下甚則
生出重舌治之尤宜先去風痰以通咽膈然
後解其熱毒遲則有不救之患又有熱毒衝
于上腭而生瘡謂之懸癰及疔寒亦令人咽

門吐吞不利臨病須審詳其證施以治法
化毒托裏散治咽喉風熱上攻急閉腮頰腫
痛并雙蛾單蛾結喉重舌木舌並皆治之以
利即解

玄參 木通 大黃生

淡竹葉 山梔子 生地黃

燈草

右吹咀每服水煎溫服

灌救急解

右用水清油調皂角末百草霜吞下亦可

矣

山豆根湯治咽喉腫閉疼痛灌漱去痰膏之
嚥下即愈

山豆根新 靈消根生 山梔子

淡竹葉 艾葉 燈草

右吹咀

右吹咀藥酒者用酒煎不飲酒者水煎亦
可有孕婦人不可服諸喉生瘡者好了喫

此藥五六服絕根好矣

吹喉祛風散治咽喉中生瘡腫痛權喉風閉

單蛾雙蛾結喉急喉風飛絲入喉重舌木舌

等證

膽礬鴨首 腦子子 碧雲

白芙蓉沙去 苦丁香即丁香

燈草末細

不退加

雄黃 猪牙皂去皮 焰硝

藜蘆去心

右總為細末每用少許吹入喉中未成者
連吹已成者即破立愈重者吹入鼻中如

痰多急解用生艾尾葉末醋同搗取汁塗

之灌漱去痰立愈矣

又方

右用臘月猪膽明礬為末入在膽內風中

吹乾取礬礬末吹之立效每年發者可灸

火不發

治牙關緊閉者用九龍川名金釵草單枝上

為妙用根去皮打碎用綿子裹之縛在筋

頭上以去五六次牙關上牙關即開以喉

中五六次痰涎即出後用火炙鹽為末綿

子帶鹽去關之即愈進食後有返復生其

子帶鹽去關之即愈進食後有返復生其

11008) A 027-2

搥碎用皂角多過多塩爲末用綿子裹
帶塩皂角末去潤五六次即愈矣

治纏喉閉急證用米醋生薑搥灌喉瘡即破
爲妙

鼓糖草 土牛膝 加烏藥爲妙

右以二味生搥碎取汁醋灌下重則灌鼻
中吐痰即愈乾者爲末米醋煎之亦可矣
如聖散治急時氣纏喉風漸入咽塞水穀不
下牙關緊不省人事

雄黃 藜蘆生 白礬

牙皂去皮 加蝎蝟

右總爲細末每服一字吹入鼻中吐出頑
痰愈矣

痰愈矣

又方用白藥山豆根同煎噲之灌喉去痰後
嚙下一二口

經驗風狗咬人方

如風狗才傷人了即便喫清油半盞能清心
急用雄黃炒斑猫去頭翅足爲細末一日
服一箇及雄黃以酒調服七七四十九箇
以喫四十九日冷水少入清油亦可以小

便利下惡毒爲度如不利多進一服利後
腹肚疼痛急用冷水調青靛服之以解黃
連水煎服亦可服藥之後不宜便喫熱物
即絕根愈矣瘡口莫等好如不破可以炙
破等出血去毒氣不發也如是小便出血
不可治之必死

傷人死對周急解之傷人後至周年或百日

內發者已死但心間溫者便可救之急用
槐花一斤用酒水二大碗煎至碗半以溫
用物挑開口灌入喉中少時便腥一箇時

辰後用溫清粥與喫則箇即無事矣不然
再用藥滓服之不可與冷水羊肉發風毒
物切忌之

又一方復發無藥可療者用之極驗

雄黃明者 麝香五錢

右各研爲細末勻和用酒調二盞服之如
不肯服者則搥其鼻而灌之服藥後必然
得睡切莫驚起任其自醒候利下惡物再
進前藥即見效矣

又經驗方

又經驗方

右用杏仁去皮尖同烏蘭根研細先以葱
煎湯洗之後以此藥敷之或單以杏仁去
皮尖用之亦可

又方用草麻子五十粒去殼以用井花水研
成膏先以盞水洗後敷之

又方用虎骨油搽之立效亦可矣

仙傳外科秘方卷之七