

不犯水

治寒足跟凍爛五月五日午時用姜葱艾搭

一時詩更不再發矣

治牙痛青蒿一握水一碗煎至半碗待溫漱

之疼即止

一方良姜草烏二件為末楷齒有涎即吐不

可吞吐涎舉以鹽湯漱口

又方蟲牙風牙喫藥有陰陽虛實服之

春正氣散 夏敗毒散加大黃枳殼 秋冬

五積散消風散

去蟲積檳榔一味為末蜜水調下令患者先

日少喫飯臨晚亦勿食次早五更服之

穿掌毒新桑葉研爛包盒上即愈

仙傳外科秘方卷之十

仙傳外科秘方卷之十一

卷十一

後儀原陽子趙宜真集

治諸雜證品

小兒五心煩熱渴欲飲水者煮黑豆與食之

安

小兒慢驚昏沉時或搐掣為藥磨水暖熱與

服

小兒急慢驚風震靈丹二十米復丹白圓

子樹三味研勻糯米糊丸如菘豆大大者

五丸小者三丸慢驚用北棗陳皮煎湯吞

下急驚用生薑自然汁百沸湯下

小兒十種丹瘤許學士云此十種丹毒如三

日不治攻入腸胃則不可治也宜逐一子細

辨認依此方治之萬不失一

一飛竈丹從項頭起腫用葱白研取

二吉竈丹從頭上紅腫痛用薄荷葉

三鬼火丹從面起赤腫用龍心土

四天大丹從背起赤腫用白蠟末

五天竈丹從兩臂赤腫黃色用柳木燒

六水丹從兩脇虛腫用生蠟末

七胡次丹從臍上起黃腫用檳榔末

八野火丹從兩脚赤腫用乳香末

九烟火丹從兩脚有赤白點用麻油調下

十胡漏丹從陰上起黃腫用生蠟末

小兒頭瘡胎毒諸風熱急瘡瘡瘡用

黃柏 黃連 白芷 五倍子

右四味等分研細末用井花水調稀稠得

所塗開在碗內覆架兩磚上中空處灼艾

烟熏蒸以黑乾為度仍取下煎藥再研作

末清油調塗如有蟲則用煎油調搽

又方五倍子白芷等分為末有膿水乾滲其

上其膿水即收如乾痂以清油調塗

小兒痘眼以谷精草為末以白柿或猪肝或

錫糖點喫

生犀復明散治諸般眼疾

赤芍藥二 黃芩一 木通二

桑白皮二 龍膽草二 防風二

羌活二 當歸尾二 大黃二

枳殼六錢

右吹咀每服五錢水一盞半新煎桑白皮

少許同煎至八分食後服如目赤障厚者
加生蚌粉痛腫者加生地黃効

點眼藥宜黃連洗淨到碎不拘多少以瓦器
水煎至半濾去滓用瓦盞盛在湯瓶上蒸
之至汁少却入腦子少許用淨器或角筒

收貯點眼內或點爛眩亦妙藥時須用
密絹綿子濾過母令塵屑在內

治暴赤爛眩眼

- 黃連^五 當歸尾^三 朴消^三
- 板杏^二 黃柏^二 川續斷^一

右判碎以盞子盛在湯瓶上濃蒸乘熱煎
汁點入眼內

又法治赤眼及昏痛緊閉眼勿開感熱湯一
器以手掬沃之湯冷即止日頻沃即安妙
處在閉眼

點障翳諸眼朴消十兩明淨者湯泡以篋箕
盛好紙濾過將瓦碗盛以炭火熬乾置地
上一宿用黃丹二兩飛過麝香半錢重同

研極細絹羅過加腦子再研點眼內
薰暴赤眼用瓦瓶子煎薄荷荊芥防風湯來

熱氣黃之仍以手沃洗

換骨丹治風濕腰脚諸疾草烏六兩重略去
皮尖研為末用生豆腐二兩搗和成餅子
沸湯煮令浮再沸取出煮時最要斟酌蓋
煮過則藥力輕煮不及則藥力又過重也

又用米泔浸過蒼朮三兩焙乾天麻一兩
明淨者全蝎半兩洗去土微炒與草烏餅
子同研為末和米糊為丸如梧桐子大至

晚勿食臨臥以木瓜膏溫酒下二十九中
夜藥透偏身及脚上覺麻痺即其効也

舒筋散治血脈凝滯筋絡拘攣肢節疼痛行
步艱難活血化氣第一品也

- 玄胡索 當歸 官桂

右等分為末每服二錢空心溫酒調服
活絡丹治腰脚諸疾

胡蘆巴^四 兩重二兩用海金沙^四 兩同
色海金沙^四 兩用巴豆^四 兩炒令赤

多按^下用^紙糊^名日^下過^至乾^却以
思^巴豆^去殼^取用^者蒼^耳草^四
焙^乾名^野左^纏藤^四兩^連葉

右三味為末以好生酒煮麪糊為丸如梧

桐子大用生酒吞下三四丸病在腰半
飢服病在膝脚空心服

治諸瘡膏藥方清油一斤將頭髮二兩煎至
鎔却隨意入甘草節當歸尾黃連巴豆草
麻子黃芩薑木鼈子各半兩煎二沸去滓

却入水粉^連五兩又煎至沸入黃丹七兩又
煎至沸入乳香末一兩用桃柳枝不住手

攪挑入水中滴成珠不粘手則膏成矣
又方麻油五兩重巴豆二十八粒柳條二十

八寸以大煎候巴豆黑色濾去滓以谷丹
二兩重逐漸放入用柳枝不住手攪滴水

中不散成膏不粘手任大却將乳香末一
錢和勻瓦器盛之候冷攤用

神授香蘇散治四時瘟疫方註云昔城中大
疫有白髮老人教一富人家合施城中病

者皆愈其後疫鬼問其富人家富人遂以
寶告鬼相顧曰此老教三人矣遂指額而

退 凡服此藥成食重腥酒肉無不應効
又前元時江西吉安太和縣瘟疫大作有

醫者視病中夜而回忽遇神人騎馬導從

而來醫知非人忙拜伏於地神至叱曰汝何人也答曰某醫人也神曰汝今醫病用何藥答云隨病冷熱輕重用藥治之神曰不然只一類用香蘇散好醫者歸明日遂如其言試之皆效醫道大行因獲福利終身敬祀其神併記于此

香附子炒去紫蘇葉略四陳皮
甘草一

右判為粗末每服三盞水一盞煎至七分去滓熱服不拘時日三服

仙方三補丸大補諸虛百損不問老少有疾皆効

破故紙二兩酒紙 白茯苓一兩
沒藥一兩酒浸

右候酒浸沒藥如錫糖樣用前藥二味為末藥酒糊為丸如梧桐子大每服二三十丸空心熱水下 仙方云昔有人服此藥者至老顏容不衰蓋破故紙補腎茯苓養心沒藥養血三者既壯自然身安 酒疸脾黃木別子磨醋服之一二盞必利見

功

盜汗不止五倍子末以唾調填滿臍中以帕縛定一宿即止

治陰汗綿黃芪淨洗橫切細入鉢中滴酒炒乾脆為末以猪心煮熟點喫之妙

又方蛇床子石菖蒲等分為末一日三兩次塗擦

治瘰癧切斷黃瓜擦瘰癧子上安或以棗葉煎湯浴之

又方玉英粉 真蚌粉四 滑石一

治吻咬單麻子隨多少去粗殼炒熟喫甜者苦者吐出多喫見効

治舌忽脹出口外是蜈蚣毒用雄雞冠割血瓦盞盛浸舌就嚙下即縮

治人恍惚見鬼發狂平胃散加辰砂末棗湯調服

治積寒風證如聖散不問男女年久者昏動

藏靈仙多 防風 荊芥 防己 麻黃 杏仁 細辛 川芎

白芷略等

右吹咀姜三片用好酒煎熱服待發時服後用黃荆葉大者以火炙取兩頭汗水調臘酒吞下金箔鎮心丸忌發風諸毒食

治大風 憊然子大風論

夫大風者所犯異證多端或因嗜欲無度勞傷血氣或蓄太怒憂愁驚恐抑鬱不伸或體虛膚空或酌酒當風或熱解脫汗出入水或浴後迎風或醉卧露地或手足破傷引入風毒或卒風暴雨寒水濕障侵入肌膚當時感受以至大風之患病因以流注經絡傳於臟腑發於四肢內外兼蒸而成泡癩夫病之源有三證五死一種者水風二種者傳變三種者自不調攝五死者一日皮死連二麻木不仁二日肉死連三割切不痛三日血死潰爛成膿四日筋死手足脫落五日骨死鼻塌眼斷唇唇以至聲啞不能救治一風者肺經受證先落眉毛二風者肝經受證面起紫泡三風者腎經受

證脚底先穿四風者脾經受證偏身如癱
 五風者心經受證先損其目或有墳墓居
 址祖宗父母夫妻家人等遞相傳者或在
 外不謹真坑房室床舖衣被橋上樹下歇
 息去處命值委死凶星遭此惡疾纏汗其
 間形狀所以不同痛苦難忍欲求治之不
 可得濟或一年半載而死者有之大凡感
 此疾者宜早救療則易痊可當詳審區別
 治療或差則毫釐千里矣余明醫達士且
 畏其鄙猥多不留心一等無學之人亂傳
 手法縱意刀針放血燒砒艾薰取涎諸毒
 草藥用油浸身從其醫者百無一効亦或
 有少減久而再發若不遇良方妙藥以至
 病死欲求醫治不別居靜室斷酒戒色滌
 慮洗心皈告神醫真誠懺悔仍忌發風動
 氣軍腥鹽醬生冷之物勿食切須耐性寬
 心然後可服眾藥隨意加減修製固散依
 法服之治無不痊先用瀉惡血團藥服畢
 如膿潰爛洗湯黃洗白日之內皆是好肉
 舊有瘡疾漸消不發耳鼻通氣皮膚覺快

眉鬚再生顏色悅澤安和五臟其功效豈
 能盡筆乎方具如後

消風散^{第一}

香白芷^兩 全蝎^{去尾} 人參^兩

右為末每服二錢重午間止喫粥忌生薑

胡椒^{連皮}一切性熱之物晚間不喫夜飯次日

空心溫酒調下早飯放邊喫身上微燥為

妙

追風散^{馮血藥第}

大黃^兩 川蟬^{肚即蟬全一兩八}

皂角刺^兩

右為末初服六錢或七錢或五錢重入大

楓油二錢半重淨朴硝少許用好煮酒一

碗調化不可熱微溫服晚粥不食直待成

時放溫水一碗于桌上盆內更以糖煎或

蜜煎少許安放盤中不得令患者先見藥

服藥了放碗即用水盥數畢以蜜煎過口

切不可卧令人伴坐良久肚腹大痛最妙

瀉十數次不妨過畢用薄粥補之此過藥

大凡老弱不可治矣五十以下可治精壯

者十日內三服謂如正月初一日服消風

散初二日服追風散初三日服磨風丸初

四日又服清風散初五日又服追風散初

六日又服磨風丸瘦弱者十日內一服稍

瘡如壯健人十日內一服服到兩月後二

十日一服切須記其日數

磨風丸^第

川當歸 羌活 獨活

川芎^小 明天麻 細辛

防風 荊芥 葶靈仙

麻黃^節 何首烏 石京子

牛蒡子 蝦蟇^葉 蒼耳草

皺面草^{柳地}

右十六味各一兩重晒乾為末不可見火

好酒煮米糊為丸如梧桐子大每服三十

丸食前食後皆可日二服

洗藥地骨皮 荊芥 苦參 細辛^{略重}

右剉碎和勻每次用二兩以河水煎黃洗

偏身出血為効如洗必用大浴桶或缸內

要湯寬浸通身良久妙

敷藥治瘡大爛偏身塗之時仰

黑狗脊即北神 整硫黃二 白礬二

蛇床子四 寒水石二 朴消二

右為細末用臘猪油或香油調傳妙如瘡

未爛不必傳洗

增添別本治一切風疾肌肉頑麻皮膚癢痒
偏身疥癩風癬諸般瘡疾癩疹面上遊風或
如蟲行紫白澱風或腎臟風攻注腿脚生瘡
並皆治之

光烏二 當歸一 何首烏二

白芷二 苦參二 藏靈仙法

蔓京子一 獨活一 芎藭一

防風二 荊芥穗二 羌活一

赤芍藥一 白茯苓去刺 地龍法

白附子一 山梔子一 烏蛇一條

法取

右前件俱為末却入後二味

胡麻二 大風子法

二味一處為末同前和勻以酒煮末糊為

丸如梧桐子大每服三四十九茶酒任下

又方藏靈仙

防風

蝦蟇草

猪牙皂

天麻

獨活

川芎

右等分為末同煎糊為丸梧子大每服四

五十九茶酒任下

又生眉毛藥皂角刺焙 鹿角燒 各等分為

細末生薑汁調塗眉上一日一次則眉毛

自然生矣

灸法斷根於脚尖拇指筋骨縫間手指節約

半寸長各灸三壯以出毒氣

附錄

力到行方便文

人在世間方便第一力到便行踉過可惜

富貴權勢者禍福及人甚易臨事以方便

為心寬一分則人受一分之賜更力行好

事種種方便母問人物推聖賢兼善天下

之心功德莫大

一平糶米是第一大方便漢祖天師教人立

功以出來救人為第一如有財者於收成

之日能廣行收糶或有田地自能收積遇

缺之時只依原價出糶在己無損在人極

利昔日成都黃承事行之蒙紫府真君張

尚書尊禮身登仙籍累世富貴次則量減

時價均糶尤佳

一濟人疾病大是方便若能精虔修合

許真君如意丹施人可濟萬病治疫尤速

次則諸般可施之藥皆好又能印施良方

亦佳

一夏月施湯水冬月施老病衣服存恤鰥寡

孤獨收養遺棄孩兒死而無棺者施之木

急難困乏者隨宜救濟

一濟度幽冥費小功大葛仙公以此登真薩

真人由茲證品歷代仙師無不留意果能

常行發練福及幽冥如或輟食施食忠亦

不小達人正士博參窮求悟性命幻化之

機究水火返還之道非特高超於塵外亦

宜極度於幽冥積行累功皆由此始須資師授道不負人

一物命痛苦與人本同苟可不殺便宜止免昆蟲鳥獸一視同仁教典持齋及放生三官考較三元齋皆為不殺物命

一修橋補路開井通渠興利除害勸善解惑十三息爭止鬪皆方便也如前方便事富貴者行之及人既廣受報必豐福壽增崇家有除塵學道者行之方為功行兩全自然遇師得度感道有緣力薄者行之尤為難事

昔秦素真人有言曰古之為功行者能賑天下之廢民富者易為功貧者難為功居難為功之地則功行什百於富貴者矣傷寒熱病新瘥保命鑑

寧川存養道人述

疫癘間忌黃帝內經曰傷寒熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰食肉則復多食則道遺者熱甚而強食之熱有所藏因其殺氣相搏兩熱相合故有所遺名曰食復王啓玄謂熱氣未盡如道加諸身也復者復其再病也

熱病新瘥血氣未平復餘熱未除早作勞動病名曰勞復

○張長沙論傷寒陰陽易成無已註男子病新瘥未平復婦人與之交病名曰陽易婦人病新瘥未平復男子與之交病名曰陰易以陰陽相感動餘毒相染著如換十三易也色復者言其自動淫欲也又謂之女勞復以其內絕真氣外動邪熱真虛邪感故不可治也昔顧子獻病瘥不以華敷之粉為信臨死致有出舌數寸之驗可不懲哉

勞復外傷
梳頭太早必發頭風
洗面太早頭朝熱
濯足太早則足痺
洗浴太早發熱昏

悶
躁怒成痞疾
連行則腳弱緩風
舉動則成偏枯
慮動則成氣消
不起不得勞心費力反此則復

食復內傷

食羊肉再發喘悶死
食羊心肺再病必死
食羊血肝病大瀉
食牛肉患痢難瘥
食羊猪腸成痼疾
食馬肉殺人
食禽肉太早殺人
食牛肝瀉血不止

食犬肉發黃必死
食燒肉成消渴
食諸骨汁發熱成骨蒸
食兔肉令人心病

○食黃牛肉結瘕不化
○食雞肉成蟲癥
○食鯉魚再病
○食鱈魚發吐痢
○食魚鮮必發黃
○食鴉肉則霍亂
○食蚶子必死
○食濕麩發潮熱
○食黃瓜稍瓜再病必死
○食茄成瘧疾
○食白扁豆滯胃中寒氣
○食葵菜令人喪明
○食諸生菜心病致死令人顏色不復
○飲酒太早發狂

○飲白酒令人浮腫
○時行瘟疫新汗解飲冷水損心包令人虛不復

○孫真人方論凡熱病新瘥及大病後食豬肉羊血肥魚油膩等必大下利醫所不治必死若食餅餌菜黍鱸炙鉛蠅也脯脩菓諸果等十一極之屬及堅實難消之物以胃氣高虛弱不能消化必藥下之大利難禁不下必死下之復危皆難救也
○病瘥後未滿百日氣力未平復犯房室者死壯實者忌六十日
○病瘥後但宜食糜粥寧少食令饑慎勿飽不得他有所食雖思之勿與可也
○瘥後口渴

○瘥後口渴

宜服天水散西瓜水梨可止渴退餘熱

余從醫四十餘年聞人多矣凡治一熱病
瘥後必書此條章禁法與之庶無復也今
見世俗愚下之人恃以素稟強實或受恙
輕微難犯之幸而無復執以為常而惑於
眾人抑不知稟氣有盛衰受病有微甚一
藥妄議往往坐致而死者不可勝計及有
母愛其子妻愛其夫見其索食而問與之
蓋不以生死性命為重惟以利口實而返
加害也噫當與識者道難與俗人言故若
子不可不慎也余撮取聖賢羣書撰成條
章禁法目之曰保命鑑

小兒痘疹十忌

腋下狐臭氣 溝渠濁惡氣 房中淫泆
氣 齋房婦人經候氣并諸般血腥臭氣
酒醉暈腥氣 酒醉氣 酒毒入內 硫黃散
藥氣并毒藥之氣 毒目麝香膠 穢氣 毒
以疫汗蒸濕氣 毒目 毒汗 氣 燥燒頭髮
氣并魚骨諸臭氣及茶烟入口鼻 葱蒜
韭薤氣 鹹

已上禁法出全嬰集皆不可犯否則有變
動余親歷故也或曰田舍小兒任之自然
犯之者略無變動蓋貴賤有異稟受不同
也

胡荽酒治小兒痘瘡欲令透出用胡荽三兩

細切以酒二大盞煎令沸沃胡荽即用物
合定不令泄氣候冷去滓從項背腹兩
足微嘆令偏頭面勿嘆用袋盛掛帳中
餘藥乳母服之

史記曰病有六不治 驕恣不論於理一不
治 輕命重財二不治 衣食不能適三
不治 陰陽并臟氣不足四不治 形羸
不能服藥五不治 信巫不信醫六不治

劉河間乳子詩

養小須調護 看承莫縱持 乳多終損胃
食壅即傷脾 余學非為益 衣單正所宜
無風頻見日 寒暑順天時

眼疾諸方

發散虛實通用如解毒加桑樹皮
升麻 赤芍藥 川芎

羌活散治熱

柴胡 乾薑 玄參
府芎 黃芩 荊芥
甘草 白朮 山梔子
赤芍 草決明 白水煎服

防風

羌活

赤芍

白芷

川芎

荊芥

木澤

防己

粉草

荊芥

白茯苓

菊花

細辛

白朮

瀉藥亦芍

黃芩 枳殼

荊芥

右等分煎熟泡大黃朴消五更雞鳴時服
之一切積熱腫痛者用此

當歸散老少虛實者通用

當歸

川芎

赤芍

熟地黃

荊芥

粉草

防風

白芷

白水煎服

羨黎丸退諸障膜

石決明

川芎

白芷

防風

木賊

石膏

覆盆子 楮實子 牡蠣 蟬蛻

蔓荊子 青相子 車前子

細辛 菊花 旋伏花

密蒙花 草龍膽

右等分鍊蜜為丸諸虛鹽湯下膏茅根煎

湯下缺珠猪肝煎湯下垂簾障每服二十

四物湯下如重甚加白柿素白皮茆根煎

煎湯下

神應回光散治障翳赤眼努肉扳睛

木賊 白芷 甘草

青相子 楮實子 草決明

羌活 石決明 川烏泡

白蒺藜 蟬蛻

右為末一錢食後茶湯調下酒亦可

送睛丸

白蒺藜 木澤 藏靈仙

蟬蛻 菊花 石決明

草決明 川芎 羌活

青相子 密蒙花 楮實子

右等分鍊蜜為丸

眼輩不明四物湯加生麻油 薄荷 荊芥

連翹

右水煎食後服

打傷血腫睛胞

大黃 姜黃

當歸 白芨

京芥 朴硝 薄荷

右為末生地黄汁調用紙或藥貼患處

打傷眼血侵睛 桃枝 柳枝 生地黄

右用猪肉同藥搗爛貼眼眩上

治心間積熱眼有赤筋下灌瞳人

右用玄參不拘多少為末以米泔煮猪肝

煎藥末細嚼用汁燕吟下

治眼出冷淚補肝四物湯加木澤防風虛則

用此實則用 木澤 蒼朮 白蒺藜

防風 羌活 川芎 甘草

右為末米泔水調下

治眼疾血輪赤紅瀉心

龍膽草 細辛 山梔子 大黃

甘草 烏豆 水煎服

治赤侵白處瀉肝散子

杏仁 芫 扁蓄 桑白皮 熱服

清腎散治腎藏風上攻注眼目

白蒺藜 防風 羌活 芎黃耆

右為末温酒調下

治眼血輪水輪皆赤補腎地黄丸赤鹽丸苗

香丸右三件打和二十九鹽湯或鹽酒下

地黄丸生地黄黃芩黃耆草決明炒鍊蜜丸

治淚眼消風散黑神散打和茶清調下

點爛弦風盧甘石不拘多少煨紅童子便淨

七次乳爛用水飛過去上石以黃連當歸

芍藥京芥防風薄荷細辛煎濃汁用五倍

子內虫同汁點滴于乳鉢內細乳汁乾為

度再滴再乳至細以磁研收貯臨期以熱

茶洗眼然後點上立効

點眼藥赤芍蒲黃與鬱若芙蓉研末伴勻勻

珠缺土螺緊姜汁若久常痛只茶清痛甚

加白芷南星無名異白元慈久不開者加

生川烏

磨翳障老虛用

蟬蛻 川芎^{二錢} 羚羊角^{二錢}

白蒺藜^{二錢} 甘草^{二錢} 當歸^{二錢}

熟地黃^{二錢} 木賊^{一錢} 夏枯草^{一錢}

石決明^{二錢} 石膏^{一錢} 玄參^{一錢}

青相子^錢

右為末鍊蜜為丸彈子大每服一丸食後

蔥茶嚼下

防風散治風毒攻眼睫落腫痛

防風 甘菊花 黃連 草決明

黃芩 甘草 大黃 赤芍藥

木通 右咬咀水一盞煎服

茯苓散治老人赤眼不退

茯苓^{一兩} 人參^{一兩} 赤芍藥^{一兩} 山梔子^{一兩}

甘草^{一兩} 紫蘇^{一兩} 麥門冬^{一兩} 助參^{一兩}

連翹^{一兩} 咬咀水煎服

治婦人血風頭疼 草烏 山梔子

右為末葱自然汁調搽太陽穴并眉上不可過眼使後避風只看頭痛處塗之

補肝重明丸

羚羊角 生地黃 熟地黃

肉從蓉 枸杞子 防風

草決明^{一兩} 豬寶子^{一兩} 甘菊花

羌活 當歸^{一兩} 羊子肝^{四兩}

右為末蜜為丸如梧桐子大每服三十九大抵肝主目肝受血而能視血弱則肝氣

無以榮養肝氣不榮則膽水不能上運是致重人昏散自力虛弱視物不真此藥大

能補養肝血滋膽水退目中隱閃空眩

湯則引藥性下達日子茶清下別飲上清

頭目臨睡酒下則欲榮養肝血不飲酒則

用人參當歸湯下久服妙甚

貼諸般赤目及頭風赤腫不開者撞打兩太

陽穴痛貼最良

豬牙皂角 黃柏 姜黃

南星 草烏 黃連

右為末姜自然汁調貼太陽穴一二次痛

止如有赤障起亦宜貼打傷眼赤腫不開

加芙蓉豆粉調貼葱搗貼亦妙

洗諸證眼 黃連 當歸 赤芍藥 滑石

右為末湯泡沉清洗諸般翳障加石膏乳

香秦皮爛眩風蔓荊子五倍子去穢

地黃丸 菊花 木賊^{二錢} 蒼朮^{二錢} 黃

枸杞子 京芥^{三錢}

右鍊蜜為丸食後茶下二十九丸去風明目

諸證通用

免絲子丸安神定魄眼目光明虛目可服

熟青皮 車前子 巴戟^{二錢}

杜仲^{二錢} 靈仙^{二錢} 遠志^{二錢}

牛膝^{二錢} 從蓉^{二錢} 熟地黃^{二錢}

免絲子^{二錢}

右浸藥酒煮麩糊為丸空心鹽酒湯下三

十九

三黃湯治寒赤腫熱毒

黃連^{二錢} 茯苓^{二錢} 大黃^{二錢}

甘草^{二錢} 朴硝 麥門冬湯食後下

細辛散治撞者腫人睛疼出血

荆芥穗 車前子 茯苓

細辛 地骨皮^{三錢} 沒藥^{三錢}

右空心溫酒下 黑神散治婦人血風爛眩或產後月水不調

痛不可忍撞打血攻腫人散血行風孕婦莫服

白朮 茯苓 甘草 茴香
肉桂 玄胡索 生地黃 川芎
芍藥 蒲黃 木香 白芷

當歸 為末酒調下

弩肉臘月雄猪膽用馬牙硝入內將風吹乾

為末入腦子麝香點之

法製玄明粉用熟熱眼赤眼良

右用黃牛枯膽一箇入淨朴硝二錢黃連

一錢實其中當風懸之逐日以鴨翎毛於

膽外掃下硝以盡為度用瓦罌收之臨用

如常法點

小兒痘瘡證不可瀉餘毒只宜用菜豆皮谷

精草入藥內服忌百物常喫螺師為妙

治孩兒痘瘡入目服白柿

治小兒疹瘡入目生翳

草決明 天花粉 甘草 赤芍 麩

右為末半錢熱水調下

治生障 瓜蒞根 甘草 決明草

赤芍藥 半 蜜湯調下

涼疔丸治小兒疔眼赤爛

苦參 防風 蔓荊子 龍膽草

玄參 為末猪膽糊丸菜豆大茶清下

治斑疹患後睛上有物

白燕 薑 五粒 杏仁 二十粒 盧會

熊膽 三

右四味同研細用生麻油三兩點調攤在

盤內次用熟艾一塊如雞子大裹研砂乳

香硫三味各如黃豆大三味細研入在艾

內燒烟薰碗內藥以艾盡為度取出細研

每用如粟米大點目中

常洗藥治諸般風熱心熱風毒爛眩赤淚痒

痛障翳流淚婦人血風諸證

五倍子 蔓荊子 水 洗 通

右為末每服二錢用砂瓶內水半盞銅錢

三五十箇用紙封口火炙至久紙上破小

孔以氣蒸眼待可用手傾出澄清開眼熱

洗冷即住後再溫熱又洗

又洗藥

銅青 白礬土 五倍子 半錢

右同為末用熱湯泡開閉目熱洗眼眩不

可入眼內冷即住後再溫熱洗凡爛眩昏

可用

茶調散治男子婦人一切風腫痒痛翳爛眩

風氣眼淚淚昏並皆治之

川芎 防風 羌活 兩

甘草 兩 木賊 石膏 兩

石決明 兩 荆芥 薄荷 兩

甘菊花 兩

右為末每服二錢茶清調下

治一切熱眼先用黃連四兩重剉水熬成膏

次用大甜瓜一枚切開頂蓋刮去穢子用

生薄荷鋪一層放馬牙硝一層重重填滿

瓜中仍用瓜頂蓋之吊於當風處三四日

其硝自出瓜皮外用鷄毛逐日掃之與黃

連膏子一處和勻白器中盛之點熱眼

貼赤眼熱眼 桑葉 兩 荆芥 兩

朴硝 兩 大黃 兩

右為末用蜜水調貼兩太陽穴上退熱血

紫金丸治眼秘方

川芎^{半兩} 當歸^{半兩} 楮實^{半兩}
 薄荷^{半兩} 瓜蒌根^{三錢} 蔓荊子^{二兩}
 川椒^{一兩} 乾菊花^{三錢} 蜜蒙花^{三錢}
 蛇皮^{三錢} 荆芥穗^{三錢} 地骨皮^{一兩}
 已上四味用甘草汁浸過焙乾白茯苓一兩半去芡泡
 右十三味同為細末煉蜜為丸每丸一錢重隨引子下暗暗青朦者當歸酒下氣障者木香湯下婦人血暈當歸薄荷湯下有
 人因熱飲酒患眼三年不分道路服此藥二十五日効有因氣害眼昏暗八年不見光明服此藥四十日効六十日愈明又有因喪母失明四年服此藥五十日効如舊清明

又方治眼疾諸般翳障昏暗大神効

川芎^{半兩} 當歸^{半兩} 瓜蒌根^{三錢}
 川椒^{三錢} 楮實^{半兩} 甘草^{三錢}
 甘菊花^{一兩} 蛇蛻^{三錢} 黃連^{三錢}
 蔓荊子^{一兩} 木賊^{一兩} 宿娑^乾 薄荷^{半兩}

蜜蒙花^{一兩} 地骨皮^{一兩} 羌活^{一兩}
 白蔞^{半兩} 荆芥^{一兩}

右十六味為末煉蜜丸每服一兩作十丸食後服日二次有醫者米泔水下睛暗者當歸湯下氣障者木香湯下婦人血暈薄荷當歸湯下忌腥腥酒濕麪物此藥累効治熱風眼冬青子不以多少搽碎取汁熬成膏子濾極淨於磁瓶內盛埋地中七日出大毒用點熱眼
 又方黃連朴硝各四兩白水熬成膏點熱眼
 又方熱服取鯉魚膽汁點
 治爛弦極好先用五倍子蔓荊子洗後用盧甘石二兩大瓶以黃連汁重使共泮七八次研細銅青五錢朋砂一錢麝少許牙硝半錢為細末搽眼弦

治小兒周歲未周歲患赤眼者

右用黃連為末以茶清調塗手心足心即愈如腫痛難開加姜黃皂角朴硝為末同敷太陽穴手足心加葱搗敷尤妙
 仙傳外科秘方卷之十一

法海遺珠卷之一

神霄十字天經

混鍊玄隱

凡欲受持十字天經下工混鍊者每於子午卯酉四時面異跌坐叩齒集神稱摩說九聲望神霄引青炁一口舌挂上脘書天經存碧英滿口嚙下心中繞心不散良久衝開泥丸而出青炁化為炁毳口誦磨說不已忽霹靂一聲自毳中出見焮火合青炁炁中即時心禮祝事焮火忽化天火青光從泥丸直下重樓至丹田坐於丹元之中三部八景之神皆來朝謁齊誦天經條忽之間寂無遺響朝夕行之九年則尸毒消亡形神俱妙與道合真矣

書經秘用

天經符文焚香靜坐心誦十字天經不計遍數書此十字為符或排書或疊書書畢仍召九天應元捷令靈飛神元符使張束存符使天丁冠青面金甲玄衣綠靴風帶手執玉斧自巽戶降以祖炁合之存至密